

CLASĂ
/MATEMATICIENILOR/

Marian ANDRONACHE • Dinu ȘERBĂNESCU

Marius PERIANU • Cătălin CIUPALĂ • Florian DUMITREL



Matematică

pentru examenul de bacalaureat

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Matematică - pentru examenul de bacalaureat

ISBN 978-973-124-824-0



9 789731 248240

Marian ANDRONACHE • Dinu ȘERBĂNESCU
Marius PERIANU • Cătălin CIUPALĂ • Florian DUMITREL

Matematică

*pentru examenul
de bacalaureat*

M1



Toate drepturile asupra acestei lucrări aparțin editurii.
Reproducerea integrală sau parțială a conținutului lucrării
este posibilă numai cu acordul prealabil scris al editurii.

Referenți științifici:
prof. drd. Livia Harabagiu
prof. gr. I. Eduard Buzdugan

Tehnoredactare:
Cornel Drăghia

Coperta:
Alexandru Daș

Tipărit la C.N.I. „Coresi” S.A.

Descrierea CIP este disponibilă la Biblioteca Națională a României

978-973-124-824-0

Pentru comenzi vă puteți adresa:

Departamentului Difuzare
C.P. 22, O.P. 84, Cod: 062650, sector 6, București

telefon
021.224.17.65
0721.213.576
0744.300.870
Se acordă importante reduceri.

Cuprins

	Enunțuri	Soluții
Partea 1. ALGEBRĂ/GEOMETRIE (clasele IX-X)		
Tema 1.1 – Mulțimi de numere.		
Mulțimi și elemente de logică matematică	7	196
Tema 1.2 – Funcții definite pe mulțimea numerelor naturale (șiruri)	10	197
Tema 1.3 – Funcții. Proprietăți generale. Lecturi grafice	14	200
Tema 1.4 – Funcția de gradul I. Funcția de gradul al II-lea	19	201
Tema 1.5 – Puteri și radicali. Ecuații iraționale.....	24	204
Tema 1.6 – Funcția exponențială și funcția logaritmică.		
Ecuații și inecuații exponențiale și logaritmice	28	207
Tema 1.7 – Numere complexe	32	208
Tema 1.8 – Metode de numărare. Elemente de combinatorică.		
Matematici financiare	36	209
Tema 1.9 – Vectori în plan. Geometrie vectorială.		
Geometrie analitică	40	210
Tema 1.10 – Trigonometrie. Aplicații ale trigonometriei și ale produsului scalar în geometria plană.....	46	213
Partea 2. ALGEBRĂ (clasele XI-XII)		
Tema 2.1 – Permutări. Matrice. Determinanți	55	216
Tema 2.2 – Sisteme de ecuații liniare	64	219

Tema 2.3 – Structuri algebrice.....	74 226
Tema 2.4 – Polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ.....	85 235
Partea 3. ANALIZĂ MATEMATICĂ (clasele XI-XII)	
Tema 3.1 – Limite de șiruri. Limite de funcții.	
Funcții continue. Funcții derivabile.....	97 239
Tema 3.2 – Primitive.....	118 254
Tema 3.3 – Funcții integrabile.....	124 258
Partea 4. VARIANTE DE SUBIECTE	
Tema 4.1– Subiecte date la examenul de bacalaureat	
în anii anteriori	143 280
Tema 4.2 – Variante de subiecte propuse spre rezolvare	156 304

Tema 1.1.	Mulțimi de numere. Mulțimi și elemente de logică matematică (clasa a IX-a)
Tema 1.2.	Funcții definite pe mulțimea numerelor naturale (șiruri) (clasa a IX-a)
Tema 1.3.	Funcții. Proprietăți generale. Lecturi grafice (clasele IX-X)
Tema 1.4.	Funcția de gradul I. Funcția de gradul al II-lea (clasa a IX-a)
Tema 1.5.	Puteri și radicali. Ecuații iraționale (clasa a X-a)
Tema 1.6.	Exponențiale și logaritmi (clasa a X-a)
Tema 1.7.	Numere complexe (clasa a X-a)
Tema 1.8.	Metode de numărare. Elemente de combinatorică (clasa a X-a)
Tema 1.9.	Vectori în plan. Geometrie vectorială. Geometrie analitică (clasele IX-X)
Tema 1.10.	Elemente de trigonometrie. Funcții și ecuații trigonometrice (clasa a X-a)

Tema 1.1

Mulțimi de numere.

Mulțimi și elemente de logică matematică

1. Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real

Definiție. Fie $x \in \mathbb{R}$. Cel mai mare număr întreg mai mic sau egal decât x se numește *partea întreagă* a lui x . Se notează: $[x] = \max \{p \in \mathbb{Z} \mid p \leq x\}$.

Numărul real $\{x\} = x - [x]$ se numește *partea fracționară* a lui x .

Proprietăți

1. $[x] \leq x < [x] + 1, \forall x \in \mathbb{R};$
2. $x - 1 < [x] \leq x, \forall x \in \mathbb{R};$
3. $[x] = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z};$
4. $[x + n] = [x] + n \Leftrightarrow n \in \mathbb{Z};$
1. $\{x\} \in [0, 1), \forall x \in \mathbb{R};$
2. $\{x\} = 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z};$
3. $\{x\} = \{y\} \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z},$
4. $\{x + n\} = \{x\} \Leftrightarrow n \in \mathbb{Z}.$

Identitatea lui Hermite.

$$[x] + \left[x + \frac{1}{n}\right] + \left[x + \frac{2}{n}\right] + \dots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = [nx], \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}.$$

Probleme propuse

1. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții

- a) $p : „[x] + [y] = [x + y], \text{ pentru orice } x, y \in \mathbb{R}”, \text{ unde } [a] \text{ reprezintă partea întreagă a numărului real } a.$
- b) $q : „\{3x\} = 3\{x\}, \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R}”, \text{ unde } \{a\} \text{ reprezintă partea fracționară a numărului real } a.$
- c) $r : „\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \text{ astfel încât } x^2 + y^2 = 2012.”$

2. Determinați valoarea de adevăr a afirmației: „Suma oricăror două numere iraționale este un număr irațional.”

Variante bacalaureat 2009

3. a) Calculați $\left[\sqrt{2012}\right] + (2 + \sqrt{2}) \cdot \left\{-\sqrt{2}\right\}.$

b) Calculați $\left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{2012 \cdot 2013}\right].$

c) Calculați $\left[\sqrt{2009}\right] + 3 \cdot \left\{-\frac{1}{3}\right\}.$

d) Calculați $\left[\sqrt{1}\right] + \left[\sqrt{2}\right] + \dots + \left[\sqrt{100}\right].$

e) Calculați $\left[(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2\right].$

Variante bacalaureat, februarie 2008

4. a) Determinați mulțimea $A = \{x \in [0, 2] \mid [2x] = 2[x]\}$, unde $[a]$ reprezintă partea întreagă a numărului real a .
 b) Determinați mulțimea $B = \{x \in [-1, 2] \mid 3\{x\} = 1\}$, unde $\{a\}$ reprezintă partea fracționară a numărului real a .

5. Arătați că $\left[\sqrt{n^2 + n} \right] = n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

6. Fie $x \in \mathbb{R}^*$. Arătați că $\left[\frac{1}{x} \right] = 0$ dacă și numai dacă $x > 1$.

Variante bacalaureat, februarie 2008

7. a) Arătați că $\{\{x\} + y\} = \{x + \{y\}\}$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că $\{\{x + y\} + z\} = \{x + \{y + z\}\}$, pentru orice $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Variante bacalaureat 2009, enunț adaptat

8. a) Arătați că $[x] + \left[x + \frac{1}{2} \right] = [2x]$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că dacă $[x + a] = [x + b]$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, atunci $a = b$.

9. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care $\{x \in \mathbb{R} \mid (m^2 - 1)x + 2 > 0\} = \mathbb{R}$.

10. Determinați cel mai mic element al mulțimii $\{x \in \mathbb{R} \mid (x + 2)(x^2 - 4) \geq 0\}$.

11. Se consideră $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid (x - 1)\left(x - \frac{10}{3}\right) \leq 0\right\}$. Determinați cel mai mare element al mulțimii $B = \{|a - b| \mid a, b \in \mathbb{Z}, a < b, [a, b] \subset A\}$.

12. Determinați numerele naturale din mulțimea $A = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} < x \leq 2\right\}$.

13. Se consideră mulțimile $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 2\}$ și $B = [-3, 0)$. Determinați $A \cap B \cap \mathbb{Z}$.

14. Se consideră mulțimile $A = \{0, 2, 4, 6, \dots, 50\}$ și $B = \{0, 3, 6, 9, \dots, 48\}$. Aflați cardinalul fiecăreia dintre mulțimile A , B , $A \cap B$ și $A \cup B$.

15. Se consideră fracția zecimală infinită $\frac{1}{7} = 0, a_1 a_2 \dots$. Determinați numărul de elemente ale mulțimii $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$.

16. Se consideră fracția zecimală infinită $\frac{4}{11} = a_0, a_1 a_2 \dots$. Determinați suma elementelor mulțimii $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$.

17. Se consideră fracția zecimală infinită $\frac{10}{13} = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$. Calculați $a_1 + a_2 + \dots + a_{2012}$.

Variante bacalaureat, februarie 2008, enunț adaptat

18. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care $\{1; 2\} \subseteq \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + mx + 4 = 0\}$.

19. Determinați perechile $(m, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care $\{1; 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + mx + n = 0\}$.

20. Determinați $a \in \mathbb{Z}$ pentru care $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - ax + 4 = 0\} \cap \{0, 1, 2, \dots, 2011\} \neq \emptyset$.

21. Se consideră mulțimea $A = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

a) Arătați că numerele $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$ și $\{\sqrt{3}\}$ aparțin mulțimii A .

b) Arătați că $x \cdot y \in A$, pentru orice $x, y \in A$.

c) Arătați că mulțimea $B = \{x \in A \mid [x] = 0\}$ are cel puțin 2012 elemente.

22. Arătați că $\sqrt{3} \notin \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Variante bacalaureat, februarie 2008

23. Determinați $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care $x^2 + 2xy + 2y^2 = 0$.

24. Arătați că $x^2 + 3xy + 4y^2 \geq 0$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Variante bacalaureat 2009

25. Determinați $x + y + z$ știind că $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 6y - 2z + 14 = 0$.

26. a) Arătați că dacă $x, y, z \in \mathbb{R}$ și $x^2 + y^2 + z^2 = xy + xz + yz$, atunci $x = y = z$.

b) Determinați mulțimea $\{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a^2 + b^2 + 4 = ab + 2a + 2b\}$.

27. a) Arătați că $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$, $\forall a, b > 0$.

b) Arătați că $(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc$, $\forall a, b, c \geq 0$.

28. Se consideră numerele $x, y \geq 1$.

a) Arătați că $\frac{\sqrt{x-1}}{x} \leq \frac{1}{2}$.

b) Arătați că $x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} \leq xy$.

29. Determinați mulțimea $\{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \sqrt{a} + \sqrt[3]{b} = 2\}$.

30. Dați un exemplu de două numere naturale a și b care îndeplinesc condiția $\sqrt{a} - \log_3 b \in \mathbb{N}^*$.

31. Dați un exemplu de două numere iraționale a și b care îndeplinesc condițiile $a + b \in \mathbb{N}^*$ și $a \cdot b \in \mathbb{Z}$.

32. Determinați un element $(a, b, c) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ care verifică condiția $2^a < b < \log_3 c$.

33. Ordonați crescător numerele.

a) $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\ln 2$; b) $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{6}$;

c) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$, $\sqrt{5}$; d) $\frac{1}{2}$, $\log_3 2$, $\ln 2$, $\sqrt{3}$, 1.

Tema 1.2

Funcții definite pe mulțimea numerelor naturale (șiruri)

1. Șiruri

Definiție. Șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 1}$ este *monoton (strict) crescător* dacă $x_n \leq x_{n+1}$ ($x_n < x_{n+1}$), $\forall n \geq 1$.

Șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 1}$ este *monoton (strict) descrescător* dacă $x_n \geq x_{n+1}$ ($x_n > x_{n+1}$), $\forall n \geq 1$.

Definiție. Șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 1}$ este *mărginit inferior* dacă există un număr real (notat cu m) astfel încât $m \leq x_n$, $\forall n \geq 1$.

Șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 1}$ este *mărginit superior* dacă există un număr real (notat cu M) astfel încât $x_n \leq M$, $\forall n \geq 1$.

Dacă șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este mărginit atât inferior cât și superior, spunem că șirul este *mărginit*.

2. Progresii aritmetice

Definiție. Șirul de numere reale $(a_n)_{n \geq 1}$ este o *progresie aritmetică de rație r* dacă $a_{n+1} - a_n = r$, $\forall n \geq 1$ (adică diferența oricăror doi termeni consecutivi este constantă).

Proprietăți

$$1. a_n = a_1 + (n-1) \cdot r, \forall n \geq 1. \quad 2. a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \forall n \geq 2.$$

$$3. S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + r \frac{n(n-1)}{2}, \forall n \geq 1, \text{ unde } S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

$$4. n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1, \forall n \geq 1, r \neq 0.$$

3. Progresii geometrice

Definiție. Șirul de numere reale nenule $(b_n)_{n \geq 1}$ este o *progresie geometrică de rație q* dacă $b_{n+1} = b_n \cdot q$ (adică raportul oricăror doi termeni consecutivi este constant).

Proprietăți

$$1. b_n = b_1 \cdot q^{n-1}, \forall n \geq 1$$

$$2. b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}, \forall n \geq 2.$$

$$3. S_n = \begin{cases} b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}, & q \neq 1 \\ nb_1, & q = 1 \end{cases}, \text{ unde } S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n.$$

Probleme propuse

1. Arătați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ cu termenul general $a_n = \frac{4n}{n+3}$ este crescător.

Variante bacalaureat 2009

2. Arătați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$, de termen general $a_n = n^2 - n$ este strict monoton.

Variante bacalaureat 2009

3. Arătați că șirurile următoare sunt monotone.

$$a) x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}, \forall n \geq 1$$

$$b) x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \forall n \geq 1.$$

$$c) x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}, \forall n \geq 1.$$

4. Arătați că șirurile următoare sunt mărginite.

$$a) x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}, \forall n \geq 1.$$

$$b) x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}, \forall n \geq 1.$$

$$c) x_n = \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1}, \forall n \geq 1.$$

5. Fie progresia aritmetică $(a_n)_{n \geq 0}$ astfel încât $a_5 = 7$ și $a_{23} = 43$.

a) Determinați a_{13} .

b) Stabiliți dacă numărul 2015 este termen al progresiei?

c) Calculați suma $T = a_2 + a_5 + a_8 + \dots + a_{2012}$.

6. Calculați suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice $(a_n)_{n \geq 1}$, știind că $a_4 - a_2 = 4$ și $a_1 + a_3 + a_5 + a_6 = 30$.

Variante bacalaureat 2009

7. Determinați $x \in \mathbb{R}$ știind că x , $(x-1)^2$ și $x+2$ sunt în progresie aritmetică.

8. Determinați numărul real x știind că numerele $x+1$, $1-x$ și 4 sunt în progresie aritmetică.

9. Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care numerele 2^{a-1} , $2^{-a+2} + 1$, $2^{a+1} + 1$ sunt în progresie aritmetică.

Variante bacalaureat 2009

10. Calculați sumele.

$$a) 1 + 4 + 7 + \dots + 100;$$

$$b) 2 + 6 + 10 + \dots + 2010;$$

$$c) 1 + 3 + 5 + \dots + (2n+3), n \in \mathbb{N}^*;$$

$$d) 1 + 5 + 9 + \dots + (4n-3), n \in \mathbb{N}^*.$$

11. Arătați că suma primelor n numere naturale impare este un pătrat perfect.

12. Se consideră șirul $(a_n)_{n \geq 1}$. Știind că pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ are loc egalitatea $a_1 + a_2 + \dots + a_n = n^2 + n$, demonstrați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este o progresie aritmetică.

13. Determinați numărul natural x din egalitățile:

- a) $1+5+9+\dots+x=231$.
- b) $1+3+5+\dots+x=225$.
- c) $x+(x+1)+\dots+(x+x)=45$.
- d) $2+5+8+\dots+x=57$.

Variante bacalaureat 2009

14. Determinați al zecelea termen al șirului $x_1, x_2, 7, 10, 13, \dots$.

15. Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ o progresie aritmetică. Știind că $a_3 + a_{19} = 10$, calculați $a_6 + a_{16}$.

Variante bacalaureat 2009

16. Se consideră progresia aritmetică $(a_n)_{n \geq 1}$ astfel încât $a_2 + a_3 + a_{19} + a_{20} = 8$. Calculați.

- a) $a_1 + a_2 + \dots + a_{21}$;
- b) $a_2 + a_4 + \dots + a_{20}$.

17. Se consideră progresia aritmetică $(a_n)_{n \geq 1}$ și S_n suma primilor n termeni ai progresiei.

- a) Dacă $a_1 + a_4 = 100$, $a_{n-3} + a_n = 200$ și $S_n = 600$, determinați n .
- b) Dacă $S_{3n} = 9S_n$ și $a_4 = 21$, calculați a_1 .

18. Arătați că dacă numerele reale a, b și c sunt în progresie aritmetică și progresie geometrică, atunci $a = b = c$.

19. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că numerele $2, a, b$ sunt în progresie geometrică și $2, 17, a$ sunt în progresie aritmetică.

Variante bacalaureat 2009

20. Fie a, b, c numere naturale în progresie geometrică. Știind că $a + b + c$ este un număr par, arătați că numerele a, b, c sunt pare.

Variante bacalaureat 2009

21. Determinați $x > 0$ știind că numerele $1, x-1, x+5$ sunt în progresie geometrică.

22. Fie ecuația $x^2 - 4x + a = 0$, cu rădăcinile x_1 și x_2 . Determinați $a \in \mathbb{R}^*$ știind că $x_1, x_2, 3x_2$ sunt în progresie geometrică.

23. Fie ecuația $x^2 + ax + 2 = 0$, cu rădăcinile x_1 și x_2 . Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că x_1, x_2, x_2^2 sunt în progresie geometrică.

24. Determinați primul termen al șirului $a_0, a_1, a_2, 4, 8, 16, 32, \dots$.

25. Determinați primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi $b_1, 6, b_3, 24, \dots$.

Variante bacalaureat 2009

26. Se consideră numărul real $s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{100}}$. Arătați că $s \in (1; 2)$.

27. Arătați că $s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{2012}} > \frac{2}{3}$.

28. Fie $a = 1 + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{5^{10}}$ și $b = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{5^3} + \dots - \frac{1}{5^{11}}$. Calculați $[a] + [b]$, unde $[x]$ este partea întreagă a numărului real x .

29. Arătați că, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ este adevărată egalitatea

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^{11})^2 - x^{11} = (1 + x + x^2 + \dots + x^{10})(1 + x + \dots + x^{12}).$$

30. Calculați rația progresiei geometrice $(b_n)_{n \geq 1}$ cu termeni pozitivi, dacă $b_1 + b_2 = 6$ și $b_3 + b_4 = 24$.

Examen Bacalaureat 2011

31. Se consideră progresia geometrică cu termeni pozitivi $(b_n)_{n \geq 0}$ și $S_n = b_0 + b_1 + \dots + b_n$, astfel încât $b_4 - b_0 = 15$ și $b_2 + b_0 = 5$.

- a) Determinați b_2 .
- b) Calculați S_8 .

32. Fie progresia aritmetică $(a_n)_{n \geq 1}$ cu elemente numere naturale. Arătați că rația progresiei este un număr natural.

33. Fie progresia geometrică $(b_n)_{n \geq 1}$ cu toate elementele numere naturale. Arătați că rația progresiei este un număr natural.

34. Știind că doi termeni ai unei progresii geometrice sunt $b_3 = 6$ și $b_5 = 24$, determinați termenul b_7 .

Model subiect MEETS, Bacalaureat 2011

35. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$. Calculați suma $f(2) + f(2^2) + \dots + f(2^9)$.

36. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 1$. Calculați sumele:

$$S_1 = f((-3)^0) + f((-3)^1) + f((-3)^2) + \dots + f((-3)^{10})$$

$$S_2 = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(11).$$

37. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x - 1$. Calculați sumele

$$S_1 = f(0) - f(1) + f(2) - f(3) + \dots + f(50), \quad S_2 = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(50) \text{ și}$$

$$S_3 = f(2^0) - f(2^1) + f(2^2) - f(2^3) + \dots + f(2^9).$$

Tema 1.3

Funcții. Proprietăți generale. Lecturi grafice

Fie A și B două mulțimi nevide. Spunem că $f: A \rightarrow B$ este o *funcție* dacă fiecărui element $x \in A$ îi corespunde un unic element $f(x) \in B$.

A se numește *domeniul funcției* f , iar B se numește *codomeniul funcției* f . Două funcții sunt egale dacă au același domeniu, același codomeniu și aceeași lege de definiție.

Graficul funcției $f: A \rightarrow B$ este mulțimea $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subset A \times B$.

Imaginea funcției $f: A \rightarrow B$ sau (*mulțimea valorilor funcției* f) este mulțimea

$$\text{Im } f = \{y \in B \mid \exists x \in A, f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Observații. 1. $M(u, v) \in G_f \Leftrightarrow f(u) = v$.

2. Funcția identică a mulțimii A este $1_A: A \rightarrow A$, $1_A(x) = x$, $\forall x \in A$.

1. Operații cu funcții

Definiție. Fie $D \subseteq \mathbb{R}$ o mulțime nevidă și funcțiile $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$. Atunci:

- *suma* funcțiilor f și g este funcția $f + g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$;
- *produsul* funcțiilor f și g este funcția $f \cdot g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$;
- dacă $g(x) \neq 0, \forall x \in D$, *câtul* funcțiilor f și g este funcția $\frac{f}{g}: D \rightarrow \mathbb{R}$ $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

Compunerea funcțiilor. Fie $f: A \rightarrow B$ și $g: B \rightarrow C$ două funcții. Funcția $g \circ f: A \rightarrow C$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, $\forall x \in A$, se numește *compunerea funcțiilor* g și f .

Observație. Compunerea funcțiilor este asociativă, dar nu este comutativă.

2. Monotonia funcțiilor

Definiție. Fie $D \subseteq \mathbb{R}$ o mulțime nevidă. Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este *monoton (strict) crescătoare* dacă pentru orice $x, y \in D$, $x < y$, avem $f(x) \leq f(y)$ ($f(x) < f(y)$).

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este *monoton (strict) descrescătoare* dacă $x, y \in D$, $x < y$, avem $f(x) \geq f(y)$ ($f(x) > f(y)$).

Observații.

1. Dacă raportul de variație $R_f(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} > 0, \forall x, y \in D, x \neq y$, atunci funcția f este strict crescătoare, iar dacă $R_f(x, y) < 0, \forall x \neq y$, atunci f este descrescătoare.

2. Compunerea a două funcții monotone, de aceeași monotonie, este o funcție crescătoare; compunerea a două funcții monotone, de monotonii diferite, este o funcție descrescătoare.

3. Funcții pare, impare, periodice.

Definiție. Fie $D \subseteq \mathbb{R}$ o mulțime nevidă centrată în origine ($\forall x \in D \Leftrightarrow -x \in D$).

a. Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este *funcție pară* dacă $f(-x) = f(x), \forall x \in D$.

b. Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este *funcție impară* dacă $f(-x) = -f(x), \forall x \in D$.

Proprietăți

1. Dacă $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție impară și $0 \in D$, atunci $f(0) = 0 \Leftrightarrow O(0, 0) \in G_f$.

2. Suma $f + g: D \rightarrow \mathbb{R}$ a două funcții pare (impare) $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ este tot o funcție pară (impară).

3. Produsul/câtul a două funcții pare/impare este o funcție pară. Produsul/câtul dintre o funcție pară și una impară este o funcție impară.

4. Compunerea a două funcții pare/impare este o funcție pară. Compunerea dintre o funcție pară și una impară este o funcție impară.

Definiție. Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este *periodică cu perioada* T dacă $f(x+T) = f(x)$, pentru orice $x \in D$ pentru care $x+T \in D$. Cea mai mică perioadă pozitivă (dacă există) se numește *perioadă principală*.

4. Simetrii ale graficului unei funcții

Definiție. Dreapta $x = a$ este *axă de simetrie* pentru graficul funcției $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ dacă $f(a-x) = f(a+x)$, pentru orice $x \in D$ astfel încât $a-x, a+x \in D$.

Punctul $M(a, b) \in xOy$ este *centru de simetrie* pentru graficul funcției $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ dacă $f(a-x) + f(a+x) = 2b$, pentru orice $x \in D$ astfel încât $a-x, a+x \in D$.

Observații. 1. Graficul unei funcții pare este simetric față de axa Oy .

2. Graficul unei funcții impare este simetric față de origine.

5. Funcții injective, surjective, bijective, inversabile

Definiție. Funcția $f: A \rightarrow B$ este:

- *injectivă* dacă pentru orice $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$ avem $f(x_1) \neq f(x_2)$;
- *surjectivă* dacă pentru orice $y \in B$, există $x \in A$ astfel încât $f(x) = y$;
- *bijectivă* dacă este injectivă și surjectivă.

Definiție. Funcția $f: A \rightarrow B$ este *inversabilă* dacă există o funcție $g: B \rightarrow A$ astfel încât $g \circ f = 1_A$ și $f \circ g = 1_B$. Notăm $g = f^{-1}$ și spunem că f^{-1} este *inversa funcției* f .

Observații

1. Funcția $f: A \rightarrow B$ este injectivă dacă și numai dacă este îndeplinită una din condițiile:

a. Pentru orice $x_1, x_2 \in A$ astfel încât $f(x_1) = f(x_2)$, rezultă $x_1 = x_2$.

b. Pentru orice $y \in B$, ecuația $f(x) = y$ are cel mult o soluție $x \in A$.

2. Funcția $f: A \rightarrow B$ e surjectivă dacă și numai dacă este îndeplinită una din condițiile:

a. $\text{Im } f = B$.

b. Pentru orice $y \in B$, ecuația $f(x) = y$ are cel puțin o soluție $x \in A$.

3. Funcția $f: A \rightarrow B$ este bijectivă dacă oricărui element $y \in B$ îi corespunde un unic element $x \in A$ astfel încât $f(x) = y$.

4. Funcția $f: A \rightarrow B$ este *inversabilă* dacă și numai dacă este *bijectivă*. Inversa funcției bijective $f: A \rightarrow B$ este funcția $f^{-1}: B \rightarrow A$ care îndeplinește proprietatea: $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$, unde $x \in A$ și $y \in B$.

Probleme propuse

- Arătați că $\frac{1}{2}$ nu este perioadă pentru funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{x\} + \{2x\}$.
- Arătați că $\frac{1}{3}$ este perioadă pentru funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{3x\}$.
- Determinați câte o perioadă pentru fiecare dintre funcțiile de mai jos.
a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \left\{\frac{x}{2}\right\} + \{x\}$; b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \left\{\frac{x}{2}\right\} + \left\{\frac{x}{3}\right\}$.
- Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (1-a^2)x + 4$ este constantă.
Bacalaureat 2011
- Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |4x-8| - 2|4-2x|$ este constantă.
Variante bacalaureat 2009
- Arătați că funcția $f: [3,8] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x-8| + |3-x|$ este constantă.
- Arătați că funcția $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \left[\frac{x}{x^2+1}\right]$ este constantă, unde $[a]$ este partea întreagă a lui a .
- Arătați că funcția $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x-1}$ este strict descrescătoare.
- Se consideră funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x-1$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x+a$. Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că $f \circ g = g \circ f$.
- Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1-2x$. Arătați că funcția $f \circ f \circ f$ este strict descrescătoare.
Variante bacalaureat 2009
- Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - x$. Calculați $(f \circ f)(0)$.
Examen Bacalaureat, iunie 2006
- Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 4x$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = ax + 1$ se intersectează într-un punct pe axa Ox .
- Pentru funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 4x + 2$ determinați cel mai mare element al mulțimii $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq 2\}$.
- Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 8x$. Determinați suma elementelor din mulțimea $A = \{a \in \mathbb{R} \mid f(a) = a\}$.

15. Arătați că imaginea funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$ este intervalul $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$.

16. Determinați mulțimea valorilor funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$.

Examen Bacalaureat, septembrie 2010

17. Se consideră funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x-1$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Determinați imaginile funcțiilor $f \circ g$ și $g \circ f$.

18. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ și $\text{Im } f$ imaginea funcției f .

a) Arătați că $1 \notin \text{Im } f$.

b) Arătați că cea mai mare valoare a funcției f este $\frac{1}{2}$.

c) Arătați că $-\frac{1}{2} \in \text{Im } f$.

19. Arătați că minimul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - 2x^2$ este egal cu -1 .

20. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$. Pentru o submulțime A a lui \mathbb{R} definim mulțimea $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in A\}$. Determinați:

a) $f^{-1}(\{0,2\})$; b) $f^{-1}((3,+\infty))$; c) $f^{-1}([3,8])$;

d) Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care mulțimea $f^{-1}(\{m\})$ are un singur element.

21. Determinați $m, n \in \mathbb{R}$ știind că punctele $A(1,0)$ și $B(0,-1)$ aparțin graficului funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + mx + n$.

22. Arătați că următoarele funcții sunt impare:

a) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - \frac{1}{x}$; b) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + \frac{2^x + 2^{-x}}{x}$;

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$; d) $f: (-3,3) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln\left(\frac{3-x}{3+x}\right)$.

Examen Bacalaureat, 2009, 2010

23. Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x(e^x + e^{-x}) + a$ este impară.

24. Determinați $a+b \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 + ax^3 + 2x^2 + bx + 1$ este funcție pară.

25. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție pară. Arătați că f nu este injectivă.

26. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție impară. Arătați că originea axelor de coordonate aparține graficului funcției f .

27. Se consideră funcțiile $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x+1$ și $g(x) = ax+b$. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât $f \circ g = 1_{\mathbb{R}}$.

28. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x+1$. Arătați că $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n-\text{ori}}(x) = 2^n x + 2^n - 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ și orice $n \in \mathbb{N}^*$.

29. a) Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + x + 1$ este injectivă
 b) Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - x + 1$ nu este injectivă.
 c) Verificați dacă funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + x + 1$ este injectivă.
 d) Arătați că funcția $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 3x + 1$ nu este surjectivă.

Variante bacalaureat 2007, 2008, 2009

30. Arătați că funcția $f: [1, +\infty) \rightarrow [2, +\infty)$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$ este inversabilă.

Variante bacalaureat, 2008

31. Determinați inversa funcției bijective $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $f(x) = 2^{2x-1}$.

32. Determinați inversa funcției bijective $f: (0, \infty) \rightarrow (1, \infty)$, $f(x) = x^2 + x + 1$.

Variante bacalaureat, 2008

33. Fie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ inversa funcției bijective $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x + 3$. Calculați $g(0) + g(3)$.

34. Aflați $a \in \mathbb{Z}$ pentru care funcția $f: [1, +\infty) \rightarrow [a, +\infty)$, $f(x) = x^2 + 4x$ este surjectivă.

35. Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: (-\infty, a] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x + 2$, este injectivă.

36. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție bijectivă cu $f(1) = 2$ și $f(f(1)) = 4$. Calculați $f^{-1}(4)$.

Variante bacalaureat, februarie 2008

37. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$. Arătați că există o infinitate de perechi $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pentru care $f \circ f = 1_{\mathbb{R}}$.

Variante bacalaureat, 2009, enunț adaptat

38. Se consideră o funcție funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Notăm $H = \{T \in \mathbb{R} \mid f(x+T) = f(x)\}$.

a) Arătați că dacă $T \in H$, atunci $-T \in H$.

b) Arătați că dacă $T_1, T_2 \in H$, atunci $T_1 + T_2 \in H$.

Variante bacalaureat 2009, enunț adaptat

Tema 1.4

Funcția de gradul I. Funcția de gradul al II-lea

1. Funcția de gradul I

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ (cu $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$), se numește *funcție de gradul I*.

Graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ este o dreaptă de pantă a .

Monotonie. Dacă $a > 0$, atunci funcția f este strict crescătoare.

Dacă $a < 0$, atunci funcția f este strict descrescătoare.

Semnul funcției de gradul I

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$f(x)$	$-\operatorname{sgn}(a)$	0	$\operatorname{sgn}(a)$

2. Funcția de gradul al II-lea

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$ (cu $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$), se numește *funcție de gradul al II-lea*.

Forma canonică. $f(x) = ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$, unde $\Delta = b^2 - 4ac$.

Semnul funcției de gradul al doilea

	x	$-\infty$		$+\infty$
1. $\Delta < 0$	$f(x)$		$\operatorname{sgn}(a)$	

	x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
2. $\Delta = 0$	$f(x)$	$\operatorname{sgn}(a)$	0	$\operatorname{sgn}(a)$

	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
3. $\Delta > 0$	$f(x)$	$\operatorname{sgn}(a)$	0	$-\operatorname{sgn}(a)$	0	$\operatorname{sgn}(a)$

Observații

$$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$$


$$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$$


Graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$ este o parabolă de vârf $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, axă de simetrie $x = -\frac{b}{2a}$, care are ramurile orientate în sus dacă $a > 0$ și în jos dacă $a < 0$.

Monotonie și punctele de extrem

1. $a > 0$	x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
	$f(x)$	\searrow	$-\frac{\Delta}{4a}$	\nearrow
2. $a < 0$	x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
	$f(x)$	\nearrow	$-\frac{\Delta}{4a}$	\searrow



$a > 0$



$a < 0$

- Dacă $a > 0$, $\min f = -\frac{\Delta}{4a}$, care se atinge în punctul (de minim) $x = -\frac{b}{2a}$.

Funcția f este strict crescătoare pe $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$ și strict descrescătoare pe $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$.

- Dacă $a < 0$, $\max f = -\frac{\Delta}{4a}$, care se atinge în punctul (de maxim) $x = -\frac{b}{2a}$.

Funcția f este strict crescătoare pe $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$ și strict descrescătoare pe $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$.

Relațiile lui Viète. Fie x_1, x_2 rădăcinile ecuației $ax^2 + bx + c = 0$. Atunci

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Observații.

$$1. x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2; \quad x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2).$$

2. Ecuația de gradul al II-lea cu rădăcinile x_1 și x_2 este $x^2 - sx + p = 0$, unde $s = x_1 + x_2$ și $p = x_1 \cdot x_2$.

Probleme propuse

- Determinați funcția de gradul I al cărei grafic trece prin punctele $A(1, 2)$ și $B(-1, 0)$.
- Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$. Determinați funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = ax + b$ știind că graficele funcțiilor f și g sunt simetrice față de:
 - axa Ox ;
 - axa Oy ;
 - punctul $O(0, 0)$.
- Determinați funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ știind că graficul său și graficul funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -3x + 3$ sunt simetrice față de dreapta $x = 1$.
Variante bacalaureat 2009
- Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$ știind că funcția $f: [1, 3] \rightarrow [a, b], f(x) = -2x + 1$ este bijectivă.
- Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că funcția $f: [1, 4] \rightarrow [1, 7], f(x) = ax + b$ este bijectivă.
- Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (m^2 - 2)x - 3$ să fie strict descrescătoare.
Variante bacalaureat 2009
- Se consideră funcțiile $f_m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_m(x) = \frac{m-1}{2m+2}x + 3, m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 - Determinați m știind că funcția f_m este strict crescătoare.
 - Determinați m știind că $A(1, 0) \in G_{f_m}$.
 - Determinați m știind că $f_m(1) > f_m(3)$.
 - Determinați m știind că $f_m(1) = f_m(3)$.

8. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

- $|x+1| = 2|x|$;
- $|x^2 - 4| = 3x$;
- $|x+2| + |x^2 + x - 2| = 0$;
- $|x-3| + |4-x| = 1$.

Variante bacalaureat, februarie 2008

9. Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuațiile.

- $\frac{1}{x+1} \geq 2$;
- $\frac{x}{x+2} \leq \frac{x+1}{x-1}$;
- $\frac{x^2 - 16}{x(x+4)} > 0$;
- $(x-2)(x^2 - 3x + 2) \leq 0$.

10. Rezolvați în mulțimea numerelor întregi inecuațiile.

- $3x^2 - 5x + 2 \leq 0$;
- $-2x^2 + 3x + 5 \geq 0$;
- $x^4 - 5x^2 + 4 < 0$.

11. Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuațiile.

- $|x-1| \leq 3$;
- $|x-1| + |x+1| \leq 4$;
- $|x^2 - 1| < 1$.

12. Rezolvați în mulțimea numerelor întregi inecuațiile.

- $|x+2| \leq 1$;
- $|12-4x| \leq 2|x-3|$;
- $|x+2| + |x^2 - 4| \leq 1$.

13. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - 2m + 2$. Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât graficul funcției f să nu intersecteze axa Ox .
Variante bacalaureat 2009

14. Determinați toate funcțiile de gradul întâi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strict crescătoare care îndeplinesc condiția $(f \circ f)(x) = 4x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$.
Variante bacalaureat, februarie 2008

15. Determinați soluțiile întregi ale inecuației $x^2 + 2x - 8 < 0$.
Bacalaureat 2010

16. Arătați că soluțiile ecuației $x^2 + 2x + \frac{1}{x^2 + 2x} = 2$ sunt iraționale.

17. Determinați valorile reale ale lui m pentru care dreapta $x = 2$ este axă de simetrie a parabolei $y = x^2 + mx + 4$.
Bacalaureat 2011

18. Determinați mulțimea valorilor funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x + 1$.

Bacalaureat 2011-model subiect

19. Determinați mulțimea valorilor funcției $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 1$.

20. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2x + 2$.

- Determinați imaginea funcției $f \circ f \circ f$.
- Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că imaginea funcției $g: (-\infty, a) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = f(x)$ este intervalul $[1, +\infty)$.
- Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că $f(m-x) = f(m+x), \forall x \in \mathbb{R}$.

21. Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că vârful parabolei $y = x^2 + (2m-1)x + m^2 + m$ este în cadranul I.

22. Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că distanța de la vârful parabolei de ecuație $y = x^2 + 2x + a$ la axa Ox este egală cu 1.
Variante bacalaureat 2009

23. Determinați funcția f de gradul al doilea dacă $f(-1) = 1, f(0) = 1, f(1) = 3$.

Variante bacalaureat 2009

24. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că vârful parabolei $y = x^2 + ax + b$ este $V(1, 2)$.
25. Punctul $V(2, 3)$ este vârful parabolei asociate funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + ax + b$.
Calculați $f(3)$. *Bacalaureat 2011*
26. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că dreapta $x = 2$ este axă de simetrie pentru parabola $y = -x^2 + ax + b$ și că punctul este $M(1, 2)$ aparține aceleiași parabole.
27. Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că vârful parabolei asociate funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x + m^2$ se află pe graficul funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$.
28. Se consideră funcțiile $f_m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_m(x) = mx^2 - 2(m-1)x + m + 1$, $m \in \mathbb{R}^*$.
- Determinați m știind că graficul funcției f_m nu intersectează axa Ox .
 - Determinați mulțimea valorilor funcției f_2 .
 - Determinați imaginea funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f_2(\sin x)$.
 - Determinați m știind că dreapta $x = 2$ este axă de simetrie pentru graficul funcției f .
 - Determinați m știind că $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
 - Determinați m știind că $f(x) > 0$, $\forall x > 0$.
29. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $x^2 - x + m^2 = 0$ are două soluții reale egale.
Bacalaureat 2010
30. Fie funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + a$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 - a$. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care $(f \circ g)(x) > 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$. *Bacalaureat 2010*
31. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (a+1)x^2 + 3(a-1)x + a - 1$, intersectează axa Ox în două puncte distincte.
Variante bacalaureat 2009
32. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (a-1)x^2 + 2(a+1)x + a + 1$, $a \in \mathbb{R}$.
- Determinați a știind că ecuația $f(x) = 0$ nu are nicio soluție.
 - Determinați a știind că inecuația $f(x) > 0$ nu are nicio soluție.
 - Determinați a știind că graficul funcției f este tangent axei Ox .
 - Determinați a știind că vârful parabolei asociate graficului funcției f se află pe dreapta $x = 2$.
33. Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât valoarea minimă a funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + (2a-1)x + a^2 + 1$ este egală cu 2.
34. Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + (2a-1)x + a^2 + 1$ este strict crescătoare.
35. Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: (-\infty, 2) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 + (2a+1)x + a^2 + 1$ este strict crescătoare.
36. Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât rădăcinile x_1 și x_2 ecuației $x^2 + (2m+3)x + m + 1 = 0$ verifică pe rând condițiile.
- $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1$;
 - $x_1^2 = x_2^2$;
 - $|x_1 - x_2| = 1$;
 - $x_1 + 1 = x_2$.

37. Se consideră ecuația $x^2 - (2m-1)x + m - 1 = 0$, $m \in \mathbb{R}$ cu rădăcinile x_1 și x_2 .
Determinați valoarea minimă a expresiei $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$.
38. Se consideră ecuația $x^2 - (2m+1)x + m + 1 = 0$, $m \in \mathbb{R}$ cu rădăcinile x_1 și x_2 .
Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că $x_1^2 x_2 = x_1 x_2^2$.
39. Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că rădăcinile ecuației $x^2 + 2(m-1)x + m - 1 = 0$ au semne opuse.
40. Se consideră ecuația $ax^2 + bx + c = 0$ cu coeficienți reali și cu rădăcinile x_1 și x_2 .
Arătați că dacă $x_1 \cdot x_2 < 0$, atunci $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ și $x_1 \neq x_2$.
41. Aflați $m \in \mathbb{R}$ știind că $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x + m = 0\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x + m + 10 = 0\} \neq \emptyset$.
42. Fie ecuația $x^2 + 2x + a = 0$ cu rădăcinile x_1 și x_2 . Determinați $a \in \mathbb{Z}$ știind că x_1, a, x_2 sunt în progresie aritmetică.
43. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.
- Determinați mulțimea valorilor funcției f .
 - Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că $f(x) < m$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
 - Determinați $n \in \mathbb{R}$ știind că $f(x) \geq n$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
44. Fie x_1 și x_2 rădăcinile ecuației $x^2 + x - 13 = 0$.
- Calculați $\frac{x_1}{x_2^2 + x_2 - 12} + \frac{x_2}{x_1^2 + x_1 - 12}$.
 - Calculați $\frac{x_1}{x_2^2 + 2x_2 - 13} + \frac{x_2}{x_1^2 + 2x_1 - 13}$.
 - Arătați că $S_n = x_1^n + x_2^n \in \mathbb{Z}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
45. Fie x_1 și x_2 rădăcinile ecuației $x^2 + x - 3 = 0$. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că rădăcinile ecuației $x^2 + ax + b = 0$ sunt $\frac{1}{x_1}$ și $\frac{1}{x_2}$.
46. Determinați o ecuație de gradul al doilea cu coeficienți întregi care are o rădăcină $x_1 = 1 + \sqrt{3}$.
47. Determinați numerele reale a și b știind că soluțiile x_1 și x_2 ale ecuației $x^2 - ax + b = 0$ verifică relațiile $x_1 + x_2 = 3$ și $x_1 x_2^2 + x_2 x_1^2 = 6$.
48. Rezolvați sistemul $\begin{cases} x + y = 3 \\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{5}{2} \end{cases}$, unde $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$.
49. Rezolvați sistemul $\begin{cases} 2x + y^2 = 3 \\ x^2 + 2x - y^2 = 2 \end{cases}$, unde $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$.

Puteri și radicali. Ecuații iraționale

Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^n$, unde $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, se numește funcție putere.

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[n]{x}$, unde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, și $D = \mathbb{R}$ dacă n este impar, respectiv $D = [0, +\infty)$ dacă n este par, se numește funcție radical de ordin n .

Funcția radical de ordinul 2 este $f:[0,\infty)\rightarrow\mathbb{R}$, $f(x)=\sqrt{x}$, iar funcția radical de ordinul 3 este $f:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$, $f(x)=\sqrt[3]{x}$.

Proprietăți

1. Funcțiile $f, g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^{2n}$ și $g(x) = \sqrt[n]{x}$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, sunt funcții bijective, fiecare fiind inversa celeilalte.
2. Funcțiile $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^{2n+1}$ și $g(x) = \sqrt[n]{x}$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, sunt funcții bijective, fiecare fiind inversa celeilalte.
3. Funcția putere de exponent impar este strict crescătoare pe \mathbb{R} . Funcția putere de exponent par este strict descrescătoare pe $(-\infty, 0]$ și strict crescătoare pe $[0, +\infty)$.
4. Funcția radical de ordin impar este strict crescătoare pe \mathbb{R} .
Funcția radical de ordin par este strict crescătoare pe $[0, +\infty)$.
5. Funcția radical de ordin impar este convexă pe $(-\infty, 0]$ și concavă pe $[0, +\infty)$.
Funcția radical de ordin par este concavă pe $[0, +\infty)$.

Proprietăți ale puterilor

Fie $a, b \in \mathbb{R}^*$, $r, s \in \mathbb{Q}$.

1. $a^0 = 1$ și $1^s = 1$; 2. $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$; 3. $(a \cdot b)^s = a^s \cdot b^s$; 4. $(a^r)^s = a^{r \cdot s}$;
5. $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$; 6. $\left(\frac{a}{b}\right)^s = \frac{a^s}{b^s}$; 7. $\begin{cases} \text{pentru } a > 1 \text{ avem } a^r < a^s \Leftrightarrow r < s \\ \text{pentru } a \in (0,1) \text{ avem } a^r < a^s \Leftrightarrow r > s \end{cases}$

Proprietăți ale radicalilor

Pentru $a, b \in \mathbb{R}$ și $n, k \in \mathbb{N}$, $n, k \geq 3$ impare sau pentru $a \in [0, +\infty)$, $b \in (0, +\infty)$ și $n, k \in \mathbb{N}^*$ numere pare, avem

1. $\sqrt[n]{a^n} = a$; 2. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$; 3. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, $b \neq 0$; 4. $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{k} \sqrt[n]{a^k}$;
5. $a^{\frac{n}{k}} = \sqrt[k]{a^n}$, $k \geq 2$; 6. $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[n \cdot k]{a}$; 7. $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a < b$.

Probleme propose

- 1. Ordonăți crescător numerele**

a) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{5}$.

b) $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{8}$.

c) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{1}}, \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}.$

$$d) \sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt[4]{6}, \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}, \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}.$$

2. Arătați că $\left[\sqrt[n]{n} \right] = 1, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, unde $[a]$ este partea întreagă a numărului real a .

3. Arătați că numărul $a = \sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}}$ este număr natural.

4. Fie $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $x + \frac{1}{x} = 4$. Calculați $x^2 + \frac{1}{x^2}$ și $x^3 + \frac{1}{x^3}$.

5. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 2$. Ordonati crescator numerele $f(1), f(\sqrt{2}), f(\sqrt[3]{3})$.

6. Fie $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ fixat. Determinați un număr $a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ pentru care
- $$\underbrace{\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\ldots\sqrt{a}}}}}_{n \text{ radicali}} \in \mathbb{N}.$$

7. Dacă $x = \sqrt{5-a} + \sqrt{4+a}$, $a \in [-4, 5]$, determinați în funcție de x expresia $\sqrt{5-a} \cdot \sqrt{4+a}$.

8. Arătați că $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}} \in (1, 2)$.

9. Arătați că $\sqrt{6^3 \sqrt{6^4 \sqrt{6 \dots \sqrt{6}}}} \in (1, 6)$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

10. Determinați $a \in \mathbb{Q}$ dacă $\sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt[3]{4}}} = 2^a$.

11. Arătați că $(\sqrt{2}+1)(\sqrt[4]{2}+1)(\sqrt[8]{2}+1)(\sqrt[16]{2}+1) = \frac{1}{\sqrt[16]{2}-1}$.

- 12.** Arătați că numărul $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$ este natural.

- 13.** Arătați că numărul $\sqrt{3 - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}} - \sqrt{5}$ este întreg.

Variante bacalaureat 2009

Variante bacalaureat 2009

Variante bacalaureat 2009

Variante bacalaureat 2009

14. Fie $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sqrt[3]{5-x} + \sqrt[3]{3+x} = 3$. Determinați $\sqrt[3]{5-x} \cdot \sqrt[3]{3+x}$.

15. Numărul $\sqrt{101}$ scris sub formă de fracție zecimală infinită este egal cu $a_0, a_1 a_2 \dots$. Determinați a_2 .

16. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile.

a) $\sqrt{x+2} = x$.

b) $\sqrt{x+1} = x-5$.

c) $x + \sqrt{x} = 6$.

d) $\sqrt{x+1} = 1-2x$.

17. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile.

a) $\sqrt{x^2-2x+1} = x+1$.

b) $\sqrt{2x-1} = x$.

c) $\sqrt{x-1} + \sqrt{2-x} = 1$.

d) $\sqrt{x+1} = 5-x$.

e) $|\sqrt{x}-1| = 2$.

18. Rezolvați următoarele ecuații:

a) $\frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-4}} + 2 \frac{\sqrt{x-4}}{\sqrt{x+4}} = \frac{11}{3}$;

b) $\sqrt{\frac{x+4}{x-4}} + 2\sqrt{\frac{x-4}{x+4}} = \frac{11}{3}$.

19. Rezolvați următoarele ecuații:

a) $\sqrt{(x+2)(x+3)} = \sqrt{12}$.

b) $\sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x+3} = \sqrt{12}$.

20. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile.

a) $\frac{\sqrt{x}}{x+1} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} = \frac{5}{2}$.

b) $\sqrt{x^2+x-1} + \sqrt{x^2+x+2} = 3$.

c) $\frac{x}{2+\sqrt{x}} + \frac{2+\sqrt{x}}{x} = \frac{10}{3}$.

21. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile.

a) $\sqrt[3]{x+1} = 2$

b) $\sqrt[3]{x-1} = 1-x$.

c) $\sqrt[3]{1-x} = 1+x$.

d) $\sqrt[3]{x+1} = 1-2x$.

Bacalaureat 2010

Variante bacalaureat 2009

Variante bacalaureat 2009

Variante bacalaureat 2009

Bacalaureat 2011

Bacalaureat 1999

Variante bacalaureat 2009

22. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile.

a) $\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1$.

b) $\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} + \sqrt{4x-3-4\sqrt{x-1}} = 3$.

Variante bacalaureat 2009

Variante bacalaureat, februarie 2008

23. Se consideră funcția $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}$.

a) Rezolvați ecuația $f(x) = 1$.

b) Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că ecuația $f(x) = m$ admite cel puțin o soluție reală.

24. Se consideră funcția $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+3+4\sqrt{x-1}}$.

a) Rezolvați ecuația $f(x) = 3$.

b) Pentru $m \in [3, +\infty)$, arătați că ecuația $f(x) = m$ admite o singură soluție reală.

25. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile.

a) $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} = 2$.

b) $\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x-3} = 2$.

c) $x + 2^x + \sqrt{x} = 4$.

d) $x + \log_2 x + \sqrt[3]{x} = 2$.

e) $\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x} = 5$.

Variante bacalaureat, februarie 2008

26. Determinați perechile $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pentru care $x + y + 6 = 2\sqrt{x-1} + 4\sqrt{y+2}$.

27. Rezolvați în mulțimea numerelor reale următoarele inecuații.

a) $\sqrt{x+2} < x$.

b) $\sqrt{x+2} \geq x$.

c) $\sqrt[3]{2-x^2} \geq 1$.

Variante bacalaureat 2009

Tema 1.6

Funcția exponențială și funcția logaritmică. Ecuații și inecuații exponențiale și logaritmice

1. Logaritmi

Definiție. Fie $a > 0, a \neq 1$ și $x > 0$. Unicul număr real y cu proprietatea $a^y = x$ se numește *logaritm*ul numărului x în baza a și se notează $\log_a x$.

Cu alte cuvinte, $\log_a x = y$ dacă și numai dacă $a^y = x$.

Observații. 1. Dacă $a = 10$, numărul $\log_{10} x = \lg x$ se numește *logaritm*ul zecimal al lui x .

2. Dacă $a = e$, numărul $\log_e x = \ln x$ se numește *logaritm*ul natural al lui x .

Proprietățile logaritmilor

$$1. a^{\log_a x} = x, \forall x > 0; \quad 3. \log_a a = 1, \forall a > 0, a \neq 1; \quad 5. x^{\log_a y} = y^{\log_a x}.$$

$$2. \log_a a^x = x, \forall x \in \mathbb{R}; \quad 4. \log_a 1 = 0, \forall a > 0, a \neq 1;$$

Operații cu logaritmi

$$1. \log_a x + \log_a y = \log_a(xy), \forall x, y > 0; \quad 3. \log_a x^p = p \log_a x, \forall x > 0, \forall p \in \mathbb{R};$$

$$2. \log_a x - \log_a y = \log_a \left(\frac{x}{y} \right), \forall x, y > 0; \quad 4. \log_{a^p} x = \frac{1}{p} \log_a x, \forall x > 0, \forall p \in \mathbb{R}^*.$$

Schimbarea bazei unui logaritm

$$1. \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}, \forall a, b, x > 0, a, b \neq 1; \quad \text{Consecință: } \log_a x = \frac{\lg x}{\lg a} = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

$$2. \log_a b \cdot \log_b c = \log_a c, \forall a, b, c > 0, a, b \neq 1;$$

$$3. \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \forall a, b > 0, a, b \neq 1.$$

2. Funcția exponențială și funcția logaritmică

Funcția exponențială de bază a ($a > 0, a \neq 1$) este funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = a^x$.

Funcția logaritmică de bază a ($a > 0, a \neq 1$) este funcția $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \log_a x$.

Proprietăți

1. Funcțiile exponențială de bază a și logaritmică de bază a sunt funcții bijective, fiecare fiind inversa celeilalte.

2. Funcțiile exponențială de bază a și logaritmică de bază a sunt funcții *strict crescătoare* dacă $a > 1$ și *strict descrescătoare* dacă $a \in (0, 1)$.

3. Funcția exponențială de bază a este convexă pentru orice $a \in (0, 1) \cup (1, \infty)$.

Funcția logaritmică de bază a este concavă dacă $a > 1$ și convexă dacă $a \in (0, 1)$.

Probleme propuse

1. Dați exemplu de numere $a, b \in \mathbb{N}$ care îndeplinesc condiția $\sqrt{a} - \log_3 b \in \mathbb{N}^*$.

2. Determinați un triplet $(a, b, c) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ care verifică condiția $2^a < b < \log_3 c$.

3. Calculați:

$$a) \log_2 10 + \log_2 6 - \log_2 15; \quad b) \log_3 12 \cdot \log_2 3 - \log_4 9;$$

$$c) \log_{\sqrt{2}} \sqrt[3]{3} \cdot \log_3 2; \quad d) \log_{2012}(\operatorname{tg} x) + \log_{2012}(\operatorname{ctg} x), x \in (0, 1);$$

$$e) \log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \dots \cdot \log_{31} 32; \quad f) 4^{1+\log_2 3} : 6^{\log_{\sqrt{6}} 8}.$$

4. Arătați că:

$$a) \log_2 5 \in (2, 3); \quad b) 3 \in (\log_2 9, 7 \log_5 2);$$

$$c) 2 \in (\log_3 4, \sqrt{5}); \quad d) \sqrt[3]{3} \in (\sqrt{2}, \log_9 27). \quad \text{Bacalaureat 2009, Variante MEdC}$$

5. a) Exprimați, în funcție de $a = \log_3 2$, numărul $b = \log_{12} 18$.

b) Exprimați, în funcție de $a = \log_{20} 2$, numărul $b = \log_5 20$.

c) Exprimați, în funcție de $a = \log_3 5$, numărul $b = \log_{15} 45$.

d) Exprimați, în funcție de $a = \log_2 3$ și $b = \log_3 5$, numărul $c = \log_6 60$.

6. Calculați sumele:

$$a) A = \log_a x + \log_a x^2 + \log_a x^3 + \dots + \log_a x^n, \text{ unde } a, x > 0, a \neq 1, n \in \mathbb{N}^*;$$

$$b) B = \ln \sqrt{x} + \ln \sqrt[3]{x} + \ln \sqrt[4]{x} + \dots + \ln \sqrt[n+1]{x}, \text{ unde } x > 0;$$

$$c) C = \lg \frac{1}{2} + \lg \frac{2}{3} + \lg \frac{3}{4} + \dots + \lg \frac{999}{1000};$$

$$d) D = \frac{1}{\lg 2 \cdot \lg 4} + \frac{1}{\lg 4 \cdot \lg 8} + \dots + \frac{1}{\lg 2^n \cdot \lg 2^{n+1}} - \frac{n}{n+1} \log_2^2 10, \text{ unde } n \in \mathbb{N}^*.$$

$$e) E = \frac{1}{\log_2 1 + \log_2 2 + \dots + \log_2 10} + \frac{1}{\log_3 1 + \log_3 2 + \dots + \log_3 10} + \dots + \frac{1}{\lg 1 + \lg 2 + \dots + \lg 10}.$$

7. Calculați suma $S = [\lg 1] + [\lg 2] + [\lg 3] + \dots + [\lg 10^{2008}]$.

Bacalaureat 2008, Variante MEdC

8. Fie $a, b > 0$. Arătați că au loc următoarele echivalențe:

$$a) \lg \frac{a+b}{3} = \frac{\lg a + \lg b}{2} \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 7ab; \quad b) \lg \frac{a+b}{2} = \frac{\lg a + \lg b}{2} \Leftrightarrow a = b;$$

$$c) \lg \frac{2a+3b}{5} = \frac{\lg a + \lg b}{2} \Leftrightarrow \frac{a}{b} \in \left\{1, \frac{9}{4}\right\}; \quad d) \lg \frac{a+3b}{2\sqrt{3}} = \frac{\lg a + \lg b}{2} \Leftrightarrow a = 3b.$$

Bacalaureat 2008 – 2009, Variante MEdC

9. Aflați domeniul maxim de definiție D al funcției $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin:

$$a) f(x) = \log_2(2x-4); \quad b) f(x) = \lg(x+1) + \lg(x-1);$$

$$c) f(x) = \log_2 \sqrt{1-x^2}; \quad d) f(x) = \log_{x+2}(2-x);$$

$$e) f(x) = \log_2(x^2 - 7x + 12); \quad f) f(x) = \log_{|x|}(x^2);$$

10. a) Arătați că funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \log_3 2^x$ este injectivă.

b) Arătați că funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \log_3 2^x$ este injectivă.

11. Fie $x \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ și numerele $a, b, c > 0$ astfel încât $\log_x a, \log_x b, \log_x c$ sunt în progresie aritmetică. Arătați că a, b, c sunt în progresie geometrică.

Bacalaureat 2003

12. Fie numerele $a, b, c, x \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ astfel încât $\log_a x, \log_b x, \log_c x$ sunt în progresie aritmetică. Arătați că $1 + \log_c a = 2 \log_b a$.

13. Fie numerele distincte $a, b, c \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ în progresie geometrică. Arătați că are loc

$$\text{egalitatea } \frac{\log_a x - \log_b x}{\log_a x} = \frac{\log_b x - \log_c x}{\log_c x}, \text{ pentru orice } x \in (0, \infty) \setminus \{1\}.$$

14. Rezolvați ecuațiile:

$$\begin{aligned} a) 2^{4x+1} &= 512; & b) 7^{3-|x|} &= 49; \\ c) (0,25)^{4-x} &= 32; & d) 3^{x-\sqrt{x}} &= 9; \\ e) 2^{x^2+x} &= 4^{x^2-x+1}; & f) (\sqrt{3})^{4+x-x^2} &= \sqrt[3]{27}. \end{aligned}$$

15. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

$$\begin{aligned} a) 4^{x^2-5x+6} &= 16^x; & b) 2^x \cdot 4^{x+1} \cdot 8^{x+2} &= 16^{x+3}; \\ c) \left(\frac{9}{4}\right)^{3x+1} \cdot \sqrt{\left(\frac{8}{27}\right)^x} &= \frac{3}{2}; & d) 9^{\frac{x}{x-1}} \cdot 27^{\frac{x^2}{x+1}} &= 81^x; \\ e) \left(\frac{4}{25}\right)^x \cdot \left(\frac{125}{8}\right)^{x-1} &= \frac{5}{2}; & f) \left(\frac{3}{5}\right)^{x+1} \cdot \left(\frac{25}{9}\right)^{1-x} &= \frac{625}{81}. \end{aligned}$$

16. Rezolvați ecuațiile:

$$\begin{aligned} a) 2^x + 4^x &= 20; & b) 9^x - 3^x &= 72; \\ c) 5^x + 5^{-x} &= 2; & d) 16^x - 3 \cdot 4^x &= 4; \\ e) 2^{2x+1} + 2^{x+2} &= 160; & f) 2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 &= 0; \end{aligned}$$

$$g) 3^{2x+1} - 10 \cdot 3^{x+1} + 27 = 0; \quad h) 2^x + 16 \cdot 2^{-x} = 10. \quad \text{Bacalaureat 2009, Variante ME dC}$$

17. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuațiile:

$$a) (2 - \sqrt{3})^{2x} = (7 + 4\sqrt{3})^{-x}; \quad b) (\sqrt{2} + 1)^x + (\sqrt{2} - 1)^x = 6.$$

18. a) Arătați că, pentru orice număr real x , numerele $2^x, 4^x, 8^x$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

b) Arătați că există un unic număr real x pentru care numerele $2^x, 4^x, 8^x$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

19. Determinați $x \in \mathbb{R}$ pentru care numerele $3^{2x-1}, 9^x - 3$ și $3^x + 6$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. *t

20. Rezolvați ecuațiile:

$$\begin{aligned} a) \log_2 (3x^2 - x - 2) &= 3; & b) \log_{x+1} (x^2 - 3x + 1) &= 1; \\ c) \log_2 (3x - 2) + \log_2 (x + 2) &= 4; & d) \log_{x+2} (2x^2 + 5x + 2) &= 2. \end{aligned}$$

21. Rezolvați ecuațiile:

$$\begin{aligned} a) \log_2 (\log_3 (\log_5 x)) &= 0; & b) \log_2 [4 - \log_3 (x + 3)] &= 1; \\ c) \log_3 (2x^2 + 1) - \log_3 (x + 1) &= 1; & d) \log_5 (x + 1) - 2 \log_5 (3x - 7) &= -1; \\ e) \log_3 (x + 4) + \log_3 (2x - 1) &= \log_3 (20 - x); & f) 1 + \log_2 (x + 1) &= \log_2 (x + 2); \\ g) \log_2 (x + 1) + \log_4 (x + 1) + \log_8 (x + 1) &= 22; & h) \log_2 x + \log_{\sqrt{2}} x + \log_{\sqrt[4]{2}} x &= 14. \end{aligned}$$

Bacalaureat 2009, Variante ME dC

22. Rezolvați următoarele ecuații în mulțimea numerelor reale:

$$\begin{aligned} a) 2 \log_3 (9x) - 3 \log_{27} x &= 6; & b) \log_x (9x) + \log_3 x &= 4; \\ c) \log_9 (2x + 10) \cdot \log_{x+1} 3 &= 1; & d) \log_2^2 (2x) + 3 \log_2 (4x) &= 13; \\ e) \lg^2 x - 5 \lg x + 6 &= 0; & f) 4 \lg^4 x - 10 \lg^2 x^2 + 36 &= 0; \\ g) \log_3 (9^x - 6) &= x; & h) \log_2 (9^x + 7) &= 2 + \log_2 (3^x + 1). \end{aligned}$$

23. Aflați numerele reale $x > 2$ pentru care numerele $\log_2 (x - 2), \log_2 x$ și $\log_2 (x + 4)$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

24. Se consideră numerele reale $a, x \in (0, \infty)$, $a \neq 1$. Demonstrați că:

$$\log_a x + \log_{a^2} x + \log_{a^3} x + \dots + \log_{a^{n(n+1)}} x = \frac{n}{n+1} \log_a x, \text{ pentru orice } n \in \mathbb{N}^*.$$

25. Rezolvați următoarele ecuații în mulțimea numerelor reale:

$$\begin{aligned} a) (3x)^{1+\log_3 x} &= 81; & b) x^{\log_2 (4x)} &= 8; \\ c) 3 \log_{100} 100 &= 4 \log_{10} 10; & d) 10^{\log_2 x} &= 2^{\log_2^2 x}; \\ e) \log_3 (5 - x) + 2 \log_3 \sqrt{3 - x} &= 1; & f) \log_{\sqrt{11}} (x + 1 - \sqrt{x + 2}) &= 2; \end{aligned}$$

26. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația

$$\log_2 (\sqrt{x} + \sqrt{x + 2}) + 2 \log_4 (\sqrt{x + 2} - \sqrt{x}) = \log_2 x.$$

27. Fie $a \in (1, \infty)$ un număr real fixat. Se consideră expresia

$$E(x) = \sqrt{\log_a \sqrt[4]{ax} + \log_x \sqrt[4]{ax}} + \sqrt{\log_a \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \log_x \sqrt[4]{\frac{a}{x}}}, \text{ unde } x \in (1, \infty).$$

a) Verificați egalitatea $E(a) = 1$.

b) Arătați că $E(x) = \begin{cases} \sqrt{\log_a x}, & \text{dacă } x > a \\ \sqrt{\log_x a}, & \text{dacă } x \in (1, a) \end{cases}$.

c) Rezolvați ecuația $E(x) = a$.

Tema 1.7

Numere complexe

$\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, unde $i^2 = -1$, este mulțimea numerelor complexe.

Dacă $z = x + iy$, unde $x, y \in \mathbb{R}$, numerele reale x și y se numesc partea reală și respectiv partea imaginară a numărului complex z ; notăm $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$.

Elementele mulțimii $i\mathbb{R}^* = \{iy \mid y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$ se numesc numere pur imaginare.

Modulul unui număr complex $z = x + iy$ este numărul real $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Proprietăți: 1. $|z| \geq 0$, $\forall z \in \mathbb{C}$; $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$.

2. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

3. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Conjugatul unui număr complex $z = x + iy$ este numărul complex $\bar{z} = x - iy$.

Proprietăți: 1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$; 3. $|z| = |\bar{z}|$, $\forall z \in \mathbb{C}$;

2. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$; 4. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$, $\forall z \in \mathbb{C}$.

Observații. 1. $z \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă $\bar{z} = z$;

2. $z \in i\mathbb{R}^*$ dacă și numai dacă $\bar{z} = -z$.

1. Forma trigonometrică a unui număr complex

Pentru orice număr complex nenul $z = x + iy$ există și sunt unice numerele reale $r > 0$ și $\varphi \in [0, 2\pi)$ astfel încât $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Avem $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ și $\varphi = \arctg\left(\frac{y}{x}\right) + k\pi$, unde $k = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x > 0 \text{ și } y \geq 0 \\ 1, & \text{dacă } x < 0 \\ 2, & \text{dacă } x > 0 \text{ și } y < 0 \end{cases}$.

Dacă $x = 0$ și $y > 0$, atunci $\varphi = \frac{\pi}{2}$; dacă $x = 0$ și $y < 0$, atunci $\varphi = \frac{3\pi}{2}$.

Operații cu numere complexe scrise sub forma trigonometrică

Fie $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Atunci:

1. $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$; 2. $z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$;

3. $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))$; 4. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$.

Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Rădăcinile de ordinul n ale numărului complex $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

sunt $z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Rădăcinile de ordinul n ale

unității formează mulțimea $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$.

2. Aplicații ale numerelor complexe în geometrie

A1. Formula distanței dintre două puncte: $MN = |z_M - z_N|$.

A2. Patrulaterul $ABCD$ este paralelogram dacă și numai dacă $z_A + z_C = z_B + z_D$.

A3. Fie punctele $O(0)$, $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$, $D(d)$ în planul xOy . Atunci:

a. $m(\widehat{AOB}) = \arg \frac{b}{a}$; b. $m(\widehat{BAC}) = \arg \frac{c-a}{b-a}$; c. $m(\widehat{AB, CD}) = \arg \frac{d-c}{b-a}$;

d. $AB \parallel CD \Leftrightarrow \frac{d-c}{b-a} \in \mathbb{R}^*$; e. $AB \perp CD \Leftrightarrow \frac{d-c}{b-a} \in i\mathbb{R}^*$;

f. A, B, C sunt coliniare dacă și numai dacă $\frac{b-a}{c-a} \in \mathbb{R}^*$;

g. A, B, C, D sunt conciclice sau coliniare dacă $\frac{b-a}{c-a} : \frac{b-d}{c-d} \in \mathbb{R}^*$.

A4. Fie $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$, $A'(a')$, $B'(b')$, $C'(c')$. Atunci:

a. Triunghiurile la fel orientate ABC și $A'B'C'$ sunt asemenea dacă $\frac{b'-a'}{c'-a'} = \frac{b-a}{c-a}$.

b. Triunghiurile invers orientate ABC și $A'B'C'$ sunt asemenea dacă $\frac{b'-a'}{c'-a'} = \frac{\bar{b}-\bar{a}}{\bar{c}-\bar{a}}$.

Observație. Triunghiul ABC este pozitiv orientat dacă sensul $A-B-C$, parcurs pe cercul circumscris triunghiului ABC , coincide cu sensul direct trigonometric. În caz contrar triunghiul ABC este negativ orientat.

A5. Fie R_M^α rotația de centru M și unghi α . Considerăm punctele $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$. Atunci:

a. Dacă $B = R_O^\alpha(A)$, atunci $b = a(\cos \alpha + i \sin \alpha)$.

b. Dacă $C = R_A^\alpha(B)$, atunci $c - a = (b - a)(\cos \alpha + i \sin \alpha)$.

Probleme propuse

1. Calculați:

a) $i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot \dots \cdot i^{10}$;

b) $(1-i)(1+2i) - 3(2-i)$;

c) $(1-i)(1-i^2)(1-i^3) \dots (1-i^{2008})$;

d) $\left(\frac{(1-2i)(3i-1)}{5} \right)^4$;

e) $1+i+i^2+\dots+i^{10}$;

f) $(2+i)(3-2i) - (1-2i)(2-i)$;

g) $(2+i)^4 + (2-i)^4$;

h) $\frac{25}{4+3i} + \frac{25}{4-3i}$;

Bacalaureat 2007 – 2009, variante MEEdCT

2. Demonstrați că:

a) $\frac{25}{4+3i} + \frac{25}{4-3i} \in \mathbb{Z}$;

b) $\frac{1+3i}{1-3i} + \frac{1-3i}{1+3i} \in \mathbb{R}$;

c) $(3+i\sqrt{2})^3 + (3-i\sqrt{2})^3 \in \mathbb{Z}$;

d) $(1+i)^{2008} + (1-i)^{2008} \in \mathbb{N}$;

e) $\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^{2008} \in \mathbb{R}$;

f) $(1+i)^{2008} + (1-i)^{2008} \in \mathbb{N}$;

Bacalaureat 2008 – 2009, variante MEEdCT

3. a) Determinați $x, y \in \mathbb{R}$ știind că $x(1+2i) + y(2-i) = 4+3i$.
- b) Determinați numerele reale a pentru care $\frac{a+2i}{2+ai} \in \mathbb{R}$.
- c) Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care numărul $z = \frac{1}{a(1+i)+1-2i}$ are partea reală egală cu $\frac{2}{5}$.

Bacalaureat 2008 – 2009, variante ME dCT

4. a) Determinați numerele complexe z care verifică relația $z+7i=6 \cdot \bar{z}$.

b) Determinați $z \in \mathbb{C}$ știind că $\frac{\bar{z}+1}{z+3} = \frac{1}{2}$.

- c) Determinați numerele complexe z care verifică relația $2\bar{z}+z=3+4i$.

Bacalaureat 2008, variante ME dCT

5. a) Fie $z \in \mathbb{C}$. Arătați că dacă $2z+3\bar{z} \in \mathbb{R}$, atunci $z \in \mathbb{R}$.

- b) Fie $z \in \mathbb{C}$. Arătați că dacă $z^2 + \bar{z}^2 \geq 2|z|^2$, atunci $z \in \mathbb{R}$.

Bacalaureat 2009, variante ME dCT

6. a) Calculați $\frac{z^2}{16} + \frac{4}{z}$, știind că z este soluție a ecuației $z^2 - 4z + 16 = 0$.

- b) Calculați $\frac{z^5}{27} - \frac{27}{z}$, știind că z este soluție a ecuației $z^2 + 3z + 9 = 0$.

- c) Calculați $z^2 - \frac{8}{z}$, unde z este soluție a ecuației $z^2 + 2z + 4 = 0$.

7. a) Arătați că dacă $z \in \mathbb{C}^*$ verifică relația $z^2 + |z|^2 + \bar{z}^2 = 0$, atunci $z^{2010} = \bar{z}^{2010}$.

- b) Arătați că dacă $z \in \mathbb{C}^*$ verifică relația $z^2 - |z|^2 + \bar{z}^2 = 0$, atunci $z^{2010} = -\bar{z}^{2010}$.

- c) Arătați că dacă $z \in \mathbb{C}^*$ verifică relația $z + i\bar{z} = 0$, atunci $\left(\frac{z}{|z|}\right)^4 = -1$.

8. Determinați numerele complexe z care verifică egalitatea:

a) $z^2 = i\bar{z}$; b) $\bar{z}^2 = iz$.

9. Rezolvați în mulțimea numerelor complexe ecuațiile:

a) $z^2 + 100 = 0$;

b) $z^2 = 2i$;

c) $z^2 - 4z + 5 = 0$;

d) $z^2 - 8z + 25 = 0$;

e) $z^4 + 8z^2 - 9 = 0$;

f) $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^3 + \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2 + \frac{z+1}{z-1} + 1 = 0$;

g) $z^2 - (1+i)z + i = 0$;

h) $iz^2 + (3+i)z + 2 - 2i = 0$.

Bacalaureat 2008 – 2009, variante ME dCT

10. Arătați că, dacă ε este soluție a ecuației $x^2 + x + 1 = 0$, atunci, pentru orice $a, b, c \in \mathbb{R}$ are loc egalitatea $(a+b\varepsilon+c\varepsilon^2)(a+b\varepsilon^2+c\varepsilon) \geq 0$.

11. Arătați că dacă ω este soluție a ecuației $x^2 - x + 1 = 0$, atunci, pentru orice $a, b, c \in \mathbb{R}$ are loc egalitatea $(a-b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2-c\omega) \geq 0$.

12. Demonstrați că $2\operatorname{Re} \alpha \leq |\alpha|^2$, unde α este soluție a ecuației $x^2 - 2ax + a^2 + 1 = 0$, $a \in \mathbb{R}$.

13. a) Demonstrați că dacă $a \in \mathbb{R}$ și $a > \frac{1}{4}$, atunci soluțiile ecuației $ax^2 - (2a-1)x + a = 0$ au modulul 1.

- b) Demonstrați că dacă $a \in \mathbb{R}$ și $|a| < 2$, atunci soluțiile ecuației $x^2 - ax + 1 = 0$ au modulul egal cu 1.

14. Determinați modulele soluțiilor ecuației $2009x^2 - 2 \cdot 2008x + 2009 = 0$.

15. Determinați argumentul redus al numerelor complexe nenule z care verifică relația:

a) $z + \bar{z} = |z|$; b) $|\bar{z} - i| = |z - 1|$;

c) $|z - i| = |z - 1|$; d) $z^2 = -2i$.

16. Demonstrați că oricare ar fi $z \in \mathbb{C}^*$ imaginile geometrice ale numerelor complexe $0, z, \bar{z}$ și $z + \bar{z}$ sunt vârfurile unui romb.

17. Demonstrați că oricare ar fi $z \in \mathbb{C}^*$ imaginile geometrice ale numerelor complexe z, iz, i^2z și i^3z sunt vârfurile unui pătrat.

18. Demonstrați că imaginile geometrice ale soluțiilor ecuației $x^3 = 1$ sunt vârfurile unui triunghi echilateral.

19. Demonstrați că:

- a) imaginile geometrice ale numerelor complexe z care verifică relația $(z + i\bar{z})^4 = 0$ sunt situate pe dreapta de ecuație $x + y = 0$.

- b) imaginile geometrice ale numerelor complexe z care verifică relația $(z - i\bar{z})^4 = 0$ sunt situate pe dreapta de ecuație $x - y = 0$.

20. a) Arătați că dacă $z \in \mathbb{C}$ astfel încât $|z| = 1$, atunci $z^{2009} + \frac{1}{z^{2009}} \leq 2$.

- b) Arătați că dacă $z \in \mathbb{C}$ astfel încât $|z| = 1$, atunci $\left|z^{2009} - \frac{1}{z^{2009}}\right| \leq 2$.

- c) Arătați că pentru orice $z \in \mathbb{C}$ are loc relația $(z^{2009} - i^{2009})(\bar{z}^{2009} + i^{2009}) \geq 0$.

21. Demonstrați că pentru orice $z \in \mathbb{C}^*$ are loc relația $\left|\frac{z}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}}{z}\right| \leq 2$.

22. Fie $a \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ și $z = \frac{1 - \cos a - i \sin a}{1 + \cos a + i \sin a}$. Arătați că $\operatorname{Re} z = 0$.

23. Arătați că $\left(\frac{1 + i \operatorname{tg} \varphi}{1 - i \operatorname{tg} \varphi}\right)^n = \frac{1 + i \operatorname{tg} n\varphi}{1 - i \operatorname{tg} n\varphi}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{Z}$ și $\varphi \in \mathbb{R} \setminus \{q\pi \mid q \in \mathbb{Q}\}$.

Tema 1.8

Metode de numărare. Elemente de combinatorică. Matematici financiare

1. Probleme de numărare

Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ se notează cu $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ și $0! = 1$.

Numărul submulțimilor unei mulțimi finite cu n elemente este 2^n .

Regula sumei. Dacă un obiect A poate fi ales în m moduri, iar un obiect B poate fi ales în n moduri, astfel încât nicio alegere a lui A să nu coincidă cu vreo alegere a lui B , atunci alegerea „lui A sau B ” poate fi realizată în $m+n$ moduri.

Regula produsului. Dacă un obiect A poate fi ales în m moduri, iar pentru fiecare astfel de alegere, un obiect B se poate alege în n moduri, atunci alegerea perechii (A, B) poate fi realizată în $m \cdot n$ moduri.

Principiul includerii și excluderii. $\text{card}(A \cup B) = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$.

2. Elemente de combinatorică

O **submulțime ordonată** cu k elemente a mulțimii A este un k -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_k) \in \underbrace{A \times \dots \times A}_{k\text{-ori}}$, în care $x_i \neq x_j$, pentru orice $i, j = \overline{1, k}$, $i \neq j$.

Permutări. Fie $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ o mulțime cu n elemente. O **permutare** a mulțimii A este o mulțime ordonată formată cu cele n elemente ale mulțimii A . Orice funcție bijectivă $f: A \rightarrow A$ definește o permutare a mulțimii A .

Numărul permutărilor unei mulțimi cu n elemente este $P_n = n!$ (**permutări de n**). Prin convenție, $P_0 = 1$.

Aranjamente. Numărul submulțimilor ordonate cu k elemente dintr-o mulțime cu n elemente este $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$ (**aranjamente de n luate câte k**).

Combinări. Numărul submulțimilor cu k elemente dintr-o mulțime cu n elemente este $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$ (**combinări de n luate câte k**).

Proprietăți

- Formula combinărilor complementare: $C_n^k = C_n^{n-k}$;
- Formulă de recurență pentru combinări: $C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}$;
- $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$. 4. $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 2^{n-1}$.
- $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$. 6. $\frac{C_n^k}{k+1} = \frac{C_{n+1}^{k+1}}{n+1}$.

Observații. Fie A o mulțime cu n elemente și B o mulțime cu m elemente. Atunci:

- Dacă $n \leq m$, numărul funcțiilor injective $f: A \rightarrow B$ este egal cu A_m^n .
- Dacă $m = n$, numărul funcțiilor bijective $f: A \rightarrow B$ este egal cu $P_n = n!$.
- Dacă $A, B \subset \mathbb{R}$ și $n \leq m$, numărul funcțiilor strict crescătoare/descrescătoare $f: A \rightarrow B$ este egal cu C_m^n .

3. Binomul lui Newton

$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$, pentru orice $a, b \in \mathbb{C}$ și $n \in \mathbb{N}^*$.

- Dezvoltarea binomială are $n+1$ termeni.
- Termenul general al dezvoltării este $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$ (termenul de rang $k+1$)
- C_n^k se numește **coeficientul binomial** al termenului T_{k+1} .

Probleme propuse

1. Determinați $n \in \mathbb{N}$ pentru care $\frac{n! + (n+1)!}{(n-1)! + n!} = \frac{15}{4}$.

2. Determinați $n \in \mathbb{N}$ pentru care $\frac{n! + (n+1)!}{(n-1)!} \leq 24$.

3. Determinați $x \in \mathbb{N}$, $x \geq 3$ astfel încât $C_{2x-3}^2 = 3$.

Variante bacalaureat 2009

4. Determinați $x \in \mathbb{N}$, $x \geq 2$ astfel încât $C_x^2 + A_x^2 = 30$.

5. Determinați $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ astfel încât $C_n^2 + A_n^2 = 18$.

6. Arătați că $(20!)^2$ divide numărul $40!$.

7. Rezolvați în mulțimea numerelor întregi inecuația $C_{4n+5}^2 > 10$.

Variante bacalaureat, 2008

8. a) Rezolvați ecuația $A_{n+2}^{n^2} + C_n^n = 4$.

b) Determinați $x \in \mathbb{N}$ astfel încât $C_{2x-3}^{11-x^2} = 3$.

Variante bacalaureat, 2008

9. Calculați $C_{15}^{10} + C_{15}^{11} + C_{16}^{12} + C_{17}^{13} - C_{18}^{13}$.

10. Calculați $\frac{C_{2011}^{100} + 2C_{2011}^{101} + C_{2011}^{102}}{C_{2013}^{102}}$.

11. Arătați că $C_{a+b}^a = C_{a+b}^b$, pentru oricare $a, b \in \mathbb{N}^*$.

12. Arătați că $C_{2012}^{100} < C_{2013}^{1912}$.

13. Calculați $C_{10}^0 - C_{10}^2 + C_{10}^4 - C_{10}^6 + C_{10}^8 - C_{10}^{10}$.

14. Determinați $x \in \mathbb{R}$ pentru care $C_{10}^0 + C_{10}^2 + C_{10}^4 + C_{10}^6 + C_{10}^8 + C_{10}^{10} = 2^x$.

15. Determinați n știind că $C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 1024$. $2^n = 1024 \quad (a-b)^n$

16. Calculați $\frac{C_{100}^0 + C_{100}^1 + C_{100}^2 + \dots + C_{100}^{100}}{C_{100}^0 + C_{100}^2 + C_{100}^4 + \dots + C_{100}^{100}}$.

17. Determinați termenul care nu îl conține pe x din dezvoltarea $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{200}$.

18. Fie $a \in \mathbb{R}^*$. Aflați termenul care-l conține pe a^4 din dezvoltarea $\left(a^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{a}}\right)^9$.

Variante bacalaureat 2009

19. Determinați x știind că suma dintre termenii al treilea și al patrulea din dezvoltarea $(2^x - 1)^5$ să fie $20 \cdot 2^x$.

Variante bacalaureat, februarie 2008

20. Determinați numărul termenilor raționali din dezvoltarea $(\sqrt{3} + \sqrt[3]{2})^{100}$.

21. Calculați sumele:

a) $C_{2n+1}^0 - 2C_{2n+1}^1 + 2^2 C_{2n+1}^2 - \dots - 2^{2n+1} C_{2n+1}^{2n+1}$.

b) $C_{20}^0 + 3C_{20}^1 + 3^2 C_{20}^2 + \dots + 3^{20} C_{20}^{20}$.

c) $C_{10}^0 + 5^2 C_{10}^2 + \dots + 5^{10} C_{10}^{10}$.

22. Din cei 18 băieți și 11 fete aflați într-o clasă se alege o echipă de 7 elevi.

a) Determinați în câte moduri se poate alege această echipă.

b) Determinați care este numărul de echipe care se poate forma știind că sunt 4 băieți.

23. Determinați numărul de segmente orientate cu extremitățile în vârfurile unui poligon convex cu 100 de laturi.

24. Aflați numărul de submulțimi ale mulțimii $\{1, 2, 3, \dots, 18\}$ care conțin elementul "1".

25. Determinați probabilitatea ca alegând o funcție $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ aceasta să fie strict crescătoare.

26. Determinați probabilitatea ca, alegând o funcție $f: \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3\}$, aceasta să îndeplinească proprietatea $f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1$.

27. Determinați probabilitatea ca, alegând o funcție $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2\}$, aceasta să fie surjectivă.

28. Un elev se joacă cu cifrele 1, 2, 3, 4 și cu literele a, b, c, d, e, f , formând „cuvinte” cu 5 astfel de semne diferite (cifre sau litere) într-o ordine oarecare.

a) Câte „cuvinte” poate forma elevul?

b) Câte „cuvinte” se pot forma astfel încât primele două semne să fie cifre?

c) Câte astfel de „cuvinte” poate forma elevul astfel încât să folosească numai litere?

29. a) Aflați numărul de submulțimi cu 3 elemente ale mulțimii $A = \{1, 2, \dots, 8\}$.

b) Determinați numărul elementelor unei mulțimi care are 45 de submulțimi cu exact două elemente.

c) Aflați $n \in \mathbb{N}^*$ pentru care mulțimea $A = \{1, 2, \dots, n\}$ are 35 de submulțimi cu exact trei elemente.

d) Se dă mulțimea $A = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Determinați numărul submulțimilor mulțimii A care au 5 elemente, dintre care exact două sunt numere pare.

Variante bacalaureat 2009

30. a) Câte numere de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 2, 4, 6 sau 8?

b) Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5, 7 sau 9?

c) Câte numere de patru cifre, nu neapărat distincte, se pot forma cu cifrele 1, 3, 5, 7, 9?

Variante bacalaureat 2009

31. a) Aflați numărul funcțiilor $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ cu proprietatea $f(1) = f(4)$.

b) Aflați numărul funcțiilor $f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{2, 3, 4\}$ care verifică relația $f(2) = 2$.

c) Aflați numărul funcțiilor $f: \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3\}$ cu proprietatea $f(0) = f(1) = 2$.

d) Aflați numărul funcțiilor $f: \{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ cu proprietatea $f(1) = 1$.

e) Aflați numărul funcțiilor $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ pentru care $f(1)$ este număr par.

f) Aflați numărul funcțiilor strict monotone $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Variante bacalaureat 2009

32. a) Determinați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect.

b) Determinați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de trei cifre, acesta să aibă exact două cifre egale.

c) Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă suma cifrelor egală cu 4.

d) Calculați probabilitatea ca, alegând trei cifre din mulțimea $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, acestea să fie toate pare.

e) Determinați probabilitatea ca, alegând un număr din primele 40 de numere naturale nenule, acesta să nu conțină cifra 7.

f) Determinați probabilitatea ca, alegând un număr din primele 30 de numere naturale nenule, acesta să conțină cifra 1.

g) Se consideră mulțimea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Alegem la întâmplare o submulțime nevidă B a lui A . Determinați probabilitatea ca B să aibă toate elementele impare.

Variante bacalaureat 2009

33. Calculați probabilitatea ca, alegând un element din mulțimea $\{\sqrt{n} \mid n \in \mathbb{N}, n < 100\}$, acesta să fie număr rațional.

34. Se consideră mulțimea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Calculați probabilitatea ca, alegând o pereche (a, b) din produsul cartezian $A \times A$, produsul numerelor a și b să fie par.

Tema 1.9

Vectori în plan. Geometrie vectorială. Geometrie analitică

1. Vectori în plan

Regula paralelogramului: În paralelogramul $ABCD$ avem $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{AC}$.

Regula triunghiului. În triunghiul ABC avem $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$.

Consecință. $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA}$, pentru orice punct O din plan.

Înmulțirea vectorilor cu scalar. Pentru \vec{u} un vector oarecare din plan și pentru un număr real k , $k\vec{u}$ este un vector cu aceeași direcție ca și \vec{u} , de modul egal cu $|k| \cdot |\vec{u}|$ și care are același sens cu \vec{u} pentru $k > 0$ și sens opus lui \vec{u} , pentru $k < 0$.

Teorema medianei (forma vectorială). Punctul M este mijlocul segmentului $[AB]$ dacă și numai dacă, pentru orice punct O din plan, avem $\overline{OA} + \overline{OB} = 2\overline{OM}$.

Punctul care împarte un segment într-un raport dat. Pentru un punct $M \in AB$ astfel încât $\overline{MA} = k\overline{MB}$, avem $\overline{OM} = \frac{1}{1-k}\overline{OA} - \frac{k}{1-k}\overline{OB}$, pentru orice punct O din plan.

Relația lui Leibniz. Punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC dacă și numai dacă $\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} = 3\overline{OG}$, pentru orice punct O din plan.

Relația lui Sylvester. Fie H și O ortocentrul, respectiv centrul cercului circumscris triunghiului ABC . Atunci $\overline{OH} = \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}$.

Produsul scalar dintre vectorii \vec{u} și \vec{v} este $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$.

Proprietățile produsului scalar

$$\begin{aligned} a) \vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{v} \cdot \vec{u}; & b) \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}; & f) \vec{u} \cdot \vec{v} &= 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}. \\ e) \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}; & c) \vec{u} \cdot \vec{v} > 0 &\Leftrightarrow \widehat{(\vec{u}, \vec{v})} < \frac{\pi}{2}; & d) \vec{u} \cdot \vec{v} < 0 &\Leftrightarrow \widehat{(\vec{u}, \vec{v})} > \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. Vectori în planul xOy

Un vector $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ are coordonatele (x, y) și scriem $\vec{u}(x, y)$.

Proprietăți importante. Fie $\vec{u}(x, y)$ și $\vec{v}(x', y')$ doi vectori din planul xOy. Atunci

$$\begin{aligned} 1. |\vec{u}| &= \sqrt{x^2 + y^2}. & 2. \vec{u}(x, y) &= \vec{v}(x', y') \Leftrightarrow x = x', y = y'. \\ 3. \vec{u} \cdot \vec{v} &= xx' + yy'. & 4. \vec{u}(x, y) \perp \vec{v}(x', y') &\Leftrightarrow xx' + yy' = 0. \\ 5. \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) &= \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x'^2 + y'^2}}. & 6. \vec{u}(x', y') \parallel \vec{v}(x', y') &\Leftrightarrow \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'}. \end{aligned}$$

7. Vectorul de poziție al punctului $A(x_A, y_A) \in xOy$ este $\vec{r}_A = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$.

8. Pentru două puncte A și B din planul xOy avem $\overline{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$.

3. Dreapta în plan.

Fie d o dreaptă în planul xOy. Panta dreptei d este tangenta unghiului format de dreaptă cu semiaxa pozitivă Ox . Ecuația generală a unei drepte d este $d: ax + by + c = 0$.

Proprietăți importante.

1. Dreapta care trece prin punctul $A(x_A, y_A)$ și are panta dată m are ecuația $d: y - y_A = m(x - x_A)$.

2. Dacă dreapta d are ecuația $d: y = mx + n$, atunci m este panta dreptei d .

3. Dacă dreapta d are ecuația $d: ax + by + c = 0$, atunci panta dreptei d este egală cu $m = -\frac{a}{b}$, $b \neq 0$.

4. Două drepte sunt paralele dacă și numai dacă au pantele egale, adică $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$.

5. Două drepte d_1 și d_2 sunt perpendiculare dacă și numai dacă $m_1 \cdot m_2 = -1$.

6. Distanța dintre punctul $A(x_A, y_A)$ și dreapta $d: ax + by + c = 0$ este $d(A, d) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

7. Dreptele $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ și $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ coincid dacă $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$.

8. Dreptele $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ și $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ sunt paralele (și neegale) dacă $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.

Chiar dacă nu este scopul acestui capitol, considerăm util să introducem aici câteva aplicații ale determinantilor în geometrie.

9. Fie $A(x_A, y_A)$ și $B(x_B, y_B)$. Ecuația dreptei AB cu scrisă cu ajutorul determinantului este $AB: \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{vmatrix} = 0$.

10. Fie $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ și $C(x_C, y_C)$.

Aria triunghiului ABC , scrisă cu ajutorul determinantului, este egală cu

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\Delta|, \text{ unde } \Delta = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}.$$

11. Punctele $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ și $C(x_C, y_C)$ sunt coliniare dacă și numai dacă

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Probleme propuse

- Se consideră triunghiul ABC și punctele M, N, P astfel încât $\overline{AM} = \overline{MB}$, $\overline{BN} = 2\overline{NC}$ și $\overline{AP} = 2\overline{CP}$. Arătați că punctele M, N, P sunt coliniare.
- Se consideră paralelogramul $ABCD$ și punctele E și F astfel încât $\overline{AE} = \overline{EB}$, $\overline{DF} = 2\overline{FE}$. Demonstrați că punctele A, F și C sunt coliniare.

Variante bacalaureat 2009

- Se consideră triunghiul MNP și punctul A astfel încât $\overline{MA} = \frac{1}{3}\overline{MN}$. Determinați numerele reale a și b pentru care $\overline{PA} = a\overline{PM} + b\overline{PN}$.
- Se consideră paralelogramul $ABCD$ și punctul E astfel încât $\overline{AE} = \frac{1}{4}\overline{AB}$. Determinați numerele reale a și b pentru care $\overline{CE} = a\overline{AB} + b\overline{AD}$.

Variante bacalaureat 2009

- Fie hexagonul regulat $ABCDEF$ de latură 4. Calculați modulul vectorului $\overline{AC} + \overline{BD}$.
- Se consideră triunghiul ABC cu laturile $AB = 3$ și $AC = 4$. Dacă D este punctul de intersecție dintre bisectoarea unghiului A și dreapta AB , determinați numerele reale a și b pentru care $\overline{AD} = a\overline{AB} + b\overline{AC}$.
- Se consideră triunghiul ABC și punctele M, N, P mijloacele laturilor AB, BC , respectiv AC . Arătați că $\overline{AN} + \overline{BP} + \overline{CM} = \vec{0}$.
- Demonstrați că pentru orice punct M din planul paralelogramului $ABCD$ are loc egalitatea $\overline{MA} + \overline{MC} = \overline{MB} + \overline{MD}$.
- Fie M un punct din planul triunghiului ABC astfel încât $\overline{AM} + \overline{BM} + \overline{CM} = \vec{0}$. Arătați că M este centrul de greutate al triunghiului ABC .
- Se consideră patrulaterul $ABCD$ și punctele M și N mijloacele laturilor AB și CD . Arătați că $\overline{MN} = \frac{1}{2}(\overline{BC} + \overline{AD})$.

Variante bacalaureat 2009

- Se consideră triunghiul ABC și punctele M, N, P astfel încât $\overline{AM} = 2\overline{MB}$, $\overline{BN} = 2\overline{NC}$ și $\overline{CP} = 2\overline{PA}$. Arătați că triunghiurile ABC și MNP au același centru de greutate.
- Fie H ortocentrul triunghiului ABC . Arătați că dacă $\overline{AH} + \overline{BH} + \overline{CH} = \vec{0}$, atunci triunghiul ABC este echilateral.
- Se consideră triunghiul ABC , cu lungimile laturilor $AB = c$, $AC = b$ și un punct D astfel încât $\overline{AD} = b\overline{AB} + c\overline{AC}$. Arătați că semidreapta $[AD]$ este bisectoarea unghiului BAC .
- În planul xOy se consideră triunghiul ABC astfel încât $\overline{AB} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$, $\overline{AC} = -5\vec{i} + 12\vec{j}$. Determinați perimetrul triunghiului ABC .
- În planul xOy se consideră vectorii $\vec{u} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$.

a) Determinați un vector \vec{v} de lungime 6 coliniar cu \vec{u} .

b) Determinați un vector \vec{w} de lungime 5 perpendicular pe \vec{u} .

- Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care vectorul $\vec{u} = a\vec{i} - 3\vec{j}$ este paralel cu dreapta $d: x + y - 2 = 0$.

- Se consideră triunghiul ABC astfel încât $\overline{AB} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$, $\overline{AC} = \vec{i} + 2\vec{j}$.

a) Determinați lungimea mediane din A .

b) Determinați vectorul \overline{BG} , unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC .

- Se consideră triunghiul ABC astfel încât $\overline{AB} = -4\vec{i} + 3\vec{j}$, $\overline{AC} = 5\vec{i} + 12\vec{j}$. Determinați lungimea bisectoarei din A .

- Triunghiul ABC are măsura unghiului A de 60° , $AB = 4$ și $AC = 5$. Calculați $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.

Examen Bacalaureat, iunie 2011

- În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele $M(1, -2)$, $N(-3, -1)$, $P(-1, 2)$. Determinați coordonatele lui Q astfel încât $MNPQ$ să fie paralelogram.

Examen Bacalaureat 2011

- Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că vectorii $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ și $\vec{v} = (a-1)\vec{i} + \vec{j}$ au aceeași lungime.
- Fie vectorii $\vec{u} = m\vec{i} + 3\vec{j}$ și $\vec{v} = (m-2)\vec{i} - \vec{j}$. Determinați $m > 0$ astfel încât vectorii \vec{u} și \vec{v} să fie perpendiculari.

- Determinați cosinusul unghiului format de vectorii $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$ și $\vec{v} = 3\vec{i} - \vec{j}$.

- Aflați $a \in \mathbb{R}$ pentru care unghiul dintre vectorii $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ și $\vec{v} = a\vec{i} - \vec{j}$ este de 60° .

- Se consideră triunghiul ABC astfel încât $\overline{AB} = -4\vec{i} + 3\vec{j}$, $\overline{BC} = \vec{i} + 2\vec{j}$. Determinați coordonatele vectorului \overline{AD} , unde D este proiecția lui A pe dreapta BC .

- Arătați că unghiul vectorilor $\vec{u} = 5\vec{i} - 4\vec{j}$ și $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ este obtuz.

Variante bacalaureat 2009

- Se consideră triunghiul ABC astfel încât $\overline{AB} = -4\vec{i} + 3\vec{j}$, $\overline{BC} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$. Determinați lungimea înălțimii din A .

- Paralelogramul $ABCD$ are $AD = 6$, $AB = 4$ și $m(\widehat{ADC}) = 120^\circ$. Calculați $|\overline{AD} + \overline{AB}|$.

Examen Bacalaureat 2010

- Determinați aria triunghiului ABC știind că $\overline{BA} = 2\vec{i} + \vec{j}$ și $\overline{BC} = -\vec{i} + 3\vec{j}$.

- În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele $A(1, 4)$, $B(3, 1)$, $C(-1, 1)$. Determinați coordonatele vectorului \overline{AG} , unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC .

- Se consideră vectorii \vec{u} și \vec{v} astfel încât $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 3$ și $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 120^\circ$. Determinați: a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$; b) $|\vec{u} + \vec{v}|$; c) $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u} + \vec{v}})$.

- Determinați unghiul dintre vectorii \vec{u} și \vec{v} știind că $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 2$ și $\vec{u} \cdot \vec{v} = -3\sqrt{3}$.

- Determinați ecuația medietoarei segmentului AB , unde $A(2, 3)$ și $B(-3, -2)$.

Variante bacalaureat 2009

b) Arătați că dacă b este număr par, atunci aria triunghiului ABC este un număr natural impar.



Tema 1.10

Trigonometrie. Aplicații ale trigonometriei și ale produsului scalar în geometria plană

1. Elemente de trigonometrie

Cercul trigonometric este un cerc de rază

1, cu centrul în originea reperului cartezian, Axa Ox se numește și *axa cosinusurilor*, iar axa Oy se numește *axa sinusurilor*.



Formule trigonometrice fundamentale.

Pentru următoarele formule considerăm numerele reale a, b astfel încât să aibă sens următoarele formule.

1. Formula fundamentală a trigonometriei. $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$.

2. Reducerea la primul cadran.

$$2.1. \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a, \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a, \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \operatorname{ctga}, \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \operatorname{tga}.$$

$$2.2. \sin(\pi - a) = \sin a, \cos(\pi - a) = -\cos a, \operatorname{tg}(\pi - a) = -\operatorname{tga}, \operatorname{ctg}(\pi - a) = -\operatorname{ctga}.$$

$$2.3. \sin(\pi + a) = -\sin a, \cos(\pi + a) = -\cos a, \operatorname{tg}(\pi + a) = \operatorname{tga}, \operatorname{ctg}(\pi + a) = \operatorname{ctga}.$$

$$2.4. \sin(2\pi - a) = -\sin a, \cos(2\pi - a) = \cos a, \operatorname{tg}(2\pi - a) = -\operatorname{tga}, \operatorname{ctg}(2\pi - a) = -\operatorname{ctga}.$$

3. Paritatea funcțiilor trigonometrice.

$$\sin(-a) = -\sin a, \cos(-a) = \cos a, \operatorname{tg}(-a) = -\operatorname{tga}, \operatorname{ctg}(-a) = -\operatorname{ctga}.$$

4. Periodicitatea funcțiilor trigonometrice. Pentru orice $k \in \mathbb{Z}$ avem:

$$\sin(2k\pi + a) = \sin a, \cos(2k\pi + a) = \cos a, \operatorname{tg}(k\pi + a) = \operatorname{tga}, \operatorname{ctg}(k\pi + a) = \operatorname{ctga},$$

$$5. \cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b, \sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$

$$6. \sin 2a = 2 \sin a \cos a, \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1.$$

$$7. \operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tga} \pm \operatorname{tgb}}{1 \mp \operatorname{tgatgb}}, \operatorname{tg} 2a = \frac{2 \operatorname{tga}}{1 - \operatorname{tg}^2 a}.$$

$$8. \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}, \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

9. Transformarea sumelor în produse și a produselor în sume

$$a. \sin a \pm \sin b = 2 \sin \frac{a \pm b}{2} \cos \frac{a \mp b}{2} \quad d. \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$b. \cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}; \quad e. \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

$$c. \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}; \quad f. \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a-b) + \sin(a+b)].$$

10. Pentru $t = \operatorname{tg} \frac{a}{2}$ avem $\sin a = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\operatorname{tga} = \frac{2t}{1-t^2}$, $a \neq k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$.

2. Aplicații ale trigonometriei și ale produsului scalar în geometria plană

Considerăm triunghiul ABC cu notațiile cunoscute: $a = BC$, $b = AC$ și $c = AB$, R este raza cercului circumscris triunghiului, p este semiperimetrul triunghiului ABC , iar r este raza cercului înscris.

Teorema cosinusului. În orice triunghi ABC avem $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Teorema sinusurilor. În orice triunghi ABC avem $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

Formule pentru aria triunghiului. Dacă notăm cu S_{ABC} este aria triunghiului ABC avem:

$$S_{ABC} = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{ab \sin C}{2} = \frac{abc}{4R} = pr, \text{ unde } h_a \text{ este înălțimea corespunzătoare laturii } a.$$

$$\text{Formula lui Heron } S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Formule pentru triunghiul dreptunghic. Dacă triunghiul ABC este dreptunghic cu ipotenuza BC , avem: $S_{ABC} = \frac{bc}{2} = \frac{a \cdot h_a}{2}$, $h_a = \frac{bc}{a}$, iar mediana din A este $m_a = \frac{1}{2} BC$.

Formule pentru triunghiul echilateral. Dacă triunghiul ABC este echilateral cu latura a avem: $S_{ABC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$, $R = \frac{a \sqrt{3}}{3}$, $r = \frac{a \sqrt{3}}{6}$ și mediana din A este $m_a = h_a = \frac{a \sqrt{3}}{2}$.

3. Funcții trigonometrice inverse și ecuații trigonometrice

Funcția arcsin: $[-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ este inversa funcției $\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$.

Proprietăți. 1. $\sin x = y \Leftrightarrow x = \arcsin y$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $y \in [-1, 1]$.

$$2. \arcsin(\sin x) = x, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]; \sin(\arcsin y) = y, \forall y \in [-1, 1].$$

$$3. \arcsin(-x) = -\arcsin x, \forall x \in [-1, 1].$$

4. Pentru $x \in \mathbb{R}$ ecuația $\sin x = y$ are soluții doar dacă $y \in [-1, 1]$, iar mulțimea soluțiilor este egală cu $\{(-1)^k \arcsin y + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

5. Dacă $\sin f(x) = \sin g(x)$, atunci $f(x) = (-1)^k g(x) + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Funcția arccos : $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ este inversa funcției $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$.

Proprietăți. 1. $\cos x = y \Leftrightarrow x = \arccos y$, $x \in [0, \pi]$, $y \in [-1, 1]$.

2. $\arccos(\cos x) = x$, $\forall x \in [0, \pi]$; $\cos(\arccos y) = y$, $\forall y \in [-1, 1]$.

3. $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$, $\forall x \in [-1, 1]$.

4. Pentru $x \in \mathbb{R}$ ecuația $\cos x = y$ are soluții doar dacă $y \in [-1, 1]$, iar mulțimea soluțiilor este egală cu $\{\pm \arccos y + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

5. Dacă $\cos f(x) = \cos g(x)$, atunci $f(x) = \pm g(x) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

6. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, $\forall x \in [-1, 1]$.

7. $\sin(\arccos x) = \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$, $\forall x \in [-1, 1]$.

Funcția arctg : $\mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ este inversa funcției $\operatorname{tg} : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$.

Proprietăți. 1. $\operatorname{tg} x = y \Leftrightarrow x = \arctg y$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $y \in \mathbb{R}$.

2. $\arctg(\operatorname{tg} x) = x$, $\forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; $\operatorname{tg}(\arctg y) = y$, $\forall y \in \mathbb{R}$.

3. $\arctg(-x) = -\arctg x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

4. Pentru $x \in \mathbb{R}$ ecuația $\operatorname{tg} x = y$ are soluții pentru orice $y \in \mathbb{R}$, iar mulțimea soluțiilor este egală cu $\{\arctg y + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

5. Dacă $\operatorname{tg} f(x) = \operatorname{tg} g(x)$, atunci $f(x) = g(x) + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Funcția arcctg : $\mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$ este inversa funcției $\operatorname{ctg} : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$.

Proprietăți. 1. $\operatorname{ctg} x = y \Leftrightarrow x = \operatorname{arcctg} y$, $x \in (0, \pi)$, $y \in \mathbb{R}$.

2. $\operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} x) = x$, $\forall x \in (0, \pi)$; $\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} y) = y$, $\forall y \in \mathbb{R}$.

3. $\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

4. Pentru $x \in \mathbb{R}$ ecuația $\operatorname{ctg} x = y$ are soluții pentru orice $y \in \mathbb{R}$, iar mulțimea soluțiilor este egală cu $\{\operatorname{arcctg} y + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

5. Dacă $\operatorname{ctg} f(x) = \operatorname{ctg} g(x)$, atunci $f(x) = g(x) + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

6. $\arctg x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

7. $\operatorname{tg}(\operatorname{arcctg} x) = \frac{1}{x}$ și $\operatorname{ctg}(\arctg x) = \frac{1}{x}$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$.

Probleme propuse

1. Calculați: a) $S = \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \dots + \sin^2 90^\circ$;

b) $P = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdot \dots \cdot \sin 2011^\circ$.

2. Calculați: a) $S = \sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin 360^\circ$;

b) $P = \cos 1^\circ \cdot \cos 2^\circ \cdot \dots \cdot \cos 2011^\circ$.

3. Calculați: a) $\operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 2^\circ \cdot \dots \cdot \operatorname{tg} 89^\circ$;

b) $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 179^\circ$.

4. Arătați că $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ} = 4$.

5. Fie $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $\operatorname{tga} = 2$. Calculați:

a) $\frac{\sin a + \cos a}{\sin a}$; b) $\frac{2 \sin^2 a + 1}{\cos^2 a}$.

6. Calculați $a = \frac{\operatorname{tg} 78^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ}{1 + \operatorname{tg} 78^\circ \operatorname{tg} 18^\circ}$, $b = \sin 108^\circ \cos 48^\circ - \cos 108^\circ \sin 48^\circ$.

7. Arătați că $\sin 40^\circ \cdot \sin 140^\circ = \cos^2 130^\circ$.

8. Calculați:

a) $\sin 75^\circ \cos 15^\circ$; b) $\cos \frac{23\pi}{12} \cdot \sin \frac{\pi}{12}$; c) $\sin \frac{\pi}{12}$.

9. Determinați cel mai mare element al mulțimii $\{\sin 1, \sin 2, \sin 3\}$.

10. Comparați numerele $\sin 1$ și $\cos 1$.

11. Pentru $\sin a = \frac{3}{5}$, $a \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, calculați: a) $\sin 2a$; b) tga .

12. Știind că $\sin x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ și $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, calculați $\cos x$.

Bacalaureat 2011, model subiect MECTS

13. Fie x un număr real care verifică egalitatea $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2$. Arătați că $\sin 2x = 1$.

Variante bacalaureat 2009

14. Fie mulțimea $A = \left\{0; \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}\right\}$. Care este probabilitatea ca, alegând un element din mulțimea A , acesta să fie soluție a ecuației $\sin^3 x + \cos^3 x = 1$? Bacalaureat 2010.

15. Calculați $\frac{\sin x - \cos x}{\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$.

16. Dacă $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sin a + \cos a = \frac{1}{3}$, calculați $\sin 2a$.

17. Dacă $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sin a + \cos b = 1$ și $\cos a + \sin b = \frac{1}{2}$, calculați $\sin(a+b)$.

18. Pentru $a, b \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ astfel încât $a - b = \frac{\pi}{4}$ arătați că $\operatorname{tg} b - \operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b \cdot \operatorname{tg} a = -1$.

19. Arătați că $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

20. Determinați $x \in [0, \pi)$ știind că numerele $\sin x, \sin 2x, \sin 3x$ sunt în progresie aritmetică.

21. Calculați raza cercului înscris în triunghiul ABC știind că $AB = AC = 5$ și $BC = 8$.
Examen Bacalaureat 2011

22. Se consideră triunghiul ABC cu $AB = 6, AC = 4$ și $A = \frac{2\pi}{3}$. Determinați.

a) Aria triunghiului ABC .

b) Perimetrul triunghiului ABC .

c) Raza cercului circumscris triunghiului ABC .

23. Se consideră triunghiul ABC . Arătați că dacă $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$, atunci triunghiul ABC este dreptunghic.

24. Fie triunghiul ABC . Arătați că dacă $\cos^2 A + \cos^2 B = 2\cos^2 C$, atunci $a^2 + b^2 = 2c^2$.

25. Se consideră triunghiul ABC cu $A = \frac{\pi}{4}$ și $B = \frac{\pi}{3}$. Calculați $\cos C$.

26. Se dă triunghiul ABC cu raza cercului circumscris $R = 6$ și $A = \frac{\pi}{6}$. Calculați BC .

27. Calculați lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , știind că $BC = 3$ și $\cos A = \frac{1}{2}$.

28. Se consideră triunghiul ABC cu laturile $a = 3, b = 3$ și $c = 4$. Calculați.

a) $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$; b) Raza cercului circumscris.

29. Se consideră triunghiul ABC în care $a + c = 2b$. Arătați că $\sin A + \sin C = 2\sin B$.

30. Arătați că dacă în triunghiul ABC este adevărată relația $a^2 \sin 2B = \frac{abc}{R}$, atunci triunghiul este dreptunghic.

31. Calculați sinusul unghiului ascuțit dintre diagonalele dreptunghiului $ABCD$, știind că $AB = 6$ și $BC = 8$.

32. Se consideră paralelogramul $ABCD$ cu $AB = 6, BC = 4$ și $m(\angle A) = 60^\circ$. Aflați distanța de la D la AC .

33. Determinați lungimea celei mai mici înălțimi a triunghiului ABC cu laturile 5, 6 și 7.

34. Determinați lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic cu laturile în progresie aritmetică cu rația 1.

35. Se consideră triunghiul ascuțitunghic ABC în care are loc relația $\sin B + \cos B = \sin C + \cos C$. Demonstrați că triunghiul ABC este isoscel.

Variante bacalaureat 2009

36. Fie ABC un triunghi cu $\operatorname{tg} A = 2, \operatorname{tg} B = 3$. Determinați măsura unghiului C .

Variante bacalaureat 2009

37. Determinați raza cercului înscris și raza cercului circumscris unui triunghi cu laturile 3, 4 și 5.

38. Determinați numerele naturale a pentru care numerele $a, a+1$ și $a+2$ sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic.

Variante bacalaureat 2009

39. Calculați:

a) $\arcsin \frac{1}{2} + \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsin 1$; c) $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} - \arcsin \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$;

d) $\operatorname{arctg}(\sqrt{3}) + \operatorname{arctg}(\sqrt{2}) + \operatorname{arctg}(-\sqrt{2})$; e) $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} - \operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$.

40. Calculați:

a) $\sin \left(2\arcsin \frac{3}{5}\right)$; b) $\cos \left(2\arcsin \frac{1}{3}\right)$; c) $\sin \left(\frac{\pi}{3} - \arcsin \frac{1}{3}\right)$;

d) $\cos \left(\pi - \arcsin \frac{1}{3}\right)$; e) $\operatorname{tg}(2\operatorname{arctg} 3)$.

41. Rezolvați ecuațiile.

a) $\sin x = \frac{1}{2}, x \in [0, 2\pi]$; b) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x \in \mathbb{R}$;

c) $\sin x + \cos x = 1, x \in [0, 2\pi]$; d) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}, x \in (0, \pi)$;

e) $\sin 2x = \cos x, x \in \mathbb{R}$. f) $\sin x = \cos x, x \in [0, 4\pi]$;

g) $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x \in [-\pi, 0]$.

42. Rezolvați ecuațiile.

a) $\sin \left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \left(x - \frac{\pi}{6}\right), x \in \mathbb{R}$.

b) $\operatorname{arctg} \sqrt{3} + \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}, x \in \mathbb{R}$.

c) $3\sin x + \sqrt{3}\cos x = 0, x \in \mathbb{R}$.

d) $\sin x = 1 + \cos^2 x, x \in \mathbb{R}$.

e) $\arcsin \frac{1}{2} + \arcsin x = \frac{\pi}{3}, x \in [-1, 1]$.

Variante bacalaureat 2009

Partea **2**

Algebră (clasele XI-XII)

Tema 2.1. Permutări. Matrice. Determinanți
(clasa a XI-a)

Tema 2.2. Sisteme de ecuații liniare
(clasa a XI-a)

Tema 2.3. Structuri algebrice
(clasa a XII-a)

Tema 2.4. Polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ
(clasa a XII-a)

Tema 2.1

Permutări. Matrice. Determinanți

1. Permutări

Definiția 1. Fie n un număr natural nenul. O funcție bijectivă $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ se numește *permutare* de grad n . Mulțimea permutărilor de grad n conține $n!$ elemente și se notează S_n .

Exemplu de permutare. Funcția $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ este o permutare de grad 4. În acest caz $\sigma(1) = 4$, $\sigma(2) = 1$, $\sigma(3) = 3$ și $\sigma(4) = 2$.

Înmulțirea permutărilor. Fie σ și τ două permutări de grad n . Permutarea $\sigma \circ \tau$, unde „ \circ ” este operația de compunere a funcțiilor se numește *produsul* permutărilor σ și τ și se notează $\sigma\tau$.

Proprietăți

1. Înmulțirea permutărilor este asociativă, deci au sens expresii de forma $\sigma^k = \underbrace{\sigma \cdot \sigma \cdot \sigma \cdots \sigma}_{k \text{ ori}}$, pentru orice $\sigma \in S_n$ și orice număr natural nenul k .

2. Permutarea $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$ are proprietatea $\sigma e = e \sigma = \sigma$, pentru orice $\sigma \in S_n$, și se numește permutarea identică.

3. Dacă $\sigma \in S_n$ atunci permutarea $\begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \in S_n$ se notează σ^{-1} , se numește inversa permutării σ și are proprietatea $\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = e$.

Inversiuni, semnul unei permutări

Definiția 2. Se numește *inversiune* a permutării $\sigma \in S_n$ o pereche ordonată $(i, j) \in \{1, 2, \dots, n\} \times \{1, 2, \dots, n\}$ cu $i < j$ și $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Numărul inversiunilor unei permutări σ se notează $m(\sigma)$ iar numărul $(-1)^{m(\sigma)}$ se notează $\varepsilon(\sigma)$ și se numește *semnul* permutării σ . Dacă $\varepsilon(\sigma) = 1$ (deci $m(\sigma)$ este par) atunci σ se numește *permutare pară*, iar dacă $\varepsilon(\sigma) = -1$ (deci $m(\sigma)$ este impar) se numește *permutare impară*.

Proprietăți

4. $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varepsilon(\tau)$ oricare ar fi $\sigma, \tau \in S_n$.

5. $\varepsilon(e) = 1$.

6. $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$ oricare ar fi $\sigma \in S_n$.

Exemplu. Fie $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Inversiunile permutării σ sunt $(1,2), (1,3),$

$(1,4), (1,5), (3,4), (3,5), (4,5)$, deci $m(\sigma) = 7$, $\varepsilon(\sigma) = -1$ și σ este permutare impară.

Definiția 3. Fie $i, j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ cu $i \neq j$. Permutarea $\sigma \in S_n$ cu proprietățile: $\sigma(i) = j$, $\sigma(j) = i$ și $\sigma(k) = k$ pentru orice $k \in \{1, 2, 3, \dots, n\} - \{i, j\}$ se numește *transpoziție* și se notează (ij) .

Exemplu. $(25) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in S_6$.

Proprietăți

7. $(ij) = (ji)$.
8. $(ij)^{-1} = (ij)$.
9. $(ij)^2 = e$.
10. Orice transpoziție este o permutare impară.

2. Matrice

În cele ce urmează S reprezintă una din mulțimile $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ sau \mathbb{C} , iar m și n sunt două numere naturale nenule.

Definiție 4. O funcție $A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow S$ se numește *matrice* cu m linii și n coloane (sau de tip (m, n)) cu elemente din mulțimea S .

Imaginile unei astfel de funcții se așează într-un tablou (tablou de tip matriceal) cu m linii și n coloane, în care elementul de pe linia i și coloana j reprezintă imaginea perechii (i, j) prin funcția A , element care se notează $a_{ij} \in S$.

Exemplu. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, unde $a_{11} = 1, a_{12} = 0, a_{13} = 2, a_{21} = 2, a_{22} = -1$ și $a_{23} = 1$.

Mulțimea matricelor de tip (m, n) cu elemente din mulțimea S se notează $\mathcal{M}_{m,n}(S)$. O matrice de tip (n, n) se numește *matrice pătratică* de ordin n , iar mulțimea lor se notează $\mathcal{M}_n(S)$.

Operații cu matrice

Adunarea matricelor. Fie $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(S)$, $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$. Matricea $(a_{ij} + b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(S)$ se numește *suma* matricelor A și B și se notează $A + B$.

Înmulțirea cu scalar. Fie $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(S)$ și $x \in S$. Matricea $(xa_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(S)$ se numește *produsul* matricei A cu scalarul x și se notează xA .

Înmulțirea matricelor. Fie $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(S)$ și $B = (b_{jk}) \in \mathcal{M}_{n,p}(S)$. Matricea $(c_{ik}) \in \mathcal{M}_{m,p}(S)$ unde $c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk}$ pentru orice $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ și $k \in \{1, 2, \dots, p\}$ se numește *produsul* matricei A cu matricea B și se notează AB .

Proprietăți

Dacă operațiile de mai jos au sens, atunci:

1. $(AB)C = A(BC)$, deci înmulțirea matricelor, acolo unde are sens, este asociativă.
2. $A(B + C) = AB + AC$ și $(B + C)A = BA + CA$, deci înmulțirea matricelor este distributivă față de adunarea matricelor.

3. Înmulțirea matricelor este operație algebrică pe mulțimea $\mathcal{M}_n(S)$, adică produsul AB are sens pentru orice $A, B \in \mathcal{M}_n(S)$ și, în acest caz, $AB \in \mathcal{M}_n(S)$.

4. Matricea I_n = $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(S)$ are proprietatea $AI_n = I_nA = A$, oricare ar fi

$A \in \mathcal{M}_n(S)$, și se numește *matricea unitate*.

Observație. Cum, în general, $AB \neq BA$, calculul algebric nu respectă regulile obișnuite la numere. Astfel, de exemplu, $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$.

Dacă $AB = BA$, cu $A, B \in \mathcal{M}_n(S)$, atunci $(AB)^k = A^k B^k$ și $(A + B)^k = \sum_{i=0}^k C_k^i A^{k-i} B^i$.

Transpusa unei matrice. Transpusa matricei $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(S)$ este matricea $A' = (b_{ji}) \in \mathcal{M}_{n,m}(S)$ unde $b_{ji} = a_{ij}$ pentru orice $i \in \{1, \dots, m\}$ și $j \in \{1, \dots, n\}$.

Exemplu: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{Z})$ și $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{Z})$.

Teorema lui Hamilton-Cayley

Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(S)$. Atunci $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I_2 = O_2$ unde $O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (în general, matricea de tip (m, n) cu toate elementele egale cu 0 se notează $O_{m,n}$).

3. Determinanți

Definiția 5. Fie $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(S)$. Numărul $\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$ se numește

determinantul matricei A și se notează $\det(A)$ sau $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$. Un determinant de ordin n este determinantul unei matrice pătratrice de ordin n .

• **Determinanți de ordin doi.** $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

• **Determinanți de ordin trei.** $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$.

Proprietăți. Fie $A \in \mathcal{M}_n(S)$. Atunci:

1. $\det(A) = \det(A')$. Datorită acestei propoziții, orice proprietate a unui determinant referitoare la linii este adevărată și pentru coloane.
2. Dacă A are o linie cu toate elementele egale cu 0, atunci $\det(A) = 0$.
3. Dacă matricea B se obține din A prin schimbarea locului a două linii, atunci $\det(B) = -\det(A)$.

4. Dacă A are două linii egale, atunci $\det(A) = 0$.

5. Dacă B se obține din A prin înmulțirea elementelor unei linii cu un număr $\alpha \in S$, atunci $\det(B) = \alpha \det(A)$.

6. Dacă B se obține din A prin adunarea liniei i cu linia j înmulțită cu un număr $\alpha \in S$, atunci $\det(B) = \det(A)$.

7. Δ_{ij} (minorul (ij)) este determinantul matricei obținută din A prin suprimarea liniei i și coloanei j . Numărul $\delta_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ se numește *complementul algebric* al elementului a_{ij} din matricea A . Atunci $\det(A) = a_{11} \delta_{11} + a_{12} \delta_{12} + \dots + a_{1n} \delta_{1n}$ (dezvoltarea după linia i).

8. $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ oricare ar fi $A, B \in M_n(S)$.

4. Aplicații ale determinantilor

• Ecuația unei drepte determinate de două puncte.

Ecuația dreptei AB , unde $A(x_1, y_1)$ și $B(x_2, y_2)$, este
$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

• Aria unui triunghi.

Pentru punctele $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ și $C(x_3, y_3)$ se notează cu $\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ și cu S_{ABC}

aria triunghiului ABC . Atunci: a) $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\Delta|$;

b) A, B, C sunt coliniare $\Leftrightarrow \Delta = 0$.

Probleme propuse

1. Fie permutările $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ și $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, $\sigma, \tau \in S_5$.

a) Calculați $\sigma\tau$ și $\tau\sigma$.

b) Calculați σ^6 .

2. Fie permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in S_5$.

a) Determinați inversiunile lui σ și calculați $\varepsilon(\sigma)$.

b) Determinați σ^{-1} .

3. Fie permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in S_4$.

a) Determinați cel mai mic număr natural nenul k astfel încât $\sigma^k = e$.

b) Calculați σ^{2012} .

c) Rezolvați ecuația $\sigma x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} x$, $x \in S_4$.

4. Se consideră permutarea $\sigma \in S_6$, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Determinați σ^{-1} .

b) Arătați că $m(\sigma) = m(\sigma^{-1})$.

c) Arătați că ecuația $x^4 = \sigma$ nu are soluții în S_6 .

Bacalaureat, 2008

5. Fie permutările $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ și $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, $a, b \in S_5$.

a) Rezolvați ecuația $ax = b, x \in S_5$.

b) Determinați cel mai mic număr natural nenul k astfel încât $(ab)^k = e$.

c) Fie $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât $b^k = e$. Arătați că 6 divide k .

Bacalaureat, 2008

6. Considerăm permutările $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,

$a, b, c \in S_4$.

a) Verificați dacă c este soluția ecuației $ax = xb$.

b) Arătați că $a^4 = b^4$.

c) Determinați o soluție a ecuației $xb^3 = a^3x, x \in S_4$.

Bacalaureat, 2009

7. Fie permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in S_5$ și mulțimea $A = \{\sigma^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

a) Determinați numărul inversiunilor lui σ .

b) Determinați numărul elementelor lui A .

c) Arătați că toate elementele lui A sunt permutări pare.

Bacalaureat, 2009

8. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $A, B \in M_3(\mathbb{R})$.

a) Calculați $A + B$, $2A$ și $A - 2B$.

b) Calculați AB , BA și A^2 .

9. Fie matricele cu elemente reale $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Arătați că dacă $AB = BA$, atunci $A = B$.

10. Fie matricele cu elemente reale $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Arătați că $AB = (BA)'$.

11. Fie matricea cu elemente reale $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Arătați că $X + X^2 + \dots + X^{100} = O_2$.

12. Fie matricea $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Calculați $X + X^2 + \dots + X^{10}$.

13. Fie matricele cu elemente reale $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}$. Determinați valorile reale ale numărului a pentru care $AB = BA$.

14. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calculați A^3 .

b) Calculați $(I_3 - A)(I_3 + A + A^2)$.

15. Fie matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$ și $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

a) Calculați AB și BA .

b) Calculați $(BA)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

16. Pentru o matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ notăm cu $\text{tr}(A)$ suma elementelor de pe diagonala principală a matricei A .

a) Arătați că $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$, oricare ar fi $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ și $\alpha \in \mathbb{C}$.

b) Arătați că $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.

17. Demonstrați teorema lui Hamilton-Cayley: $A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I_2 = O_2$, oricare ar fi $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

18. Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ cu $\det(A) = 0$. Arătați că $A^n = (\text{tr}(A))^{n-1}A$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

19. Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ cu $A^{2012} = O_2$. Arătați că $A^2 = O_2$.

20. Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Arătați că $A^n = \begin{pmatrix} \frac{(a+b)^n + (a-b)^n}{2} & \frac{(a+b)^n - (a-b)^n}{2} \\ \frac{(a+b)^n - (a-b)^n}{2} & \frac{(a+b)^n + (a-b)^n}{2} \end{pmatrix}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.

21. Calculați $\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}^{2013}$.

22. Fie $A = \begin{pmatrix} 5 & -8 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Calculați A^n , $n \in \mathbb{N}^*$.

23. Fie matricea $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculați M^n , $n \in \mathbb{N}^*$.

24. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculați A^n , $n \in \mathbb{N}^*$.

25. Rezolvați ecuația $X^2 = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

26. Rezolvați ecuația $X^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

27. Rezolvați ecuația $X^3 = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

28. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

a) Arătați că există $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $A^2 = aA$.

b) Calculați $(A - A')^{2008}$.

Adaptare bacalaureat, 2008

29. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Calculați $\det(A^2 - 5A - I_2)$.

30. Fie matricele $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$.

a) Verificați egalitatea $\det(A) = \det(B)$.

b) Demonstrați că $A^n - B^n = (2^n - 1)(A - B)$, oricare ar fi numărul $n \geq 1$ natural.

Adaptare bacalaureat, 2011

31. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

a) Calculați $\det(AA')$.

b) Arătați că $\det(A'A) = 0$.

Adaptare bacalaureat, 2008

32. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

a) Arătați că $\det(A'A) \geq 0$.

b) Arătați că dacă $AA' = A'A$ atunci $(a-d)(b-c) = 0$.

33. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

a) Calculați $\det(A)$.

b) Demonstrați că $A^2 - A - 2I_3 = O_3$.

34. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

a) Calculați $\det(A)$.

b) Demonstrați că $A^2 - A - 2I_3 = O_3$.

35. Se consideră matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

a) Arătați că $AB = BA = O_3$.

b) Demonstrați că $(A+B)^{2013} = A^{2013} + B^{2013}$.

36. Se consideră matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Să se calculeze A^4 .

b) Dacă $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $BE_1 = E_1B$ și $BE_2 = E_2B$ arătați că $B = aI_2$, cu $a \in \mathbb{R}$.

Adaptare bacalaureat, 2008

37. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$.

a) Fie $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cu $AX = XA$. Arătați că există $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât $X = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

b) Arătați că $B^n = \begin{pmatrix} \cos nt & -\sin nt \\ \sin nt & \cos nt \end{pmatrix}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

c) Calculați A^{2008} .

Bacalaureat, 2009

38. Calculați complementul algebric al elementului egal cu 1 din matricea $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 5 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

39. Calculați determinantul $\begin{vmatrix} 1+i & 1-i & 0 \\ 1-i & 1+i & 0 \\ 1 & 1 & i \end{vmatrix}$.

40. Dezvoltați după prima coloană determinantul $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$.

41. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\begin{vmatrix} x-3 & x & x \\ x & x-3 & x \\ x & x & x-3 \end{vmatrix} = 0$.

42. a) Arătați că $V_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (c-b)(c-a)(b-a)$.

b) Arătați că $V_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = (d-a)(d-b)(d-c)(c-b)(c-a)(b-a)$.

43. Calculați $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$ și $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$.

44. Fie numerele reale a, b, c , funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 2x + 3$ și determinanții

$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ f(a) & f(b) & f(c) \end{vmatrix}$.

a) Arătați că $A = (a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a)$.

b) Arătați că $A = B$.

c) Arătați că pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, de pe graficul funcției f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

Bacalaureat, 2009

45. Fie punctele $A(0, 6), B(1, 4)$ și $C(-1, 8)$.

a) Arătați că punctele A, B, C sunt coliniare.

b) Scrieți ecuația dreptei AC .

Adaptare bacalaureat, 2009

46. Fie punctele $A(0, 1), B(1, 2)$ și $C(2, 4)$.

a) Scrieți ecuația dreptei AB .

b) Calculați aria triunghiului ABC .

47. Fie punctele $A(1, 0), B(2, -1), C(3, a)$. Determinați valorile reale lui a pentru care aria triunghiului ABC este egală cu 1.

48. Fie punctele $A(-1, 0), B(1, -1), C(a, a+3)$, unde a este un număr întreg.

a) Demonstrați că punctele A, B, C nu sunt coliniare pentru nicio valoare a lui a .

b) Determinați valorile lui a pentru care aria triunghiului ABC este egală cu 1.

49. Fie punctele $A(-1, 0), B(1, -1), C(3, 5)$ și $D(2, 2)$.

a) Demonstrați că punctele B, C, D sunt coliniare.

b) Demonstrați că aria triunghiului ABD este egală cu aria triunghiului ACD .

50. Se consideră punctele $P_k(a_k, b_k), k = 1, 2, 3$ și matricea $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

a) Demonstrați că $\det(AA') \geq 0$, oricare ar fi punctele P_1, P_2, P_3 .

b) Demonstrați că $\det(AA') = 0$ dacă și numai dacă punctele P_1, P_2, P_3 aparțin unei drepte care trece prin origine.

Adaptare bacalaureat, 2010

Tema 2.2

Sisteme de ecuații liniare

1. Matrice inversabile

Definiția 1. Matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se numește *inversabilă* dacă există o matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ astfel încât $AB = BA = I_n$.

Dacă pentru o matrice A există o matrice B cu proprietatea din definiție, atunci B este unică cu această proprietate, se notează cu A^{-1} și se numește *inversa* matricei A .

Teorema 1. Matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ este inversabilă dacă și numai dacă $\det(A) \neq 0$.

Calculul inversei unei matrice. Pentru $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, se notează cu A^* matricea transpusă a complementelor algebrici ai elementelor matricei A . Matricea A^* se numește *adjuncta* lui A .

Dacă $\det(A) \neq 0$, atunci $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$.

Exemplul 1. Dacă $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, atunci $A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Dacă $\det(A) \neq 0$, atunci

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^* = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Observații. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ o matrice inversabilă.

1. Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, atunci $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, atunci $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$.
3. Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, atunci $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, adică matricea A^{-1} nu are neapărat elemente întregi.

2. Ecuații matriceale

Fie $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ două matrice inversabile și $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$. Atunci:

- a) Ecuația $AX = C$, $X \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ are soluția unică $X = A^{-1}C$.
- b) Ecuația $XB = C$, $X \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ are soluția unică $X = CB^{-1}$.
- c) Ecuația $AXB = C$, $X \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ are soluția unică $X = A^{-1}CB^{-1}$.

3. Sisteme liniare

Definiția 2. Sistemul
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
, cu $m, n \in \mathbb{N}^*$, $a_{ij} \in \mathbb{C}$, $b_i \in \mathbb{C}$,

se numește *sistem liniar* cu m ecuații și n necunoscute (sau de tip (m, n)).

Prin *soluție* a sistemului înțelegem un n -uplu ordonat $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ cu proprietatea că numerele x_1, x_2, \dots, x_n verifică cele m ecuații ale sistemului. Matricea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ (adică matricea coeficienților necunoscutelor) se numește *matricea sistemului*.

Definiția 3. Un sistem liniar de tip (m, n) și matrice A se numește *sistem Cramer* dacă $m = n$ și matricea sistemului este inversabilă.

Teoremă 2. Un sistem Cramer are soluție unică. Soluția (x_1, x_2, \dots, x_n) a unui sistem Cramer se determină astfel: $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$, $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$, ..., $x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$, unde Δ este determinantul matricei A a sistemului, iar Δ_i este determinantul matricei obținută din A prin înlocuirea

coloanei „ i ” cu coloana $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ a termenilor liberi.

• Rangul unei matrice

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ și $1 \leq k \leq \min(m, n)$. Un determinant obținut din determinantul lui A prin suprimarea a $m - k$ linii și $n - k$ coloane se numește *minor* de ordinul k al matricei A .

Exemplu 2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -3 & -5 & -7 \\ 4 & 3 & 5 & 9 \end{pmatrix}$. $\Delta_1 = |1|$ este minor de ordinul 1.

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \text{ este minor de ordinul 2 și } \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -3 & -7 \\ 4 & 3 & 9 \end{vmatrix} \text{ este minor de ordin 3.}$$

Definiția 4. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$, $A \neq O_{m,n}$ și $1 \leq r \leq \min(m, n)$. Numărul r se numește *rangul* lui A dacă:

- a) există un minor nenul de ordinul r ;
 - b) toți minorii de ordin strict mai mare decât r (dacă există) sunt nuli.
- Rangul matricei $O_{m,n}$ este 0.

Proprietăți

1. $r = \text{rang}(A) \Leftrightarrow$
 - a) există un minor nenul de ordin k , și
 - b) toți minorii de ordin $r + 1$ (dacă există) sunt nuli.
2. $r = \text{rang}(A) \Leftrightarrow$
 - a) există Δ un minor nenul de ordin r , și
 - b) toți bordații lui Δ (dacă există) sunt nuli. (Un bordat al lui Δ este un minor de ordinul $r + 1$ obținut din adăugarea la Δ a elementelor unei linii și ale unei coloane disponibile din A).

Exemplu 3. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. Rangul lui A este 2 pentru că $\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$,

$$\text{iar bordații lui } \Delta_p \text{ sunt } \Delta_{(33)} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 \text{ și } \Delta_{(34)} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0.$$

• Sisteme liniare

Definiție 5. Un sistem liniar se numește *compatibil* dacă are soluții. Dacă soluția este unică, el se numește *compatibil determinat*, iar în caz contrar *compatibil nedeterminat*. Un sistem liniar fără soluții se numește *incompatibil*.

Dacă A este matricea unui sistem liniar cu coloana termenilor liberi $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, atunci

matricea obținută prin adăugarea la A a coloanei b , se notează \bar{A} și se numește *matricea extinsă* a sistemului.

Teorema 2 (Kronecker-Capelli). Un sistem liniar de matrice A este compatibil dacă și numai dacă $\text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A})$.

• **Stabilirea compatibilității.** Fie un sistem liniar de tip (m, n) .

- Se determină $r = \text{rang}(A)$ și fie Δ_r un minor nenul de ordin r (*minor principal*).
- Dacă $r < m$, se calculează bordații lui Δ_r cu elementele fiecărei linii disponibile din A și coloana termenilor liberi (*minorii caracteristici*). Atunci $\text{rang}(\bar{A}) = \text{rang}(A) \Leftrightarrow$ toți minorii caracteristici sunt nuli (*Teorema lui Rouché*).

• **Rezolvarea sistemelor compatibile.** Fie un sistem liniar de tip (m, n) și matrice A , $r = \text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A})$ și Δ_r un minor principal al lui A .

- Liniile (coloanele) corespunzătoare lui Δ_r se numesc *linii (coloane) principale* ale lui A . Restul se numesc *linii (coloane) secundare*.
- Ecuațiile corespunzătoare liniilor secundare se numesc *ecuații secundare* și se suprimă.
- Necunoscutele corespunzătoare coloanelor secundare se numesc *necunoscute secundare* și se trec în membrul drept ca parametrii.
- Pentru fiecare valoare a parametrilor se obține un sistem Cramer care se rezolvă.
- Dacă $r = n$, atunci sistemul nu are necunoscute secundare și este compatibil determinat. În caz contrar este compatibil nedeterminat.

• Sisteme omogene

Definiție 6. Un sistem liniar se numește *omogen* dacă toți termenii liberi sunt nuli.

Proprietăți. Fie un sistem liniar de tip (m, n) , de matrice A .

3. Un sistem omogen este compatibil. El are soluția $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, numită *soluția nulă*.

4. Un sistem omogen are soluții nenule \Leftrightarrow este compatibil nedeterminat $\Leftrightarrow \text{rang}(A) < n$.

5. Dacă $m = n$, atunci sistemul are soluții nenule $\Leftrightarrow \det(A) = 0$.

• Metoda lui Gauss

Sistemele liniare (S) și (S') cu același număr de necunoscute se numesc echivalente dacă au aceleași soluții.

Deoarece schimbarea locului ecuațiilor într-un sistem liniar (S) transformă sistemul într-unul echivalent putem presupune că $a_{11} \neq 0$. Pentru fiecare $i \in \{2, 3, \dots, m\}$ înmulțim prima ecuație cu $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ și o adunăm cu ecuația „1”. În acest fel, în ecuațiile 2, 3, ... m necunoscuta x_1 are coeficientul 0.

Păstrăm prima ecuație și continuăm procedeul, atât cât este posibil, pentru celelalte necunoscute. Se obține în final un sistem pentru care stabilirea compatibilității este imediată.

Exemple.

$$4. \begin{cases} x+2y-z=2 \\ 2x+y+z=4 \\ -x+3y-z=1 \end{cases} \sim \begin{cases} x+2y-z=2 \\ -3y+3z=0 \\ 5y-2z=3 \end{cases} \sim \begin{cases} x+2y-z=2 \\ y-z=0 \\ 5y-2z=3 \end{cases} \sim \begin{cases} x+2y-z=2 \\ y-z=0 \\ 3z=3 \end{cases}$$

Sistemul are soluție unică: $x = 1, y = 1, z = 1$.

$$5. \begin{cases} x+2y-z+t=2 \\ 2x+y+3z-2t=1 \\ 3x+3y+2z-t=4 \end{cases} \sim \begin{cases} x+2y-z+t=2 \\ -3y+5z-4t=-3 \\ -3y+5z-4t=-2 \end{cases} \sim \begin{cases} x+2y-z-t=2 \\ -3y+5z-4t=-3 \\ 0=1 \end{cases}$$

Sistemul este incompatibil.

$$6. \begin{cases} x+y+z=1 \\ -2x+y+z=4 \\ 3x-3y-3z=-9 \end{cases} \sim \begin{cases} x+y+z=1 \\ 3y+3z=6 \\ -6y-6z=-12 \end{cases} \sim \begin{cases} x+y+z=1 \\ y+z=2 \end{cases}$$

devine $\begin{cases} x+y=1-\alpha \\ y=2-\alpha \end{cases}$ și are soluțiile $(-1, 2-\alpha, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Probleme propuse

1. Determinați valorile reale ale lui a pentru care matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ este inversabilă

în $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

2. Determinați inversa matricei $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 7 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$.

3. Determinați inversa matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{Q})$.

4. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversabilă în $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$. Arătați că $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \Leftrightarrow \det(A) = \pm 1$.

5. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculați A^{-1} .

6. Arătați că matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$ este inversabilă pentru orice valoare reală a lui m .

7. Fie $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

- a) Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât $A^2 = aA + bI_3$.
c) Calculați A^{-1} .

8. Determinați inversa matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

9. Rezolvați ecuațiile matriceale:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

b) $X \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

10. Determinați valorile reale a lui m știind că matricea $A = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ are inversa egală cu adjuncta sa.

11. Determinați inversa adjunctei matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

12. Rezolvați ecuațiile matriceale:

a) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

b) $X \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 4 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$, $X \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$.

13. Rezolvați sistemul $\begin{cases} x+3y+5z=4 \\ 2x+y-3z=3 \\ 5x-2y+7z=3 \end{cases}$.

14. Rezolvați sistemul $\begin{cases} x+y+z=3 \\ -x+2y-2z=9 \\ x+4y+4z=27 \end{cases}$.

15. Rezolvați sistemul $\begin{cases} 2x-3y+5z=9 \\ x+y-2z=-2 \\ 3x+2y+z=7 \end{cases}$.

16. Rezolvați sistemul $\begin{cases} 3x+y+4z=-1 \\ x+3y-2z=5 \\ 4x+3y+7z=2 \end{cases}$.

17. Rezolvați sistemul $\begin{cases} 4x-y-4z=-1 \\ x+5y-4z=-1 \\ 2x+y-z=3 \end{cases}$.

18. Rezolvați sistemul $\begin{cases} x+y-4z=-2 \\ -7x+3y+2z=-2 \\ 5x-4y+z=2 \end{cases}$.

19. Determinați rangul matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

20. Determinați rangul matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 2 & 6 \end{pmatrix}$.

21. Determinați valorile reale ale lui a și b pentru care rangul matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & a & 1 \\ 5 & 2 & 3 & b \end{pmatrix}$

este egal cu 2.

22. Determinați rangul matricei $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

23. Determinați valorile reale a lui m pentru care matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & m \end{pmatrix}$ are rangul 2.

24. Determinați rangul matricei $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & a & 5 \end{pmatrix}$ în funcție de $a \in \mathbb{R}$.

25. Determinați rangul matricei $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & a & 4 & -1 \\ 4 & 3 & 2 & b & 2 \end{pmatrix}$ în funcție de $a, b \in \mathbb{R}$.

26. Determinați rangul matricei $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & a & b & 5 \\ 2 & -2 & 1 & c & 0 \end{pmatrix}$ în funcție de $a, b, c \in \mathbb{R}$.

27. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix}$ unde $a, b, c \in \mathbb{R}^*$.

a) Calculați rangul matricei A .

b) Arătați că există matricele $K \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ și $L \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$ astfel încât $A = K \cdot L$.

c) Arătați că există $d \in \mathbb{R}$ astfel încât $A^2 = dA$.

Bacalaureat, 2009

28. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

a) Calculați A^3 .

b) Aflați rangul matricei $I_3 + A + A'$.

c) Determinați inversa matricei $I_3 + A$.

Bacalaureat, 2008

29. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

a) Determinați rangul matricei A' .

b) Arătați că ecuația $AX = B$ are o infinitate de soluții $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$.

Adaptare bacalaureat, 2008

30. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} a & a+1 & a+2 \\ b & b+1 & b+2 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, cu $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Calculați $\det(A)$.

b) Arătați că $\text{rang}(A) \geq 2, \forall a, b \in \mathbb{R}$.

Adaptare bacalaureat, 2008

31. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calculați $AB + BA$.

b) Arătați că $\text{rang}(A+B) = \text{rang}(A) + \text{rang}(B)$.

c) Arătați că $(A+B)^n = A^n + B^n$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.

32. Arătați că sistemul de ecuații liniare $\begin{cases} x+2y=1 \\ 5x-y=6 \\ 3x-4y=0 \end{cases}$ este incompatibil.

33. Fie sistemul de ecuații liniare $\begin{cases} x+2y+z=1 \\ ax+3y+2z=0 \\ (a+1)x+y+z=0 \end{cases}$, $a \in \mathbb{R}$. Arătați că pentru orice valoare a lui a sistemul are soluție unică.

34. Determinați toate valorile reale ale lui m pentru care sistemul $\begin{cases} mx+y+mz=1 \\ x+y+mz=3 \\ 3x-y-2z=12 \end{cases}$ este incompatibil.

35. Arătați că pentru orice valoare reală a lui m sistemul de ecuații liniare $\begin{cases} 3x-4y+z=1 \\ -x+y+2z=m \\ x+4y+m^2z=-3 \end{cases}$ are soluție unică.

36. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul $\begin{cases} x+y+z=b+1 \\ 2x+y+z=b \\ x+ay-z=-1 \end{cases}$ are cel puțin două soluții.

37. Arătați că sistemul de ecuații liniare $\begin{cases} 2x-y+3z=1 \\ x+y+z=2 \\ x-2y+2z=-1 \end{cases}$ are o infinitate de soluții.

38. Aflați valorile reale ale lui a pentru care sistemul de ecuații liniare $\begin{cases} 2ax+y+z=0 \\ x+2ay+z=0 \\ x+y-2z=0 \end{cases}$ este compatibil nedeterminat.

39. Fie sistemul $\begin{cases} x+2y-3z=3 \\ 2x-y+z=m \\ nx+y-2z=4 \end{cases}$, unde $m, n \in \mathbb{R}$.

a) Determinați m și n pentru care sistemul admite soluție $x_0=2, y_0=2, z_0=1$.

b) Determinați $n \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul are soluție unică.

c) Determinați m și n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

Bacalaureat, 2009

40. Se consideră sistemul $\begin{cases} x+my+2z=1 \\ x+(2m-1)y+3z=1 \\ x+my+(m-3)z=2m-1 \end{cases}$, $m \in \mathbb{R}$.

a) Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul are soluție unică.

b) Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

Adaptare bacalaureat, 2009

41. Se consideră sistemul $\begin{cases} 2x-3y+4z-5t=-1 \\ x+9y+mz+t=3 \\ 5x-6y+10z+nt=p \end{cases}$, $m, n, p \in \mathbb{R}$.

a) Determinați $p \in \mathbb{R}$ astfel încât sistemul admite soluția (x_0, y_0, z_0, t_0) cu $z_0=t_0=0$.

- b) Determinați $m, n, p \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul este compatibil, iar rangul matricei sistemului este egal cu 2.

Bacalaureat, 2008

42. Se consideră sistemul
$$\begin{cases} x - y - mz = 1 \\ mx + y + mz = 1 - m, \text{ unde } m \in \mathbb{R}. \\ mx + 3y + 3z = -1 \end{cases}$$

a) Calculați determinantul matricei sistemului.

b) Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul este incompatibil.

Adaptare bacalaureat, 2009

43. Fie $m \in \mathbb{R}$ și sistemul
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + my + z = 1, \text{ } m \in \mathbb{R} \text{ și } A \text{ matricea sistemului.} \\ x + my + mz = -2 \end{cases}$$

a) Calculați $\det(A)$.

b) Arătați că $\text{rang}(A) \neq 2$ oricare ar fi $m \in \mathbb{R}$.

c) Determinați valorile lui m pentru care sistemul este incompatibil.

Adaptare bacalaureat, 2009

44. Fie sistemul
$$\begin{cases} ax + y + z = 4 \\ x + 2y + 3z = 6, \text{ } a, b \in \mathbb{R}. \\ 3x - y - 2z = b \end{cases}$$

a) Determinați a și b pentru care sistemul are soluția $(1, 1, 1)$.

b) Determinați a și b pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

c) Arătați că pentru orice $a \in \mathbb{Z}$, există $b \in \mathbb{Z}$ astfel încât sistemul admite soluții cu toate componentele întregi.

Bacalaureat, 2009

45. Fie sistemul
$$\begin{cases} x + ay = 1 \\ y + az = a, \text{ } a \in \mathbb{R} \text{ și } A \text{ matricea sistemului.} \\ x + z = 1 \end{cases}$$

a) Arătați că sistemul este compatibil determinat, oricare ar fi $a \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că pentru orice $a \in \mathbb{R}$ soluția sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

Adaptare bacalaureat, 2008

46. Fie sistemul
$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x - y + z = 1, \text{ unde } a, b \in \mathbb{R} \text{ și } A \text{ matricea sistemului.} \\ 7x - y + az = b \end{cases}$$

a) Determinați valorile lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.

b) Determinați valorile lui a și b pentru care sistemul este incompatibil.

Adaptare bacalaureat, 2009

47. Fie sistemul
$$\begin{cases} x + py + p^2z = p^3 \\ x + qy + q^2z = q^3, \text{ unde } p, q, r \in \mathbb{C}. \\ x + ry + r^2z = r^3 \end{cases}$$

a) Calculați determinantul matricei sistemului.

b) Rezolvați sistemul în cazul în care p, q, r sunt distincte două câte două.

- c) Arătați că dacă $(-1, 1, 1)$ este soluție a sistemului, atunci cel puțin două din numere p, q, r sunt egale.

Bacalaureat, 2008

48. Fie sistemul omogen
$$\begin{cases} mx + y + z = 0 \\ x + 3y + 2z = 0, \text{ } m \in \mathbb{R}. \\ -x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

a) Calculați determinantul matricei sistemului.

b) Determinați valorile lui m pentru care sistemul are soluții nenule.

Adaptare bacalaureat, 2009

49. Fie A matricea sistemului
$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 3x - y + mz = 0, \text{ } m \in \mathbb{R}. \\ -x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

a) Calculați $\det(A)$.

b) Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul are soluții nenule.

c) Pentru $m = 0$, arătați că $\frac{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}{z_0^2 - y_0^2 - x_0^2}$ este constantă, pentru orice soluție nebanală

(x_0, y_0, z_0) a sistemului.

Bacalaureat, 2009

50. Fie sistemul
$$\begin{cases} x + ay + (b+c)z = 0 \\ x + by + (c+a)z = 0, \text{ unde } a, b \in \mathbb{R}. \\ x + cy + (a+b)z = 0 \end{cases}$$

a) Calculați determinantul matricei sistemului.

b) Arătați că pentru orice $a, b, c \in \mathbb{R}$, sistemul are soluții nenule.

c) Rezolvați sistemul știind că $a \neq b$ și $(1, 1, 1)$ este soluție a sistemului.

Bacalaureat, 2008

Tema 2.3

Structuri algebrice

1. Grupuri

În cele ce urmează G reprezintă o mulțime nevidă.

Definiție 1. Se numește *lege de compoziție internă* (operația algebrică) pe G o funcție „ $*$ ”: $G \times G \rightarrow G$.

- pentru fiecare pereche $(a, b) \in G \times G$, imaginea $*((a, b))$ se notează $a * b$.
- perechea $(G, *)$ reprezintă o mulțime nevidă G și o lege de compoziție internă „ $*$ ” pe G .

Definiție 2. Fie $(G, *)$. O submulțime nevidă H a lui G se numește *parte stabilă* a lui G în raport cu legea „ $*$ ” dacă $x * y \in H$, oricare ar fi $x, y \in H$.

- dacă $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ este o mulțime finită și „ $*$ ” o lege de compoziție internă pe G , matricea $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ cu $a_{ij} = a_i * a_j$ se numește *tabla operației* „ $*$ ” pe G .

Exemplu: $G = \{0, 1, 2, 3\}$ și $a * b = |a - b|$. Tabla operației „ $*$ ” pe G este

$*$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	1	2
2	2	1	0	1
3	3	2	1	0

Definiție 3. Perechea $(G, *)$ se numește *grup* dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Legea „ $*$ ” este *asociativă*, adică $(x * y) * z = x * (y * z)$, oricare ar fi $x, y, z \in G$.
- Legea „ $*$ ” are *element neutru*, adică există $e \in G$ astfel încât $x * e = e * x = x$, oricare ar fi $x \in G$.
- Toate elementele lui G sunt *simetrizabile*, adică pentru orice $x \in G$ există $x' \in G$ astfel încât $x * x' = x' * x = e$. (x' se numește *simetricul* lui x).

Grupul $(G, *)$ se numește *grup comutativ* (abelian) dacă legea „ $*$ ” este comutativă, adică $x * y = y * x$, oricare ar fi $x, y \in G$.

Exemple de grupuri:

- grupuri numerice: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, (\mathbb{Q}^*, \cdot) , (\mathbb{R}^*, \cdot) , (\mathbb{C}^*, \cdot) , $(\{-1, 1\}, \cdot)$.
- grupuri de matrice: $(M_n(\mathbb{Z}), +)$, $(M_n(\mathbb{Q}), +)$, $(M_n(\mathbb{R}), +)$, $(M_n(\mathbb{C}), +)$.
- grupuri de permutări: (S_n, \cdot) .

Definiție 4. Fie $(G_1, *)$ și (G_2, \circ) două grupuri. O funcție $f: G_1 \rightarrow G_2$ se numește *morfism de grupuri* (sau simplu *morfism*) dacă $f(x * y) = f(x) \circ f(y)$ oricare ar fi $x, y \in G_1$.

Dacă morfismul $f: G_1 \rightarrow G_2$ este funcție bijectivă atunci f se numește *izomorfism*. În acest caz spunem că cele două grupuri sunt *izomorfe*.

Proprietatea 1.

Dacă $(G_1, *)$, (G_2, \circ) sunt două grupuri și $f: G_1 \rightarrow G_2$ este morfism atunci:

- $f(e_1) = e_2$, unde e_1 și e_2 sunt elementele neutre din G_1 și respectiv G_2 .
- $f(x') = (f(x))'$ oricare ar fi $x \in G_1$, unde x' este simetricul lui x în G_1 , iar $(f(x))'$ este simetricul lui $f(x)$ în G_2 .

Exemplu de izomorfism: Fie $(G_1, *) = (\mathbb{R}, +)$, $(G_2, \circ) = ((0, \infty), \cdot)$ și $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = 2^x$. Cum $f(x + y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = f(x) \cdot f(y)$ oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$ și f este bijectivă, rezultă că f este izomorfism.

Definiția 5. Fie grupul $(G, *)$ și H o submulțime nevidă a lui G . H se numește *subgrup* al grupului $(G, *)$ dacă:

- $x * y \in H$ oricare ar fi $x, y \in H$.
- $x' \in H$ oricare ar fi $x \in H$, unde x' este simetricul lui x în grupul G .

Exemple de subgrupuri

- \mathbb{Z} este subgrup al grupului $(\mathbb{Q}, +)$.
- Dacă $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, atunci $H = \{e, \sigma, \sigma^2\}$ este subgrup al grupului (S_4, \cdot) .

Proprietăți: Fie grupul $(G, *)$ și $H \subset G$, $H \neq \emptyset$.

2. Dacă H este subgrup al grupului $(G, *)$, atunci $(H, *)$ este grup și cele două grupuri au același element neutru.

3. H este subgrup al grupului $(G, *)$ dacă și numai dacă $x * y' \in H$ oricare ar fi $x, y \in H$, unde y' este simetricul lui y în grupul G .

4. Dacă H este mulțime finită, atunci H este subgrup al grupului $(G, *)$ dacă și numai dacă H este parte stabilă a lui G în raport cu legea „ $*$ ”.

În cele ce urmează (G, \cdot) este *grup finit*, adică G este mulțime finită.

Teorema lui Lagrange. Dacă H este subgrup al lui G , atunci numărul elementelor lui H divide numărul elementelor lui G .

Proprietatea 5. Fie $x \in (G, \cdot)$. Există un număr natural nenul n astfel încât $x^n = e$, unde e este elementul neutru al grupului G și $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ ori}}$.

Definiție 6. Fie $x \in G$. Cel mai mic numărul natural nenul k cu proprietatea că $x^k = e$ se numește *ordinul* lui x în G și se notează $\text{ord}(x)$.

Exemplu: Fie permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \in S_5$. Cum $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ și

$$\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = e, \text{ rezultă că } \text{ord}(\sigma) = 3.$$

Proprietăți: Fie (G, \cdot) un grup finit cu n elemente, $x \in G$ și $k = \text{ord}(x)$.

6. $x^p = e, p \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow k | p$.

7. $H(x) = \{e, x, x^2, \dots, x^{k-1}\}$ este subgrup cu k elemente al lui G .

8. $k | n$.

9. $x^n = e$.

2. Inele și corpuri

În cele ce urmează A reprezintă o mulțime nevidă, iar „ $*$ ” și „ \circ ” sunt două legi de compoziție interne pe A .

Definiție 7. Tripletul $(A, *, \circ)$ se numește *inel* dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. $(A, *)$ este grup comutativ.

2. a) Legea „ \circ ” este asociativă.

b) Legea „ \circ ” are element neutru.

3. Legea „ \circ ” este distributivă față de legea „ $*$ ”, adică $x \circ (y * z) = (x \circ y) * (x \circ z)$ și $(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$, oricare ar fi $x, y, z \in A$.

Inelul $(A, *, \circ)$ se numește *inel comutativ* dacă legea „ \circ ” este comutativă.

Exemple de inele

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$.

2. $(M_n(A), +, \cdot)$ unde A este unul din inelele $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

În inelul $(A, *, \circ)$, legea „ $*$ ” se numește *adunare* și se notează cu „ $+$ ”, iar legea „ \circ ” se numește *înmulțire* și se notează cu „ \cdot ”. Elementul neutru al adunării se notează 0_A , iar elementul neutru al înmulțirii se notează 1_A .

Definiție 8. Inelul $(A, +, \cdot)$ se numește *corp* dacă $0_A \neq 1_A$ și orice $x \in A, x \neq 0_A$ este simetrizabil în raport cu înmulțirea.

Simetricul elementului $x \in A - \{0_A\}$ în raport cu înmulțirea se notează x^{-1} și se numește *inversul* lui x .

Exemple de corpuri:

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$.

2. $(\mathbb{Q}(\sqrt{d}), +, \cdot)$ unde $d \in \mathbb{Q}, d > 0, \sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$ și $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} | a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Definiție 9. Fie inelele $(A_1, +, \cdot)$ și $(A_2, +, \cdot)$. O funcție $f: A_1 \rightarrow A_2$ se numește *morfism de inele* dacă:

a) $f(x + y) = f(x) + f(y)$, oricare ar fi $x, y \in A_1$.

b) $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$, oricare ar fi $x, y \in A_1$.

c) $f(1_{A_1}) = 1_{A_2}$.

În condițiile de mai sus, dacă A_1 și A_2 sunt corpuri atunci f se numește *morfism de corpuri*.

Un morfism de inele f se numește *izomorfism* dacă f este funcție bijectivă.

Exemple de morfism de inele (corpuri)

$f: (\mathbb{C}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}, +, \cdot), f(z) = \bar{z}$. Într-adevăr,

a) $f(z_1 + z_2) = \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = f(z_1) + f(z_2)$,

b) $f(z_1 \cdot z_2) = \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = f(z_1) \cdot f(z_2)$ oricare ar fi $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

c) $f(1) = \bar{1} = 1$.

Inelul claselor de resturi modulo n

Pentru un număr natural $n, n \geq 2$ și un număr întreg a , se notează cu $a \pmod{n}$ restul împărțirii lui a la n .

Pentru fiecare $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ mulțimea $\{a \in \mathbb{Z} | a \pmod{n} = k\}$ se notează \hat{k} , iar mulțimea $\{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \dots, \hat{n-1}\}$ se notează cu \mathbb{Z}_n . Inelul $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ unde $\hat{a} + \hat{b} = \widehat{a + b}$ și

$\hat{a} \cdot \hat{b} = \widehat{ab}$ oricare ar fi $a, b \in \mathbb{Z}$ se numește *inelul claselor de resturi modulo n* .

Fie $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ și $a \in \mathbb{Z}$. Atunci elementul \hat{a} este inversabil în \mathbb{Z}_n dacă și numai dacă $(a, n) = 1$. Mulțimea elementelor inversabile ale inelului $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ se notează $U(\mathbb{Z}_n)$.

Cum $U(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n - \{\hat{0}\}$ dacă și numai dacă n este număr prim, rezultă că $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ este corp dacă și numai dacă n este număr prim.

Exemple:

1. $U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{8}\}$ și $\hat{1}^{-1} = \hat{1}, \hat{2}^{-1} = \hat{5}, \hat{4}^{-1} = \hat{7}, \hat{5}^{-1} = \hat{2}, \hat{7}^{-1} = \hat{4}$ și $\hat{8}^{-1} = \hat{8}$.

2. $U(\mathbb{Z}_5) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}\}$ și $\hat{1}^{-1} = \hat{1}, \hat{2}^{-1} = \hat{3}, \hat{3}^{-1} = \hat{2}, \hat{4}^{-1} = \hat{4}$.

Probleme propuse

1. Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = x + y - 5$.

a) Arătați că mulțimea $H = \mathbb{Z} \cap [5, \infty)$ este stabilă a lui \mathbb{Z} în raport cu legea „ \circ ”.

b) Arătați că legea „ \circ ” este asociativă.

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = \sqrt{x^5 + y^5 - 1}$.

a) Arătați că legea „ \circ ” este asociativă.

b) Arătați că legea „ \circ ” are element neutru.

3. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = 3xy + 3x + 3y + 2$.

a) Verificați că $x \circ y = 3(x+1)(y+1) - 1, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că mulțimea $(-1, \infty)$ este stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea „ \circ ”.

Simulare bacalaureat, 2002

4. Pe mulțimea numerelor reale se consideră legea „ $*$ ” definită prin $x * y = 2xy - 6x - 6y + 21$.

a) Arătați că mulțimea $(3, \infty)$ este parte stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea „ $*$ ”.

b) Arătați că legea „ $*$ ” este asociativă.

c) Determinați elementul neutru al legii „ $*$ ”.

Bacalaureat, 2000

5. Pe mulțimea numerelor raționale se definește legea asociativă „ \circ ” prin

$$x \circ y = \frac{1}{2}(xy + 2x + 2y).$$

a) Arătați că mulțimea $H = \mathbb{Q} \cap [-2, \infty)$ este stabilă a lui \mathbb{Q} în raport cu legea „ \circ ”.

b) Arătați că legea „ \circ ” are element neutru.

c) Determinați elementele simetrizabile ale lui \mathbb{Q} în raport cu legea „ \circ ”.

6. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = xy - 6x - 6y + a$, unde a este un număr real.

a) Determinați valorile reale ale lui a pentru care legea „ \circ ” este asociativă.

b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care legea „ \circ ” are element neutru.

7. Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = xy + 5x + 5y + a$, unde a este un număr întreg.

a) Determinați valorile întregi ale lui a pentru mulțimea $\mathbb{Z} - \{-5\}$ este parte stabilă a lui \mathbb{Z} în raport cu legea „ \circ ”.

b) Determinați valorile întregi ale lui a pentru care legea „ \circ ” are element neutru.

8. Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = 5xy + 6x + 6y + a$, unde a este un număr întreg.

a) Arătați că pentru $a = 6$, legea „ \circ ” este asociativă.

b) Arătați că pentru $a \neq 6$, legea „ \circ ” nu are element neutru.

9. Pe intervalul $(0, 2)$ se definește legea asociativă „ \circ ” prin $x \circ y = \frac{xy}{2 - x - y + xy}$.

a) Arătați că legea „ \circ ” are element neutru.

b) Arătați că toate elementele din $(0, 2)$ sunt simetrizabile în raport cu legea „ \circ ”.

10. Pe intervalul $(0, \infty)$ se definește legea „ \circ ” prin $x \circ y = \sqrt[3]{x^{\log_3 y}}$.

a) Determinați elementul neutru al legii „ \circ ”.

b) Determinați elementele simetrizabile ale lui $(0, \infty)$ în raport cu legea „ \circ ”.

11. Pe mulțimea \mathbb{Z} se definește legea asociativă „ \circ ” prin $x \circ y = -3xy + 7x + 7y - 14$.

a) Arătați că $e = 2$ este elementul neutru al legii „ \circ ”.

b) Determinați elementele simetrizabile ale lui \mathbb{Z} în raport cu legea „ \circ ”.

12. Fie mulțimea $G = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A \cdot A' = I_2\}$ unde A' este transpusa matricei A .

a) Arătați că G este parte stabilă a lui $M_2(\mathbb{R})$ în raport cu înmulțirea matricelor.

b) Arătați că (G, \cdot) este grup.

Adaptare bacalaureat, 2007

13. Fie $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \in S_5$ și $G = \{\sigma^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

a) Determinați numărul elementelor lui G .

b) Alcătuiți tabla înmulțirii permutărilor pe G .

c) Arătați că (G, \cdot) este grup, unde „ \cdot ” este înmulțirea permutărilor.

14. Se consideră mulțimea $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$.

a) Arătați că M este parte stabilă a lui $M_2(\mathbb{Z})$ în raport cu înmulțirea matricelor.

b) Arătați că oricare ar fi $a \in \mathbb{Z}$, numărul $a^2 + 1$ nu se divide cu 3.

c) Arătați că dacă $A \in M$, atunci $\det(A) \neq -1$.

d) Arătați că dacă $A \in M$ și $A^{-1} \in M$, atunci $\det(A) = 1$.

Bacalaureat, 2007

15. Pe \mathbb{R} se definește legea de compoziție $x * y = x + y + xy$.

a) Arătați că legea este asociativă.

b) Calculați $1 * \frac{1}{2} * \frac{1}{3} * \dots * \frac{1}{2008}$.

Adaptare bacalaureat, 2008

16. Pe mulțimea $(0, \infty)$ se definește legea $x \circ y = \frac{xy}{x + y}$.

a) Arătați că $(x \circ y) \circ z = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)^{-1}$ oricare ar fi $x, y, z \in (0, \infty)$.

b) Arătați că legea „ \circ ” este asociativă.

c) Calculați $\frac{1}{2} \circ \frac{1}{3} \circ \frac{1}{4} \circ \dots \circ \frac{1}{100}$.

Adaptare bacalaureat, 2009

17. Se consideră mulțimea de funcții $G = \{f_{a,b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f_{a,b}(x) = ax + b, a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}\}$.

a) Demonstrați că operația de compunere a funcțiilor de la \mathbb{R} în \mathbb{R} este lege de compoziție pe G .

b) Arătați că G este grup în raport cu operația de compunere a funcțiilor.

Adaptare bacalaureat, 2008

18. Pe mulțimea $G = (0, \infty)$ se consideră legea de compoziție $x * y = x^{\log_3 y}$.

a) Arătați că dacă $x, y \in (0, \infty)$ și $x * y = 1$, atunci $x = 1$ sau $y = 1$.

b) Arătați că $H = (0, \infty) - \{1\}$ este grup în raport cu operația „ $*$ ”.

19. Fie mulțimea $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \ln a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \mid a > 0 \right\}$.

a) Arătați că G este parte stabilă a lui $M_3(\mathbb{R})$ în raport cu înmulțirea matricelor pătratice de ordinul 3.

b) Demonstrați că G este grup în raport cu înmulțirea matricelor.

20. Se consideră mulțimea $G = \left\{ A(x) = \begin{pmatrix} 1+2x & 4x \\ -x & 1-2x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$.
- Arătați că $A(x)A(y) = A(x+y)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$.
 - Demonstrați că G este grup în raport cu înmulțirea matricelor pătrățite de ordinul doi.
 - Calculați $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.
21. Se consideră pe \mathbb{R} legea de compoziție dată de $x * y = xy - 5x - 5y + 30$ și mulțimea $G = (5, \infty)$.
- Determinați $e \in \mathbb{R}$ astfel încât $x * e = e * x = x$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
 - Determinați $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât $x * \alpha = \alpha * x = \alpha$ oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
 - Arătați că G este parte stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea „*“.
 - Arătați că $(G, *)$ este grup abelian.
 - Calculați $1 * 2 * 3 * \dots * 2012$.
 - Arătați că $\underbrace{x * x * x * \dots * x}_{n \text{ ori}} = (x-5)^n + 5$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$. Adaptare bacalaureat, 2010
22. Se consideră pe \mathbb{Z} legea de compoziție dată de $x * y = 6xy + 6x + 6y + a$, unde a este un număr întreg.
- Determinați valorile întregi ale lui a pentru care legea „*“ este asociativă.
 - Arătați că legea nu are element neutru pentru nicio valoare întreagă a lui a .
 - Determinați valorile întregi ale lui a pentru care $((-1) * 2) * ((-1) * 2013) = a$.
 - Pentru $a = 5$, calculați $1 * 2 * 3 * \dots * 2013$.
 - Pentru $a = 5$, determinați valorile întregi ale lui p astfel încât $x * p = p$, oricare ar fi $x \in \mathbb{Z}$.
 - Pentru $a = 5$, calculați $x * x * x = 287$.
23. Pe \mathbb{R} se consideră legea „*“ definită prin $x * y = -2xy + 3x + 3y + a$, unde a este un număr real
- Determinați valorile reale ale lui a pentru care $(1 * 2) * 3 = 1 * (2 * 3)$.
 - Determinați valorile reale ale lui a pentru care legea „*“ este asociativă.
 - Determinați valorile reale ale lui a pentru care legea „o“ are element neutru.
 - Determinați valorile reale ale lui a pentru care mulțimea $\left[-\infty, \frac{3}{2}\right]$ este parte stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea „*“.
 - Pentru $a = -3$, arătați că mulțimea $\left[-\infty, \frac{3}{2}\right]$ este grup în raport cu legea „*“.
 - Pentru $a = -3$, calculați $1 * 2 * 3 * \dots * 2013$.
24. Pe \mathbb{R} se consideră legea „*“ definită prin $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3} + a$, unde a este un număr real.
- Determinați valorile reale ale lui a pentru care $1 * 2 = 0$.
 - Arătați că legea „*“ este asociativă pentru orice valoare reală a lui a .
 - Arătați că legea „*“ are element neutru pentru orice valoare reală a lui a .

- Pentru $a = 2$, arătați că mulțimea \mathbb{R} este grup în raport cu legea „*“.
 - Pentru $a = 3$, calculați $(-1) * 0 * 1 * 2 * 3 * 4$.
 - Pentru $a = 4$, rezolvați în \mathbb{R} ecuația $x * x * x * x * x = 1$.
25. Fie grupurile $(\mathbb{R}, +)$ și $(\mathbb{R}, *)$, unde legea „*“ este definită prin $x * y = x + y + 7$.
- Arătați că funcția $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, *)$, $f(x) = x - 7$, este izomorfism de grupuri.
 - Calculați $1 * 2 * 3 * \dots * 10$.
26. Fie grupurile $(\mathbb{R}, +)$ și (\mathbb{R}, \circ) , unde legea „o“ este definită prin $x \circ y = x + y + 3$.
- Determinați valorile reale ale numerelor a și b astfel încât funcția $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, \circ)$, $f(x) = ax + b$ să fie morfism de grupuri.
 - Calculați $x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n$, unde n este un număr natural nenul și $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.
27. Fie grupurile $((0, \infty), \cdot)$ și (\mathbb{R}, \circ) , unde legea „o“ este definită prin $x \circ y = x + y - 1$.
- Arătați că funcția $f: (\mathbb{R}, \circ) \rightarrow ((0, \infty), \cdot)$, $f(x) = e^{x-1}$ este izomorfism de grupuri.
 - Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $x \circ x \circ x \circ x = 5$.
28. Considerăm grupurile (\mathbb{R}^*, \cdot) și $(\mathbb{R} - \{-1\}, \circ)$, unde legea „o“ este definită prin $x \circ y = xy + x + y$.
- Arătați că funcția $f: (\mathbb{R}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R} - \{-1\}, \circ)$, $f(x) = x - 1$ este izomorfism de grupuri.
 - Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $x \circ x \circ x \circ x = 1$.
29. Fie grupurile $(\mathbb{R} - \{2\}, \circ)$ și $(\mathbb{R} - \{1\}, *)$, unde legile „o“ și „*“ sunt definite prin $x \circ y = xy - 2x - 2y + 6$ și $x * y = xy - x - y + 2$.
- Determinați elementele neutre ale legilor „o“ și „*“.
 - Determinați valorile reale ale numărului a astfel încât funcția $f: (\mathbb{R} - \{2\}, \circ) \rightarrow (\mathbb{R} - \{1\}, *)$, $f(x) = x + a$ să fie morfism de grupuri.
30. Fie grupurile $(\mathbb{Z}, +)$, (\mathbb{Q}^*, \cdot) și funcția $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}^*$, $f(x) = 7^x$.
- Arătați că f este morfism de grupuri.
 - Arătați că f nu este izomorfism.
31. Pe \mathbb{R} se consideră legea $x * y = xy - 4x - 4y + 20$ și mulțimea $G = (4, \infty)$.
- Arătați că $(G, *)$ este parte stabilă a lui \mathbb{R} în raport cu legea „*“.
 - Arătați că $(G, *)$ este grup.
 - Demonstrați că funcția $f: (0, \infty) \rightarrow G$, $f(x) = x + 4$ este izomorfism de la grupul $((0, \infty), \cdot)$ la grupul $(G, *)$.
32. Considerăm grupurile $((0, \infty), \cdot)$ și $((-2, 2), *)$, unde legea „*“ este definită prin
- $$x * y = \frac{4(x+y)}{4+xy}.$$

a) Arătați că funcția $f:((0,\infty),\cdot)\rightarrow((-2,2),*)$, $f(x)=\frac{2x-2}{x+1}$ este izomorfism de grupuri.

b) Rezolvați în $(-2,2)$ ecuația $x*x*x=1$.

33. Fie mulțimea $G=\left\{A(x)=\begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R}\right\}$.

a) Arătați că $A \cdot B \in G$, oricare ar fi $A, B \in G$.

b) Demonstrați că G este grup în raport cu înmulțirea matricelor pătratiche de ordinul 3.

c) Arătați că funcția $f:\mathbb{R} \rightarrow G$, $f(x)=A(x)$ este izomorfism de la grupul $(\mathbb{R},+)$ la grupul (G,\cdot) .

34. Fie mulțimea $G=\left\{A(x)=\begin{pmatrix} 1+5x & 15x \\ -x & 1-3x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R}\right\}$.

a) Arătați că $A(x)A(y)=A(2xy+x+y)$, oricare ar fi $x,y \in \mathbb{R}$.

b) Demonstrați că G este grup în raport cu înmulțirea matricelor pătratiche de ordinul 2.

c) Arătați că funcția $f:\mathbb{R}^* \rightarrow G$, $f(x)=A\left(\frac{x-1}{2}\right)$ este izomorfism de la grupul (\mathbb{R}^*,\cdot) la grupul (G,\cdot) .

35. Fie mulțimea $G=\{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid \det(A)=1\}$.

Arătați că G este subgrup al grupului matricelor inversabile din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Adaptare bacalaureat, 2008

36. Fie n un număr natural nenul și mulțimea $U_n=\{z \in \mathbb{C} \mid z^n=1\}$.

a) Arătați că U_n este subgrup al grupului (\mathbb{C}^*,\cdot) .

b) Demonstrați că dacă H este subgrup cu n elemente al grupului (\mathbb{C}^*,\cdot) , atunci $H=U_n$.

37. Fie permutarea $\sigma=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \in S_5$ și $H=\{\sigma^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

a) Arătați că H este subgrup al grupului (S_5,\cdot) .

b) Determinați ordinul lui σ în grupul (S_5,\cdot) .

38. Fie numărul complex $\varepsilon=\cos\frac{5\pi}{7}+i\sin\frac{5\pi}{7}$.

a) Calculați ε^{42} .

b) Determinați ordinul lui ε în grupul U_{42} .

c) Arătați că mulțimea $H=\{1,\varepsilon,\varepsilon^2,\dots,\varepsilon^{13}\}$ este subgrup al grupului (\mathbb{C}^*,\cdot) .

39. Pe mulțimea numerelor reale se definesc legile „ \circ ” și „ $*$ ” sunt definite prin $x \circ y = xy + x + y$ și $x * y = x + y + a$, unde a este un număr real. Determinați valorile reale ale lui a pentru care legea „ \circ ” este distributivă față de legea „ $*$ ”.

40. Se consideră inelul $(\mathbb{Z},*,\circ)$ unde $x*y=x+y+2$ și $x \circ y = xy + 2x + 2y + 2$, oricare ar fi $x,y \in \mathbb{Z}$.

a) Arătați că $x \circ y = -2 \Leftrightarrow x = -2$ sau $y = -2$.

b) Determinați elementele inversabile ale inelului.

c) Arătați că funcția $f:\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x)=x-2$ este izomorfism de la inelul $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ la inelul $(\mathbb{Z},*,\circ)$.

41. Pe intervalul $(0,\infty)$ se consideră legea „ $*$ ” definită prin $x*y=x^{\log_2 y}$. Arătați că $((0,\infty),\cdot,*)$ este corp, unde legea „ $*$ ” este înmulțirea numerelor reale.

42. Se consideră inelul (\mathbb{Q},\perp,\top) unde $x \perp y = x + y - 5$ și $x \top y = xy - 5x - 5y + 30$.

a) Determinați elementul neutru al legii \perp .

b) Arătați că inelul (\mathbb{Q},\perp,\top) este corp.

c) Arătați că funcția $f:\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, $f(x)=x+5$ este izomorfism de la corpul $(\mathbb{Q},+,\cdot)$ la corpul (\mathbb{Q},\perp,\top) .

d) Calculați $x_1 \top x_2 \top x_3 \top \dots \top x_n$, cu $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Q}$.

43. Determinați elementele inversabile ale inelului $(\mathbb{Z}_{10},+,\cdot)$.

44. Considerăm inelul $(\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_{12}),+,\cdot)$.

a) Arătați că $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_{12})$ este inversabilă $\Leftrightarrow \det(A) \in \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}$.

b) Determinați inversa matricei $B=\begin{pmatrix} \hat{5} & \hat{4} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$ în inelul $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_{12})$.

45. Fie mulțimea $G=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a,b,c \in \mathbb{Z}_4\right\}$.

a) Determinați numărul elementelor mulțimii G .

b) Determinați numărul soluțiilor ecuației $X^2=\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}$, $X \in G$.

Adaptare bacalaureat, 2009

46. Fie mulțimea $G=\left\{x \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_3) \mid x=\begin{pmatrix} a & \hat{2}b \\ b & a \end{pmatrix}\right\}$.

a) Arătați că mulțimea $H=G-\{O_2\}$ este subgrup al grupului matricelor inversabile din $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_3)$.

b) Rezolvați ecuația $X^2=I_2$, $X \in G$.

Adaptare bacalaureat, 2008

47. Fie corpul $(\mathbb{Z}_7,+,\cdot)$ și $H=\{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}_7\}$.

a) Arătați că $H = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{4}\}$.

b) Demonstrați că $\{x^{2000} \mid x \in \mathbb{Z}_7\} = H$.

Adaptare bacalaureat, 2009

48. Fie mulțimea $M = \left\{ \begin{pmatrix} \hat{1} & a & b \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_5 \right\}$.

a) Determinați numărul elementelor mulțimii M .

b) Arătați că $AB \in M$, oricare ar fi $A, B \in M$.

c) Demonstrați că M este subgrup al matricelor inversabile din $\mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_5)$.

Bacalaureat, 2009

49. Se consideră inelul $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ și corpul $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$.

a) Rezolvați în corpul \mathbb{Z}_7 ecuația $\hat{3}x^2 + \hat{4} = \hat{0}$.

b) Determinați ordinul elementului $\hat{3}$ în grupul (\mathbb{Z}_7^*, \cdot) .

c) Arătați că nu există niciun morfism de grupuri $f: (\mathbb{Z}_6, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$ care să verifice relația $f(\hat{2}) = \hat{3}$.

Bacalaureat, 2009

50. Se consideră mulțimea $H = \left\{ \begin{pmatrix} m & n \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \mid m, n \in \mathbb{Z}_5, m = \pm \hat{1} \right\}$.

a) Arătați că H este grup în raport cu înmulțirea matricelor pătrățice de ordinul 2.

b) Determinați numărul elementelor de ordin 2 din grupul (H, \cdot) .

Tema 2.4

Polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ

$(\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p)$

1. Inelul polinoamelor

În cele ce urmează K reprezintă unul din corpurile $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sau \mathbb{Z}_p cu p prim. Dacă X este un obiect care nu este K , atunci o expresie de forma $a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$, cu $n \in \mathbb{N}$ și $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$, se numește *polinom* în nedeterminata X cu coeficienți în K . Mulțimea acestor polinoame se notează $K[X]$. Dacă $f \in K[X]$, atunci scrierea $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ se numește *forma algebrică* a polinomului f , iar elementele $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$ se numesc *coeficienții* polinomului f . Două polinoame din $K[X]$ sunt egale dacă au aceiași coeficienți. Cu operațiile uzuale de adunare și înmulțire a expresiilor algebrice, $K[X]$ este inel, numit inelul polinoamelor în nedeterminata X cu coeficienți în K . Polinomul având toți coeficienții nuli se numește *polinomul nul* și se notează 0 .

• Gradul unui polinom

Polinomul $f = a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X]$ are *gradul* n dacă $a_n \neq 0$ și $a_k = 0$ pentru $k > n$. Scriem $\text{grad}(f) = n$. În acest caz a_n se numește *coeficientul dominant* al lui f și scriem $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$. Polinomul 0 are prin definiție *gradul* $-\infty$.

Proprietăți

1. $\text{grad}(f + g) \leq \max(\text{grad } f, \text{grad } g)$, pentru orice $f, g \in K[X]$.

2. $\text{grad}(fg) = \text{grad}(f) + \text{grad}(g)$, pentru orice $f, g \in K[X]$.

• Funcția polinomială a unui polinom

Dacă $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X]$, atunci funcția $\tilde{f}: K \rightarrow K$ definită prin $\tilde{f}(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ se numește *funcția polinomială* atașată lui f .

Dacă $a \in K$, elementul $\tilde{f}(a) \in K$ se numește *valoarea polinomului* f în punctul a și se notează $f(a)$.

• **Teorema împărțirii cu rest.** Pentru $f, g \in K[X]$, $g \neq 0$, există și sunt unice polinoamele c și $r \in K[X]$ astfel încât $f = gc + r$ și $\text{grad}(r) < \text{grad}(g)$.

În acest caz polinoamele c și r se numesc *câtul* și respectiv *restul împărțirii* lui f la g .

• Împărțirea la $X - a$, $a \in K$

Proprietatea 3. Restul împărțirii lui $f \in K[X]$ la $X - a$ este $f(a)$.

Schema lui Horner. Câtul și restul împărțirii lui $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ la $X - a$ se pot determina după următoarea schemă:

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_1	a_0
a	a_n	$aa_n + a_{n-1}$	$ab_{n-2} + a_{n-2}$	$ab_1 + a_1$	$ab_0 + a_0$
	\parallel	\parallel	\parallel		\parallel	\parallel
	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}		b_0	r

Câtul este $c = b_{n-1}X^{n-1} + b_{n-2}X^{n-2} + \dots + b_1X + b_0$, iar restul este $r = b_0 = f(a)$.

Exemplu 1. $f = 4X^4 - 3X^3 + 2X - 5, g = X + 1$

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 4 & -3 & 0 & 2 & -5 \\ -1 & 4 & -7 & 7 & -5 & 0 \end{array}$$

deci $c = 4X^3 - 7X^2 + 7X - 5$ și $r = 0$.

Divizibilitatea polinoamelor

Definiție 1. Fie $f, g \in K[X]$. Spunem că g divide f dacă există $c \in K[X]$ astfel încât

$f = gc$, adică restul împărțirii lui f la g este egal cu 0 – pentru $g \neq 0$. Scriem $g | f$.

Definiția 2. Fie $f, g \in K[X]$. Polinomul $d \in K[X]$ se numește *un cel mai mare divizor comun* al f și g dacă

$$\begin{array}{ll} a) d | f, \text{ și } & b) d_1 | f \\ d | g & d_1 | g \Rightarrow d_1 | d, d_1 \in K[X]. \end{array}$$

Definiția 3. Fie $f, g \in K[X]$. Polinomul $m \in K[X]$ se numește *un cel mai mic multiplu comun* al lui f și g dacă

$$\begin{array}{ll} a) f | m \text{ și } & b) f | h \\ g | m & g | h \Rightarrow m | h, h \in K[X]. \end{array}$$

Proprietăți

- Pentru orice două polinoame $f, g \in K[X]$ există un c.m.m.d.c. și un c.m.m.m.c.
- $d \in K[X]$ este un c.m.m.d.c. al polinoamelor f și $g \Leftrightarrow a \cdot d$ cu $a \in K^*$ este un c.m.m.d.c. al polinoamelor f și g . Analog pentru c.m.m.m.c.

2. Rădăcinile polinoamelor

Definiție 4. $a \in K$ se numește *rădăcină* a lui $f \in K[X]$ dacă $f(a) = 0$.

Teorema lui Bézout: a este rădăcină a lui $f \Leftrightarrow X - a | f$, deci dacă există $g \in K[X]$ cu $f = (X - a)g$.

Un polinom $f \in K[X]$ de grad n , $f \neq 0$, are cel mult n rădăcini în K . Un polinom $f \in \mathbb{C}[X]$ de grad n , $f \neq 0$, are n rădăcini în \mathbb{C} . Singurul polinom care are mai multe rădăcini decât gradul său este polinomul 0.

Relațiile lui Viète. Fie $f = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$, $a_n \neq 0$. Notăm cu $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ rădăcinile polinomului f . Atunci:

$$\begin{cases} s_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ s_3 = x_1x_2x_3 + \dots + x_{n-2}x_{n-1}x_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n} \\ \dots\dots\dots \\ s_n = x_1x_2x_3\dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

În general, folosim notația $S_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, unde k este un număr natural nenul (sau $k \in \mathbb{Z}$, dacă $a_0 \neq 0$). Avem $S_1 = s_1, S_2 = s_1^2 - 2s_2$.

Exemple

2. Fie $f = 2X^3 - 4X^2 - 5X + 3$ și $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale. Atunci

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{-4}{2} = 2 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{-5}{2} \\ x_1x_2x_3 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

3. Fie $f = X^4 + 2X^2 + 3X - 3$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale. Atunci

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = 2 \\ x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -3 \\ x_1x_2x_3x_4 = -3 \end{cases}$$

• Polinoame cu coeficienți reali, raționali, întregi

Proprietăți

- Dacă polinomul f are toți coeficienții reali și are rădăcina $z \in \mathbb{C}$, atunci are și rădăcina \bar{z} . Numărul rădăcinilor din $\mathbb{C} - \mathbb{R}$ ale lui f este număr par.
- Dacă polinomul f are toți coeficienții raționali și are rădăcina $a + b\sqrt{d}$, unde $a, b, d \in \mathbb{Q}$ și $\sqrt{d} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, atunci f are și rădăcina $a - b\sqrt{d}$.
- Fie polinomul $f = a_nX^n + \dots + a_1X + a_0$, cu $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, $a_n \neq 0$, și numerele $p, q \in \mathbb{Z}$, $(p, q) = 1$. Dacă $\alpha = \frac{p}{q}$ este rădăcină a polinomului f , atunci $p | a_0$ și $q | a_n$.

• Ecuații binome. Ecuația $x^n - a = 0$, $a = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \in \mathbb{C}$, are soluțiile

$$x_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right), \quad k = \overline{0, n-1}.$$

• **Ecuatii reciproce.** Polinomul $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ se numește *reciproc* dacă $a_k = a_{n-k}$ pentru orice $k = \overline{0, n}$. În acest caz ecuația $f(x) = 0$ se numește ecuație *reciprocă*.

Proprietăți

10. Produsul a două polinoame reciproce, câtul și restul împărțirii a două polinoame reciproce sunt polinoame reciproce.

11. Un polinom reciproc de grad impar are rădăcina $x_0 = -1$. Pentru a afla rădăcinile unui polinom reciproc f de grad $2k+1$, se împarte f la $X+1$ și câtul este un polinom reciproc g de grad $2k$. Ecuația $g(x) = 0$ se împarte cu x^k și se face substituția $x + \frac{1}{x} = t$.

Exemplu 4. $f = X^5 - 3X^4 + X^3 + X^2 - 3X + 1 \in \mathbb{C}[X]$.

Din schema lui Horner

1	-3	1	1	-3	1
-1	1	-4	5	-4	0

rezultă că $f = (X+1)g$, unde $g = X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 1$. Avem $g(x) = 0 \Leftrightarrow x^4 - 4x^2 + 5x - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} - 4\left(x + \frac{1}{x}\right) + 5 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 2 - 4t + 5 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$, unde $t = x + \frac{1}{x}$. Rezultă $t_1 = 1$ și $t_2 = 3$, iar cele 4 rădăcini ale lui g rezultă din rezolvarea ecuațiilor $x + \frac{1}{x} = 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 = 0$ și $x + \frac{1}{x} = 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 = 0$.

• Polinoame ireductibile

Definiție 5. Un polinom $f \in K[X]$ de grad mai mare sau egal decât 1 se numește *ireductibil* dacă nu există $g, h \in K[X]$ cu $f = gh$ și $\text{grad}(g) \geq 1$, $\text{grad}(h) \geq 1$.

Proprietăți

12. Orice polinom $f \in K[X]$ de grad 1 este ireductibil.

13. Un polinom $f \in K[X]$ cu $\text{grad}(f) \geq 2$ care are o rădăcină în K este reductibil.

14. Un polinom $f \in K[X]$ cu gradul 2 sau 3 este ireductibil dacă și numai dacă nu are rădăcini în K .

15. Un polinom $f \in K[X]$ este ireductibil dacă și numai dacă polinomul af este ireductibil, oricare ar fi $a \in K^*$.

Observații

1. $f \in \mathbb{C}[X]$ este ireductibil dacă și numai dacă $\text{grad}(f) = 1$.

2. $f \in \mathbb{R}[X]$ este ireductibil în $\mathbb{R}[X]$ dacă și numai dacă $\text{grad}(f) = 1$ sau $\text{grad}(f) = 2$ și $\Delta < 0$.

Teoremă. Fie $f \in K[X]$ cu $\text{grad}(f) \geq 1$. Atunci există în mod unic polinoamele ireductibile $g_1, g_2, \dots, g_n \in K[X]$ astfel încât $f = g_1 g_2 \dots g_n$, unicitatea fiind până la ordinea factorilor și asociere în divizibilitate (g este asociat în divizibilitate cu h dacă există $a \in K^*$ astfel încât $g = ah$).

Probleme propuse

- Determinați gradul polinomului $f = (a^2 - 1)X^4 + (a - 1)X^2 + (a + 2)X + 1 \in \mathbb{C}[X]$ în funcție de $a \in \mathbb{C}$.
- Aflați câtul și restul împărțirii polinomului $f = 3X^4 + 4X^3 + X^2 + 2X - 3$ la polinomul $g = X^2 + X - 2$.
- Fie $f = (X^2 + X + 1)^{20} + (X^2 - X + 1)^{20}$ și $f = a_{40}X^{40} + a_{39}X^{39} + \dots + a_0$ forma sa algebrică.
a) Calculați $f(1)$. b) Determinați $a_0 + a_{40}$.
- Determinați restul împărțirii lui $f = (X^3 + 3X^2 - 5X + 2)^{30}$ la $X - 1$.
- Determinați valorile reale ale lui a pentru care resturile împărțirii polinomului $f = X^3 + 2X^2 + aX - 1$ la $X + 1$ și $X - 2$ sunt egale.
- Determinați, folosind eventual schema lui Horner, câtul și restul împărțirii polinomului $f = X^5 + 4X^3 - 2X + 5$ la:
a) $X + 1$; b) $X - 2$.
- Determinați restul împărțirii polinomului $f = X^{30} - 4X^3 + X + 5$ la polinomul $X^2 - 1$.
- Determinați valorile reale ale lui a pentru care polinomul $f = X^4 - 3X^3 + aX^2 + X + 5$ se divide cu $X + 1$.
- Determinați valorile reale ale lui a și b pentru care polinomul $X^2 + X + 2$ divide polinomul $f = X^4 + X^3 + 3X^2 + aX + b$.
- Fie $f = X^4 + X^2 + 1$ și $g = X^3 + 2X^2 + 2X + 1$. Determinați un c.m.m.d.c. al lui f și g și un c.m.m.m.c. al lui f și g .
- Fie $f = X^3 - 3X^2 + 5X + 7 \in \mathbb{C}[X]$ și $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.
Calculați: a) $x_1 + x_2 + x_3$.
b) $\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{x_1 x_3} + \frac{1}{x_2 x_3}$.
- Fie $f = X^3 + 5X^2 - 2X + 3 \in \mathbb{C}[X]$ și $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.
Calculați: a) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$,
b) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}$,
c) $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$.
- Fie $f = X^4 - 3X^3 + 2X^2 + X + 1 \in \mathbb{C}[X]$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale. Calculați:
a) $(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3)(1 - x_4)$,

$$b) \left(\frac{1}{x_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{x_2} - 1 \right) \left(\frac{1}{x_3} - 1 \right) \left(\frac{1}{x_4} - 1 \right).$$

14. Fie $f = X^3 - X^2 + 3X - 5 \in \mathbb{C}[X]$ și $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale. Calculați:

$$a) x_1^4 + x_2^4 + x_3^4,$$

$$b) x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_2^2 x_1 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + x_3^2 x_2.$$

15. Fie $f = (X^2 + X + 1)^{40} + (X^2 - X + 1)^{40}$ și $f = a_{80}X^{80} + a_{79}X^{79} + \dots + a_1X + a_0$ forma sa algebrică. Calculați:

$$a) a_{15}.$$

$$b) a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{80}.$$

$$c) a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{80}.$$

16. Fie polinomul $f = X^3 + aX^2 + bX + c$ cu $a, b, c \in \mathbb{Q}$.

a) Determinați a, b, c știind că f are rădăcinile $x_1 = x_2 = 1$ și $x_3 = -2$.

b) Să se arate că dacă f are rădăcina $\sqrt{2}$, atunci f are o rădăcină rațională.

c) Să se arate că dacă $a, b, c \in \mathbb{Z}$, iar numerele $f(0)$ și $f(1)$ sunt impare, atunci f nu are rădăcini întregi.

Bacalaureat, 2008

17. Fie $f = X^3 + 4aX^2 + 20X + b$ cu $a, b \in \mathbb{R}$ și $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$ rădăcinile lui.

a) Determinați x_1, x_2, x_3 în cazul $a = 3$ și $b = 0$.

b) Arătați că $(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 = 32a^2 - 120$.

Adaptare bacalaureat, 2008

18. Fie polinomul $f = X^4 - 5X^2 + 4$.

a) Determinați rădăcinile lui f .

b) Determinați polinomul $h \in \mathbb{Q}[X]$ cu $h(0) = 1$ și care are ca rădăcini inversele rădăcinilor lui f .

Adaptare bacalaureat, 2009

19. Fie polinomul $f = 3X^4 - 2X^3 + X^2 + aX - 1$ cu $a \in \mathbb{R}$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.

$$a) \text{ Calculați } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}.$$

b) Determinați restul împărțirii lui f la $(X - 1)^2$.

c) Arătați că polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Bacalaureat, 2008

20. Fie polinomul $f = aX^4 + bX + c$, cu $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

a) Arătați că numărul $f(3) - f(1)$ este par.

b) Arătați că $x - y$ divide $f(x) - f(y)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{Z}$.

Adaptare bacalaureat, 2009

21. Fie polinomul $f = 4X^3 - 12X^2 + aX + b$ cu $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât polinomul $X^2 - 1$ divide f .

b) Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x_1, x_2, x_3 în progresie aritmetică și $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 11$.

Adaptare bacalaureat, 2008

22. Se consideră polinoamele $f = X^3 + 2X^2 + 3X + 45 \in \mathbb{Z}[X]$ și $\hat{f} = X^3 + X + 1 \in \mathbb{Z}_2[X]$.

a) Arătați că \hat{f} este ireductibil în $\mathbb{Z}_2[X]$.

b) Arătați că f nu se poate scrie ca produs de două polinoame cu coeficienți întregi, neconstante.

Adaptare bacalaureat, 2009

23. Fie polinomul $f = X^3 + \hat{2}X^2 + a \in \mathbb{Z}_3[X]$.

a) Calculați $f(\hat{0}) + f(\hat{1}) + f(\hat{2})$.

b) Pentru $a = \hat{2}$, determinați rădăcinile lui f din \mathbb{Z}_3 .

c) Determinați $a \in \mathbb{Z}_3$ pentru care f este ireductibil în $\mathbb{Z}_3[X]$.

Bacalaureat, 2008

24. Fie polinoamele $f, g \in \mathbb{R}[X]$, $f = (X - 1)^{10} + (X - 2)^{10}$ și $g = X^2 - 3X + 2$.

a) Descompuneți g în factori ireductibili în $\mathbb{R}[X]$.

b) Demonstrați că polinomul g nu divide polinomul f .

c) Determinați restul împărțirii lui f la g .

Bacalaureat, 2006

25. Fie $f = X^4 + mX^2 + n$ cu $m, n \in \mathbb{R}$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.

a) Determinați m și n știind că $x_1 = 0$ și $x_2 = 1$.

b) Determinați valorile lui m pentru care $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 2$.

c) Pentru $m = n = 1$, descompuneți f în factori ireductibili în $\mathbb{R}[X]$.

Bacalaureat, 2009

26. Fie polinoamele $f = X^4 + aX^3 + bX^2 - 5X + 6$ și $g = X^3 + X - 2$, unde a și b sunt două numere reale.

a) Determinați valorile lui a și b pentru care g divide f .

b) Pentru $a = -3$ și $b = 1$ descompuneți f în factori ireductibili în $\mathbb{R}[X]$.

Bacalaureat, 2008

27. Se consideră polinomul $f = X^3 - 9X^2 - X + 9$ cu rădăcinile $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$.

a) Determinați câtul și restul împărțirii lui f la $X^2 - 1$.

b) Verificați că $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 18$.

c) Rezolvați ecuația $f(3^x) = 0, x \in \mathbb{R}$.

Bacalaureat, 2009

28. Fie polinomul $f = X^4 + 2X^3 + aX^2 - 2X + 1$ cu $a \in \mathbb{R}$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.

a) Calculați $(1 - x_1^2)(1 - x_2^2)(1 - x_3^2)(1 - x_4^2)$.

b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 8$.

29. Fie polinomul $f = X^3 - 3X + m$ cu $m \in \mathbb{R}$ și x_1, x_2, x_3 rădăcinile sale.

a) Pentru $m = 2$ determinați rădăcinile lui f .

b) Calculați $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$.

c) Determinați valorile lui $m \in \mathbb{R}$ pentru care f are toate rădăcinile întregi.

Bacalaureat, 2009

30. Fie $f = 2X^3 - 4X^2 + aX + 1$ cu $a \in \mathbb{Z}$. Determinați valorile întregi ale lui a pentru care f are cel puțin o rădăcină rațională.

31. Se consideră polinoamele cu coeficienți complecși $f = X^4 - 1$ și $g = X^6 - 1$.

a) Determinați un c.m.m.d.c. și un c.m.m.m.c. pentru f și g .

b) Determinați numărul soluțiilor distincte din \mathbb{C} ale ecuației $f(x)g(x) = 0$.

Adaptare bacalaureat, 2009

32. Determinați restul împărțirii polinomului $f = X^{120} + X^4 + 3X^2 + X + 5$ la polinomul:

a) $g = X^3 - 1$.

b) $h = X^2 + X + 1$.

c) $t = X^5 - 1$.

33. Determinați restul împărțirii polinomului $f = X^{50} + 20X^3 + 5X^2 + 7X + 1$ la polinomul

$g = (X + 1)^2$.

34. Determinați restul împărțirii polinomului $f = X^{30}(X + 1)^{20}$ la polinomul $g = X(X - 1)^2$.

35. Fie $c \in \mathbb{C}[X]$ câtul împărțirii polinomului $f = X^{60} - 30X^2 + X + 8$ la polinomul

$g = (X - 1)^2$. Calculați $c(-1)$.

36. Se consideră polinomul cu coeficienți complecși $f = X^4 - 5X^3 + 3X^2 - X + 1$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.

a) Determinați un polinom $g \in \mathbb{C}[X]$, de grad 4, care are rădăcinile

$1/x_1, 1/x_2, 1/x_3, 1/x_4$.

b) Arătați că polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

37. Se consideră polinomul cu coeficienți complecși $f = X^4 - 2X^3 + X^2 + X - 1$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.

a) Calculați $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$.

b) Arătați că polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

38. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^4 + 2aX^3 + 3bX^2 + cX + d$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile sale.

a) Calculați $(x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2 + (x_3 + 1)^2 + (x_4 + 1)^2$.

b) Știind că polinomul f are toate rădăcinile reale și $a = b = 2$, determinați valorile lui c și d .

39. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^3 - pX^2 + qX - r$, cu $p, q, r > 0$.

a) Arătați că polinomul f are o rădăcină reală strict pozitivă.

b) Știind că polinomul f are toate rădăcinile reale și $p = 3, r = 1$, determinați valoarea lui q .

40. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^4 + aX^3 + aX^2 + bX + c$, unde

$a \in \left(0, \frac{8}{3}\right)$. Arătați că polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

41. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^4 + 4X^3 + 5X^2 - 6X + a$, unde $a \in [9, \infty)$. Arătați că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.

42. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^3 + aX^2 + aX + 1$. Determinați valorile reale ale lui a pentru care polinomul f are toate rădăcinile reale.

43. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^3 - 12X + m$. Determinați valorile reale ale lui m pentru care polinomul f are toate rădăcinile reale.

44. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = X^4 + 2X^3 + aX^2 - 2X + 1$. Determinați valorile reale ale lui a pentru care polinomul f are toate rădăcinile reale.

45. Se consideră polinomul cu coeficienți reali $f = (X^2 + X + 2)^{30} + (X^2 - X + 3)^{30}$ și $f = a_{60}X^{60} + a_{59}X^{59} + \dots + a_0$ forma sa algebrică.

a) Determinați a_1 .

b) Arătați că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.

46. Determinați mulțimea valorilor întregi ale lui a pentru care polinomul $f = X^3 + X^2 + aX + 1$ este ireductibil peste \mathbb{Q} .

47. Se consideră polinomul $f = X^3 + 2X^2 + X + a \in \mathbb{Z}_3[X]$. Arătați că pentru orice $a \in \mathbb{Z}_3$, polinomul f este reductibil peste \mathbb{Z}_3 .

48. Se consideră polinomul $f = X^3 + X^2 + X + a \in \mathbb{Z}_5[X]$. Determinați $a \in \mathbb{Z}_5$ astfel încât polinomul f să fie ireductibil peste \mathbb{Z}_5 .

49. Se consideră polinomul $f = X^8 + 4X^3 + 3 \in \mathbb{Z}_5[X]$.

a) Arătați că polinomul f nu are rădăcini în \mathbb{Z}_5 .

b) Arătați că polinomul f este reductibil peste \mathbb{Z}_5 .

50. Se consideră polinomul $f = X^4 + X^3 + X + 2 \in \mathbb{Z}_3[X]$.

a) Arătați că polinomul f este reductibil peste \mathbb{Z}_3 .

b) Determinați un polinomul $g \in \mathbb{Z}_3[X]$, ireductibil peste \mathbb{Z}_3 , având aceeași funcție polinomială ca f .

Analiză matematică

Clasele XI-XII

3

- Tema 3.1** Limite de șiruri. Limite de funcții. Funcții continue.
Funcții derivabile
- Tema 3.2** Primitive
- Tema 3.3** Funcții integrabile

Tema 3.1

Limite de șiruri. Limite de funcții. Funcții continue. Funcții derivabile

1. Șiruri de numere reale

Șiruri mărginite

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este *mărginit superior* dacă există $M \in \mathbb{R}$ astfel încât $x_n \leq M, \forall n \geq 1$.

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este *mărginit inferior* dacă există $m \in \mathbb{R}$ astfel încât $x_n \geq m, \forall n \geq 1$.

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este *mărginit* dacă este mărginit inferior și superior.

Observație. Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este mărginit dacă există $M > 0$ astfel încât $|x_n| \leq M, \forall n \geq 1$.

Șiruri monotone

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este *crescător* (strict crescător) dacă $x_n \leq x_{n+1}$ (respectiv $x_n < x_{n+1}$), $\forall n \geq 1$.

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este *descrescător* (strict descrescător) dacă $x_n > x_{n+1}$ (respectiv $x_n > x_{n+1}$), $\forall n \geq 1$.

Limite de șiruri. Șiruri convergente/divergente Criterii de convergență

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ are *limita* $\lambda \in \mathbb{R}$ (scriem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda$) dacă orice vecinătate a lui λ conține toți termenii șirului începând de la un anumit rang. Un șir este *convergent* dacă are limită finită; în caz contrar șirul este *divergent*.

Dacă un șir are limită, atunci orice subșir al său are aceeași limită. Un șir care conține două subșiruri cu limite diferite este divergent.

1. Dacă $(x_n)_{n \geq 1}$ este un șir strict crescător și nemărginit, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$.

2. **Criteriul majorării.** Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un șir cu termeni pozitivi, convergent la zero și $(x_n)_{n \geq 1}$ un șir cu proprietatea că există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $|x_n - \lambda| \leq a_n$, pentru orice $n \geq 1$. Atunci $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda$.

Consecință (0□M). Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un șir convergent la zero și $(x_n)_{n \geq 1}$ un șir mărginit. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_n = 0$.

3. **Criteriul cleștelui.** Fie $(a_n)_{n \geq 1}$, $(x_n)_{n \geq 1}$ și $(b_n)_{n \geq 1}$ trei șiruri astfel încât $a_n \leq x_n \leq b_n$ pentru orice $n \geq 1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lambda$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda$.

4. **Teorema lui Weierstrass.** Orice șir monoton și mărginit este convergent.

5. **Criteriul raportului.** Fie $(x_n)_{n \geq 1}$ un șir cu termeni strict pozitivi astfel încât există limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lambda$. Dacă $0 \leq \lambda < 1$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, iar dacă $\lambda > 1$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

6. **Lema Cesaro-Stolz.** Fie șirurile $(a_n)_{n \geq 1}$ și $(b_n)_{n \geq 1}$ astfel încât $(b_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător și nemărginit. Dacă există limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lambda \in \mathbb{R}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_p n^p + a_{p-1} n^{p-1} + \dots + a_1 n + a_0}{b_q n^q + b_{q-1} n^{q-1} + \dots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} \infty \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{a_p}{b_q}\right), & p > q \\ \frac{a_p}{b_q}, & p = q \\ 0, & p < q \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty, & q > 1 \\ 1, & q = 1 \\ 0, & q \in (-1, 1) \\ \text{nu există}, & q \leq -1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) = e.$$

2. Limite de funcții

Mulțimea punctelor de acumulare a unei mulțime nevide $D \subset \mathbb{R}$ se notează D' .

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ are limita $\lambda \in \mathbb{R}$ în punctul $a \in D'$ (scriem $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lambda$) dacă

pentru orice șir $(x_n)_{n \geq 1} \subset D \setminus \{a\}$ astfel încât $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lambda$.

Teoremă. Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție elementară și $a \in D$. Atunci $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Criteriul cu limite laterale. Dacă $a \in \mathbb{R}$ este punct de acumulare al mulțimilor $D \cap (-\infty, a)$ și $D \cap (a, +\infty)$, funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ are limita $\lambda \in \mathbb{R}$ în punctul a dacă și numai dacă f are limită la stânga și la dreapta în a și $\lim_{x \nearrow a} f(x) = \lim_{x \searrow a} f(x) = \lambda$.

Limite fundamentale.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^r - 1}{x} = r$$

Asimptote orizontale. Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât $+\infty$ (respectiv $-\infty$) este punct de acumulare al lui D . Dreapta de ecuație $y = a$, unde $a \in \mathbb{R}$, este *asimptotă orizontală* la graficul funcției spre $+\infty$ (respectiv $-\infty$) dacă $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ (respectiv $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$).

Asimptote oblice. Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât $+\infty$, respectiv $-\infty$, este punct de acumulare al lui D . Dreapta de ecuație $y = mx + n$, unde $m, n \in \mathbb{R}$, $m \neq 0$, este *asimptotă oblică* la graficul funcției spre $+\infty$ (respectiv spre $-\infty$) dacă

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m \\ \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = n \end{cases} \quad \text{și respectiv} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = m \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) = n \end{cases}$$

Asimptote verticale. Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ și a un punct de acumulare al lui D . Dreapta de ecuație $x = a$ este *asimptotă verticală la stânga* (respectiv *dreapta*) pentru graficul funcției f dacă $\lim_{x \nearrow a} f(x) = \pm\infty$ (respectiv $\lim_{x \searrow a} f(x) = \pm\infty$).

3. Funcții continue

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă în punctul $a \in D$ dacă pentru orice șir $(x_n)_{n \geq 1} \subset D$ astfel încât $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Dacă $a \in D \cap D'$, atunci f este continuă în a dacă și numai dacă $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

O funcție $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe D dacă este continuă în fiecare punct $a \in D$.

Continuitate laterală. Dacă $a \in D$ este punct de acumulare pentru $(-\infty, a) \cap D$, se spune că f este *continuă la stânga* în a dacă $\lim_{x \nearrow a} f(x) = f(a)$ (altfel scris $f(a-0) = f(a)$).

Dacă $a \in D$ este punct de acumulare pentru $(a, +\infty) \cap D$, se spune că f este *continuă la dreapta* în a dacă $\lim_{x \searrow a} f(x) = f(a)$ (altfel scris $f(a+0) = f(a)$).

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă în punctul $a \in D \cap D'$ dacă și numai dacă f este continuă la stânga și la dreapta în a , adică dacă și numai dacă $f(a-0) = f(a) = f(a+0)$.

Puncte de discontinuitate. $a \in D$ este punct de discontinuitate de speța I al funcției $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ dacă are limite laterale finite în a și nu este continuă în a . Dacă cel puțin una din limitele laterale nu există sau este $\pm\infty$, a este punct de discontinuitate de speța a II-a.

Operații cu funcții continue. Dacă funcțiile $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue în punctul $a \in D$, atunci $\alpha f + \beta g$, ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), $f \cdot g$, $|f|$, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ sunt funcții continue în a , iar dacă $g(a) \neq 0$, atunci $\frac{f}{g}$ este continuă în a .

Fie funcțiile $f: D \rightarrow E$ și $g: E \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă f este continuă în $a \in D$, iar g este continuă în $b = f(a) \in E$, atunci funcția $g \circ f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă în a . Avem $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right)$ (o funcție continuă comută cu limita).

Proprietatea lui Darboux. O funcție $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ are proprietatea lui Darboux pe intervalul I dacă pentru orice $x_1, x_2 \in I$ și orice λ cuprins între $f(x_1)$ și $f(x_2)$, există $c \in (x_1, x_2)$ astfel încât $f(c) = \lambda$.

O funcție $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ are proprietatea lui Darboux dacă și numai dacă imaginea oricărui interval prin funcția f este tot un interval (cu alte cuvinte, pentru orice interval $J \subset I$, mulțimea $f(J)$ este interval).

O funcție cu proprietatea lui Darboux nu are puncte de discontinuitate de speța I.

Teoremă. Orice funcție continuă $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ are proprietatea lui Darboux.

Proprietăți ale funcțiilor continue.

1. Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă astfel încât $f(a) \cdot f(b) < 0$. Atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât $f(c) = 0$.
2. O funcție continuă, care nu se anulează pe un interval I , are semn constant pe I .
3. **Teorema lui Weierstrass.** O funcție continuă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este mărginită și își atinge marginile (adică există $u, v \in [a, b]$ astfel încât $f(u) = \min f(x)$ și $f(v) = \max f(x)$).
4. O funcție continuă $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este injectivă dacă și numai dacă este strict monotonă.
5. Dacă $f: I \rightarrow J$ este o funcție continuă și bijectivă, atunci $f^{-1}: J \rightarrow I$ este continuă.

4. Funcții derivabile

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ are derivată în punctul $a \in D \cap D'$ dacă există limita $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$ (numită derivata funcției f în punctul $x = a$).

Dacă $f'(a) \in \mathbb{R}$, se spune că f este derivabilă în punctul $x = a$. O funcție $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă pe D dacă este derivabilă în orice punct $a \in D$. În acest caz, funcția $x \rightarrow f'(x)$, $x \in D$, se numește derivata funcției f .

Teoremă. Orice funcție derivabilă într-un punct este continuă în acel punct.

Derivate laterale. Dacă $a \in D$ este punct de acumulare pentru $(-\infty, a) \cap D$, se spune că f are derivată la stânga în a dacă există limita $\lim_{x \nearrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_s(a) \in \mathbb{R}$.

Dacă $a \in D$ este punct de acumulare pentru $(a, +\infty) \cap D$, se spune că f are derivată la dreapta în a dacă există limita $\lim_{x \searrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_d(a) \in \mathbb{R}$.

Funcția $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ are derivată în $a \in D \cap D'$ dacă și numai dacă f are derivate laterale egale în a . În acest caz, $f'_s(a) = f'_d(a) = f'(a)$.

Interpretarea geometrică a derivatei. Derivata unei funcții (derivabile!) într-un punct este egală cu panta tangentei la graficul funcției în acel punct.

Dacă $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție derivabilă, atunci ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = a$ este $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$.

Puncte unghiulare, de întoarcere, de inflexiune. Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă dar care nu este derivabilă în punctul $x = a$, însă are derivate laterale în a . Atunci:

- a este punct unghiular al graficului lui f dacă cel puțin o derivată laterală este finită;
- a este punct de întoarcere al graficului lui f dacă $f'_s(a) = -\infty$ și $f'_d(a) = +\infty$ (sau invers);
- a este punct de inflexiune al graficului lui f dacă $f'_s(a) = f'_d(a) = \pm\infty$.

Observație. Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Un punct $a \in I$ pentru care există $r > 0$ astfel încât $(a - r, a + r) \subset I$ se numește punct de inflexiune al funcției f dacă f are derivată în a (finită sau infinită) și este convexă pe $(a - r, a)$ și concavă pe $(a, a + r)$ sau invers.

Reguli de derivare. Dacă $u: D \rightarrow E$ și $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții derivabile, atunci:

1. $(f + g)' = f' + g'$;
2. $(\alpha f)' = \alpha f'$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
3. $(fg)' = f'g + fg'$;
4. $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$;
5. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$;
6. $(f \circ u)' = f'(u) \cdot u'$.

Observație. Dacă u și v sunt funcții derivabile și $u > 0$, atunci funcția $u^v = e^{v \ln u}$ este derivabilă și $(u^v)' = e^{v \ln u} \left(v' \ln u + v \cdot \frac{u'}{u} \right) = u^v \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$.

Derivarea funcției inverse. Dacă $f: D \rightarrow E$ este derivabilă, bijectivă și $f'(a) \neq 0$, unde $a \in D$, atunci f^{-1} este derivabilă în punctul $b = f(a)$ și $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Formule de derivare a funcțiilor compuse

1. $(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$;
2. $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$, $a > 0$;
3. $(e^u)' = e^u \cdot u'$;
4. $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$;
5. $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$;
6. $(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$;
7. $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$;
8. $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$;
9. $(\operatorname{tg} u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$;
10. $(\operatorname{ctg} u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$;
11. $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$;
12. $(\operatorname{arctg} u)' = \frac{u'}{1+u^2}$;
13. $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$;
14. $(\operatorname{arcctg} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$.

5. Proprietățile funcțiilor derivabile

Puncte de extrem. Fiind dată o funcție $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, un punct $a \in D$ se numește:

- a. punct de maxim local dacă există $U \in \mathcal{V}(a)$ astfel încât $f(x) \leq f(a)$, $\forall x \in U \cap D$;
- b. punct de minim local dacă există $U \in \mathcal{V}(a)$ astfel încât $f(x) \geq f(a)$, $\forall x \in U \cap D$.

Un punct de minim sau maxim local se numește punct de extrem local al funcției f . Dacă a este un punct de extrem local al lui f , valoarea $f(a)$ se numește extrem local al funcției f (minim sau maxim).

Teorema lui Fermat. Fie I un interval deschis și $a \in I$ un punct de extrem local al funcției $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă f este derivabilă în punctul a , atunci $f'(a) = 0$.

Consecință. Dacă $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție derivabilă pe un interval deschis I , atunci punctele de extrem local ale funcției f se găsesc printre zerourile derivatei (punctele critice).

Teorema lui Rolle. Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) , astfel încât $f(a) = f(b)$. Atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât $f'(c) = 0$.

Consecințe. Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă pe un interval I . Atunci:

- C1. Între două zerouri consecutive ale funcției f se află cel puțin un zero al derivatei f' .
- C2. Între două zerouri consecutive ale derivatei f' se află cel puțin un zero al funcției f .

Teorema lui Lagrange. Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe $[a, b]$ și derivabilă pe (a, b) . Atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Consecințe ale teoremei lui Lagrange.

1. O funcție derivabilă cu derivata nulă pe un interval I este constantă pe I .
2. Două funcții derivabile cu derivatele egale pe un interval I , diferă printr-o constantă pe I .
3. Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă.
 - a. Dacă $f'(x) \geq 0$, pentru orice $x \in I$, atunci f este crescătoare pe I ;
 - b. Dacă $f'(x) \leq 0$, pentru orice $x \in I$, atunci f este descrescătoare pe I .
4. Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe I și $a \in I$. Dacă f este derivabilă pe $I \setminus \{a\}$ și există limita $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \lambda \in \mathbb{R}$, atunci f are derivată în $x = a$ și $f'(a) = \lambda$.

Teorema lui Cauchy. Dacă $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue pe $[a, b]$ și derivabile pe (a, b) , astfel încât $g(a) \neq g(b)$, atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

Teorema lui Darboux. Dacă $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă pe un interval I , atunci derivata sa f' are proprietatea lui Darboux pe I .

Rolul derivatei a doua în studiul funcțiilor. Fie $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de două ori derivabilă pe un interval I . Atunci:

- a. Dacă $f''(x) \geq 0$, pentru orice $x \in I$, atunci f este convexă pe I ;
- b. Dacă $f''(x) \leq 0$, pentru orice $x \in I$, atunci f este concavă pe I ;
- c. Dacă $a \in \text{Int}(I)$ este un punct de inflexiune al funcției f , atunci $f''(a) = 0$.

Regula lui L'Hôpital. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, și $I \subset \mathbb{R}$ un interval, cu $(a, b) \subset I \subset [a, b]$. Dacă $x_0 \in [a, b]$ și $f, g: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ sunt două funcții cu proprietățile:

- a. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (respectiv $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = +\infty$);
- b. f și g sunt derivabile și $g'(x) \neq 0, \forall x \in I \setminus \{x_0\}$;
- c. există limita $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda \in \mathbb{R}$;

atunci există $U \in \mathcal{V}(x_0)$ astfel ca $g(x) \neq 0, \forall x \in U \cap I \setminus \{x_0\}$ și limita $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda \in \mathbb{R}$.

Probleme propuse

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - \ln(x^2 + 1)$.
 - a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
 - b) Arătați că funcția f este crescătoare pe \mathbb{R} .
 - c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .
2. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(1 + e^x) - x$.
 - a) Determinați asimptotele graficului funcției f .
 - b) Arătați că funcția f este strict descrescătoare.
 - c) Determinați imaginea (mulțimea valorilor) funcției f .
3. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$.
 - a) Arătați că ecuația $f'(x) = 0$ are exact trei rădăcini reale.
 - b) Arătați că $\frac{1}{f'(1)} + \frac{1}{f'(2)} + \frac{1}{f'(3)} + \frac{1}{f'(4)} = 0$.
 - c) Determinați valoarea minimă a funcției f .
4. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x - x^2 \ln \frac{x+1}{x}$.

a) Calculați $f'(x), x \in (0, \infty)$.

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

5. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - x - 1$.

a) Determinați punctele de extrem ale funcției f .

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

c) Arătați că $e^x \geq x + 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

6. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

a) Calculați $f'(x), x \in \mathbb{R}$.

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + f(x))^x$.

c) Determinați mulțimea valorilor funcției f .

7. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

a) Arătați că funcția f este strict descrescătoare pe \mathbb{R} .

b) Arătați că funcția f este convexă.

c) Determinați asimptotele graficului funcției f .

8. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1}$.

a) Studiați derivabilitatea funcției f .

b) Determinați punctele de extrem local ale funcției f .

c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

9. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

a) Arătați că funcția f este convexă.

b) Calculați limita șirului $(a_n)_{n \geq 1}$, unde $a_n = f(1) + f(2) + \dots + f(n) - \ln(2n + 1)$.

c) Calculați limita șirului $(b_n)_{n \geq 1}$, unde $b_n = f''(1) + f''(2) + \dots + f''(n)$.

10. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f .

b) Determinați punctele de extrem local ale funcției f .

c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

11. Fie $p \geq 2$ un număr natural fixat și funcția $f_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_0(x) = e^{px}$. Pentru fiecare număr natural n se consideră funcția $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = f_{n-1}'(x)$.

a) Arătați că $f_n(x) = p^n e^{px}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ și orice $n \in \mathbb{N}$.

b) Determinați asimptotele graficului funcției f_n .

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_1(a) + f_2(a) + \dots + f_n(a)}{f_n(a)}$, unde $a \in \mathbb{R}$.

12. Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x+2|e^{-\frac{1}{x}}$.

- a) Determinați asimptotele graficului funcției f_n .
- b) Determinați domeniul de derivabilitate al funcției f .
- c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

13. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x + \ln x, & x \in (0, 1] \\ \frac{\ln x}{x-1}, & x \in (1, \infty) \end{cases}$.

- a) Arătați că funcția f este continuă pe $(0, \infty)$.
- b) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 1$.
- c) Calculați $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (f(x))^{\frac{1}{x-1}}$.

4. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+1}{2x+3}$.

- a) Determinați asimptota spre $+\infty$ la graficul funcției f .
- b) Determinați limita șirului $(a_n)_{n \geq 1}$, unde $a_n = f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(n)$.
- c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x^2)$.

5. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$.

- a) Calculați $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.
- c) Determinați mulțimea valorilor funcției f .

6. Se consideră funcția $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

- a) Determinați asimptotele graficului funcției f .
- b) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .
- c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha f\left(\frac{1}{x}\right)$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$.

7. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

- a) Calculați $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$.
- b) Determinați asimptotele graficului funcției f .
- c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x(1 - \ln f(x))$.

8. Se consideră funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1+x) - x$.

- a) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
- b) Arătați că $\ln(1+x) \leq x$, pentru orice $x > -1$.
- c) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

19. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x-1)\sqrt{|x|}$.

- a) Studiați derivabilitatea funcției f .
- b) Determinați punctele de extrem local ale funcției f .
- c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

20. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x + 4}$.

- a) Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul funcției f .
- b) Arătați că $f^2(x) \cdot f'(x) = x^2 + 1$, pentru orice $x > 0$.
- c) Determinați derivata funcției f în punctul $x = -1$.

21. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ \sqrt{|x-1|}, & x \geq 0 \end{cases}$.

- a) Studiați continuitatea funcției f .
- b) Determinați punctele unghiulare și de întoarcere ale graficului funcției f .
- c) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 5$.

22. Se dă funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x^2 + 1} - x$.

- a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 0$.
- b) Arătați că graficul funcției admite asimptotă spre $+\infty$.
- c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n))^n$.

23. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{a - \cos x}{x^2}, & x < 0 \\ x + be^x, & x \geq 0 \end{cases}$.

- a) Calculați $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x)$.
- b) Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care funcția f este continuă pe \mathbb{R} .
- c) Pentru $a = 1$ și $b = \frac{1}{2}$, studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.

24. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x + \cos x, & x < 0 \\ x^2 + e^x, & x \geq 0 \end{cases}$.

- a) Calculați $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.
- c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(\sqrt[n]{2}) - f(1))$.

25. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$.

- a) Determinați asimptotele graficului funcției f .
- b) Arătați că funcția f este strict descrescătoare.
- c) Arătați că funcția f este mărginită.

26. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x+1, & x \geq 0 \end{cases}$.

a) Arătați că f nu are proprietatea lui Darboux.

b) Calculați $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left(f\left(\frac{1}{x^2}\right) - f\left(\frac{1}{x}\right) \right)$.

c) Arătați că f are derivată în punctul $x = 0$ și determinați $f'(0)$.

27. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + e^x$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f .

b) Arătați că funcția f este bijectivă.

c) Calculați $(f^{-1})'(1)$, unde f^{-1} reprezintă inversa funcției f .

28. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

b) Arătați că funcția f este derivabilă pe \mathbb{R} .

c) Demonstrați că funcția f nu este monotonă pe nicio vecinătate a lui 0.

29. Fie funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{arctg} x$ și $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} + xg(x) \right)$.

b) Calculați $f'(x) + g'(x)$, $x \in \mathbb{R}^*$.

c) Arătați că $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \cdot \operatorname{sgn}(x)$, pentru orice $x \in \mathbb{R}^*$.

30. Se consideră funcția $f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

a) Calculați $f'(x)$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

b) Studiați monotonia funcției f .

c) Determinați mulțimea valorilor funcției f .

31. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x - x$.

a) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

b) Determinați cel mai mic număr real a pentru care $f(x) \leq a$, pentru orice $x \in (0, \infty)$.

c) Aflați numărul de soluții reale al ecuației $f(x) = m$, unde m este un parametru real.

32. Se consideră funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \ln(1+x)$.

a) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

b) Determinați mulțimea valorilor funcției f .

c) Fie șirul $(a_n)_{n \geq 0}$ definit prin $a_0 > 0$ și $a_{n+1} = f(a_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

33. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x + 1}$.

a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.

b) Arătați că funcția f este surjectivă.

c) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, definit prin $x_0 = \frac{1}{2}$ și $x_{n+1} = f(x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, este convergent.

34. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \ln x$.

a) Arătați că funcția f este convexă.

b) Demonstrați că pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ există un singur punct $c_n \in (n, n+1)$ astfel încât $f(n+1) - f(n) = f'(c_n)$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.

35. Se consideră funcția $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos \sqrt{x}$.

a) Arătați că funcția f nu are limită la $+\infty$.

b) Determinați $f'_d(0)$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n+1) - f(n))$.

36. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

a) Calculați $f'(x)$, $x \in (0, \infty)$.

b) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

c) Comparați numerele $3^{\sqrt{5}}$ și $5^{\sqrt{3}}$.

37. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x+2} - \sqrt[3]{x}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha f(x)$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$.

b) Determinați punctele de extrem local ale funcției f .

c) Arătați că $\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{7} > 2\sqrt[3]{5}$.

38. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 e^x$.

a) Determinați punctele de extrem local ale funcției f .

b) Arătați că $f^{(n)}(x) = (x^2 + 2nx + n(n-1))e^x$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice $x \in \mathbb{R}$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(0) + f''(0) + \dots + f^{(n)}(0)}{n^3}$.

39. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin \lambda x$, unde $\lambda \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

a) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

b) Arătați că $f^{(n)}(x) = \lambda^n \sin\left(\lambda x + \frac{n\pi}{2}\right)$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice $x \in \mathbb{R}$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(0)$.

40. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$.

a) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(0) + f(1) + \dots + f(n))^n$.

b) Determinați punctele de extrem local ale funcției f .

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} f^{(k)}(1)$.

41. Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x(f(x) - 1)$.

b) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

c) Determinați valorile parametrului real m pentru care ecuația $f(x) = mx^2$ are exact trei rădăcini reale.

42. Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$.

a) Calculați $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}^*$.

b) Determinați valorile parametrului real m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact două rădăcini reale.

c) Se consideră șirul $(a_n)_{n \geq 0}$ definit prin $a_0 > 0$ și $a_{n+1} = f(a_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_n) - a_n)$.

43. Se consideră funcția $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{x\} \cdot (1 - \{x\})$, unde $\{x\}$ reprezintă partea fracționară a numărului real x .

a) Calculați $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x)$.

b) Determinați domeniul de continuitate al funcției f .

c) Determinați punctele în care funcția f nu este derivabilă.

Bacalaureat 2009, varianta 28

44. Se consideră mulțimea de funcții

$$\mathcal{M} = \{f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ este de două ori derivabilă, } f(0) = 0, f'(0) = 1\}.$$

a) Arătați că funcția $u: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x) = e^x \sin x$ aparține mulțimii \mathcal{M} .

b) Arătați că, dacă $f \in \mathcal{M}$, atunci $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + f(x))^{\frac{1}{x}} = e^{f'(0)}$.

c) Demonstrați că, dacă $f \in \mathcal{M}$ și $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^n(x) - x^n}{x^{n+1}} = \frac{nf''(0)}{2}$.

Bacalaureat 2009, varianta 67

45. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ x^3, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$.

a) Arătați că $|f(x)| \leq |x|$, pentru orice $x \in [-1, 1]$.

b) Arătați că funcția f este continuă în punctul $x = 0$.

c) Arătați că funcția f nu este derivabilă în punctul $x = 0$.

Bacalaureat 2009, varianta 63

46. Fie mulțimea $A = \mathbb{R} \setminus \{1, 2, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \dots + \frac{1}{x-n}$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f .

b) Dacă $a \in \mathbb{R}$, determinați numărul soluțiilor reale ale ecuației $f(x) = a$.

c) Determinați numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcției f .

Bacalaureat 2009, varianta 96

47. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

a) Arătați că f este bijectivă.

b) Calculați $(f^{-1})'(\ln 2)$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{\ln(n^2 + 1)}$.

48. Se consideră funcția $f: (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f .

b) Calculați $f'(x)$, $x \in (1, \infty)$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(1) + f(2) + \dots + f(n))$.

49. Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

a) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

b) Determinați asimptotele graficului funcției f .

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (f(n+1) - f(n))$.

Bacalaureat 2009, varianta 84

50. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$.

a) Arătați că funcția f este continuă pe \mathbb{R} .

b) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right) \right)$.

51. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

b) Studiați continuitatea funcției f .

c) Studiați derivabilitatea funcției f .

52. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x^2}$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f .

b) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

a) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha (f(n+1) - f(n))$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că $\frac{1}{\sqrt{k+1}} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{\sqrt{k}}$, pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$.

c) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

6. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x$.

a) Arătați că, pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$, ecuația $f(x) = \lambda$ are o unică soluție reală $u(\lambda)$.

b) Arătați că funcția u definită mai sus este derivabilă pe \mathbb{R} .

c) Calculați $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u(\lambda)}{\lambda}$.

7. Se consideră șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ definit prin $a_1 \in (0, 1)$ și $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, $\forall n \geq 1$.

a) Arătați că $a_n \in (0, 1)$, pentru orice $n \geq 1$.

b) Arătați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este monoton.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \dots a_n)$.

8. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

a) Arătați că funcția f este continuă pe \mathbb{R} .

b) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.

c) Fie $x_0 \in \mathbb{R}$ și $x_{n+1} = f(x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent.

9. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, se consideră funcția $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = e^{-x} + nx^2 - 2x - 1$.

a) Arătați că funcția f_n este convexă, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

b) Demonstrați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, ecuația $f_n(x) = 0$ are o unică soluție reală pozitivă, notată x_n , iar $x_n \in \left(\frac{1}{n}, \frac{1 + \sqrt{n+1}}{n}\right)$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$.

0. Se consideră funcția $f_n: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n + \ln x$, unde $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Demonstrați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, ecuația $f_n(x) = 0$ are o singură soluție reală, notată x_n , și $x_n \in (0, 1)$.

b) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Alte probleme selectate din variantele propuse de MEDCT

71. Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x}}$.

a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 1$.

b) Arătați că funcția f are două puncte de extrem.

c) Determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f .

Bacalaureat 2008, varianta 81

72. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$.

a) Arătați că graficul funcției f admite asimptotă spre $+\infty$.

b) Arătați că funcția f este inversabilă.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(e^x))^{\frac{1}{x}}$.

Bacalaureat 2008, varianta 91

73. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x + 2}$.

a) Calculați $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{f(x)}{x-1}$.

b) Determinați domeniul de derivabilitate al funcției f .

c) Determinați punctele de extrem ale funcției f .

Bacalaureat 2009, varianta 55

74. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x^2 + 2x + 1} - \sqrt[3]{x^3 - x + 1}$.

a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 0$.

b) Arătați că graficul funcției f admite asimptotă spre $+\infty$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{n} \right)^n$.

Bacalaureat 2008, varianta 99

75. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$.

a) Arătați că dreapta de ecuație $x = 1$ este asimptotă verticală la graficul funcției f .

b) Arătați că graficul funcției f admite asimptotă spre $+\infty$.

c) Studiați derivabilitatea funcției f .

Bacalaureat 2009, varianta 83

76. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x + 2}$.

a) Arătați că graficul funcției f admite asimptotă spre $+\infty$.

b) Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x(2 \arctg f(x) - \pi)$.

Bacalaureat 2009, varianta 78

77. Se consideră funcția $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

b) Calculați $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}^*$.

c) Determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f .

Bacalaureat 2009, varianta 50

78. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x^2}, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

a) Arătați că funcția f este derivabilă pe \mathbb{R} .

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$.

c) Demonstrați că funcția f este mărginită pe \mathbb{R} .

Bacalaureat 2009, varianta 16

79. Se consideră funcția $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{\pi}{x}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.

a) Arătați că funcția f este continuă pe $[0, 1]$.

b) Determinați domeniul de derivabilitate al funcției f .

c) Arătați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, ecuația $f(x) = \cos \frac{\pi}{x}$ are cel puțin o soluție în intervalul $\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$.

Bacalaureat 2009, varianta 52

80. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

b) Determinați domeniul de derivabilitate al funcției f .

c) Demonstrați că funcția f are două puncte de extrem.

Bacalaureat 2009, varianta 48

81. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \ln x$.

a) Arătați că graficul funcției nu admite asimptotă spre $+\infty$.

b) Arătați că ecuația $f(x) = 0$ are o unică soluție $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$.

c) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .

Bacalaureat 2009, varianta 76

82. Fie funcția $f: (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(\ln x)$.

a) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = e$.

b) Demonstrați că funcția f este concavă.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{f'(x)}$.

Bacalaureat 2009, varianta 92

83. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \arctg x - \ln(1+x^2)$.

a) Arătați că funcția f este convexă.

b) Arătați că funcția f' este mărginită.

c) Demonstrați că $f'(x) \geq 0$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Bacalaureat 2009, varianta 10

84. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că $xf(x) = e^x - 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

a) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 1$.

b) Arătați că funcția f este continuă în $x = 0$ dacă și numai dacă $f(0) = 1$.

c) Arătați că dacă funcția f este continuă în $x = 0$, atunci ea este derivabilă pe \mathbb{R} .

Bacalaureat 2009, varianta 77

85. Fie $a \in \mathbb{R}$ și funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + x + a}{x^2 - 1}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^x$.

b) Determinați valoarea numărului real a pentru care 3 este punct de extrem local al funcției f .

c) Determinați valoarea numărului real a pentru care graficul funcției f admite exact o asimptotă verticală.

Bacalaureat 2009, varianta 73

86. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + ax + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

a) Calculați $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

b) Determinați valorile numărului real a pentru care funcția f are trei puncte de extrem.

c) Pentru $a = 0$, determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f .

Bacalaureat 2009, varianta 46

87. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.

b) Studiați convergența șirului $(x_n)_{n \geq 1}$ definit prin $x_1 = 1$ și $x_{n+1} = f(x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

c) Demonstrați că $f(x+1) - f(x) \leq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Bacalaureat 2009, varianta 87

88. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \arctg x$ și șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ definit prin $x_1 = 1$ și $x_{n+1} = f(x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.

b) Determinați ecuația asimptotei spre $-\infty$ a graficului funcției f .

c) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Bacalaureat 2009, varianta 42

89. Se consideră funcția $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ și șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin

$x_0 = 2$ și $x_{n+1} = f(x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f .

b) Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

c) Demonstrați că șirul $(y_n)_{n \geq 0}$, dat de $y_n = x_0 + x_1 + x_2 + \dots + x_n - n$ este convergent.

Bacalaureat 2009, varianta 18

90. Se consideră funcțiile $f_n: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n + \ln x$, $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f_1 .

b) Arătați că funcțiile $g_n: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g_n(x) = f_n(x) + f_n\left(\frac{1}{x}\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$, sunt convexe.

c) Admitem că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, ecuația $f_n(x) = 2^n$ are soluția unică x_n . Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent la 2.

Bacalaureat 2009, varianta 90

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \sin x$.

- a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.
b) Admitem că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, ecuația $f(x) = n$ are soluția unică x_n . Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$, unde $(x_n)_{n \geq 1}$ este șirul definit mai sus.

Bacalaureat 2009, varianta 9

2. Se dau funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \cos x$ și șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ și

$$x_{n+1} = f(x_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.

b) Arătați că $x_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

Bacalaureat 2009, varianta 8

3. Pentru fiecare $t \in \mathbb{R}$ consideră funcția $f_t: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_t(x) = x^3 + t^2 x$.

a) Calculați $f_t'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că fiecare funcție f_t , $t \in \mathbb{R}$, este inversabilă.

c) Arătați că funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = f_t^{-1}(1)$ este continuă în punctul $t = 0$.

Bacalaureat 2009, varianta 93

4. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ se definește funcția $f_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n - nx - 1$.

a) Arătați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, funcția f_n este convexă.

b) Arătați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ecuația $f_n(x) = 0$ are soluție unică.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, unde x_n este unica soluție a ecuației $f_n(x) = 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Bacalaureat 2009, varianta 98

5. Se consideră funcțiile $f_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^{n+1} - (n+2)x + n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Arătați că graficele funcțiilor f_n nu admit asimptotă spre $+\infty$.

b) Arătați că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, f_n are exact un punct de extrem x_n .

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^{x_n}$, unde x_n este punctul de extrem al funcției f_n , $n \in \mathbb{N}^*$.

Bacalaureat 2009, varianta 94

6. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2}$.

a) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.

b) Arătați că, pentru orice număr real $k \in (0, \infty)$, există $c \in (k, k+1)$ astfel încât

$$f(k+1) - f(k) = \frac{1}{\sqrt[3]{c}}.$$

c) Demonstrați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$, $a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - f(n)$ este strict descrescător.

Bacalaureat 2009, varianta 69

97. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$ și șirul $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

a) Determinați asimptotele graficului funcției f_1 .

b) Arătați că $\frac{1}{k+1} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{k}$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$

c) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Bacalaureat 2009, varianta 7

98. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln\left(\frac{2x+1}{2x+3}\right)$.

a) Calculați $f'(x)$, $x \in (0, \infty)$.

b) Arătați că $f(x) < 0$ pentru orice $x \in (0, \infty)$.

c) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln\left(n + \frac{1}{2}\right)$ este strict descrescător.

Bacalaureat 2009, varianta 68

99. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, se consideră funcția $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \sin^n x$ și se notează cu x_n abscisa punctului de inflexiune a graficului funcției din intervalul $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

a) Arătați că $f''(x) = n(n-1)\sin^{n-2} x - n^2 \sin^n x$, $x \in \mathbb{R}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.

b) Arătați că $\sin x_n = \sqrt{\frac{n-1}{n}}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$

Bacalaureat 2009, varianta 14

100. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ și șirul $(a_n)_{n \geq 1}$, $a_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{n\sqrt{n}}$.

a) Arătați că funcția f' este strict crescătoare pe intervalul $(0, \infty)$.

b) Arătați că $\frac{1}{2(k+1)\sqrt{k+1}} < \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} < \frac{1}{2k\sqrt{k}}$, pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$.

c) Demonstrați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Bacalaureat 2009, varianta 33

Tema 3.2

Primitive.

Primitive.

Definiție. Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval. Spunem că funcția $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ admite primitive dacă există o funcție derivabilă $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât $F' = f$.

Observații.

1. Dacă funcția $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ admite o primitivă, atunci există o infinitate de primitive ale sale. Mulțimea acestor primitive se notează cu $\int f(x)dx$.

2. Dacă $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă a funcției $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, atunci $\int f(x)dx = F(x) + C$, unde C este mulțimea funcțiilor reale constante.

3. Orice funcție continuă $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ admite primitive.

4. Orice funcție $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ care admite primitive are proprietatea lui Darboux. Dacă f nu are proprietatea lui Darboux pe intervalul I , atunci nu admite primitive pe I .

5. Dacă o funcție $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ are un punct de discontinuitate de speța I, atunci f nu admite primitive.

Proprietăți. Fie $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ două funcții care admit primitive.

1. Dacă funcția $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă pe I , atunci $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

2. $\int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx$.

3. **Formula de integrare prin părți:** $\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$.

Formule utile

1. $\int a dx = ax + C, a \in \mathbb{R}, D = \mathbb{R}$.

2. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, D = (0, +\infty)$.

2.1. $\int x dx = \frac{x^2}{2} + C, D = \mathbb{R}$.

2.2. $\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x\sqrt{x} + C, D = [0, +\infty)$.

2.3. $\int \sqrt[3]{x} dx = \frac{3}{4} x\sqrt[3]{x} + C, D = \mathbb{R}$.

2.4. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C, D = (0, +\infty)$.

2.5. $\int \frac{1}{\sqrt{x+a}} dx = 2\sqrt{x+a} + C, a \in \mathbb{R}, D = (-a, +\infty)$.

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}, D = \mathbb{R}$.

3.1. $\int e^x dx = e^x + C, D = \mathbb{R}$.

3.2. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C, a \in \mathbb{R}^*, D = \mathbb{R}$.

4. $\int \frac{1}{x+a} dx = \ln|x+a| + C, a \in \mathbb{R}, D = \mathbb{R} \setminus \{-a\}$.

4.1. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, D = \mathbb{R}^*$.

4.2. $\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C, a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}$.

5. $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \in \mathbb{R}^*, D = \mathbb{R} \setminus \{\pm a\}$.

5.1. $\int \frac{x}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 - a^2| + C, a \in \mathbb{R}^*, D = \mathbb{R} \setminus \{\pm a\}$.

6. $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, a \in \mathbb{R}^*, D = \mathbb{R}$.

6.1. $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \operatorname{arctg} x + C, D = \mathbb{R}$.

6.2. $\int \frac{x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) + C, a \in \mathbb{R}^*$.

7. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C, a \in \mathbb{R}, D = \mathbb{R}$.

7.1. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + C, a \in \mathbb{R}^*, D = \mathbb{R}$.

8. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C, a \in (0, +\infty), D = (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$.

8.1. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \sqrt{x^2 - a^2} + C, a \in \mathbb{R}^*, D = (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$.

9. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C, a \in (0, +\infty), D = (-a, a)$.

9.1. $\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2} + C, a \in \mathbb{R}^*, D = (-a, a)$.

10. $\int \sin x dx = -\cos x + C, D = \mathbb{R}$;

11. $\int \cos x dx = \sin x + C, D = \mathbb{R}$.

12. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C, D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

13. $\int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C, D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

14. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C, D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

15. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C, D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Probleme propuse

1. Fie funcțiile $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = (x^2 + x + 1)e^{-2x}$ și $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (-2x^2 - 1)e^{-2x}$.

a) Arătați că funcția F este o primitivă a funcției f .

b) Arătați că funcția F este strict descrescătoare pe \mathbb{R} .

- c) Arătați că funcția F este convexă pe \mathbb{R} .
2. Se consideră funcția $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.
- a) Arătați că funcția $F : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = 2\sqrt{x}(\ln x - 2)$ e o primitivă a funcției f .
- b) Să se arate că orice primitivă G a funcției f este strict crescătoare pe $[1, +\infty)$.
3. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$.
- a) Arătați că funcția $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)$, $x \in \mathbb{R}$, este o primitivă a funcției f .
- b) Demonstrați că orice primitivă a funcției f este strict crescătoare.
- c) Arătați că orice primitivă a funcției f este injectivă dar nu este surjectivă.
- d) Determinați punctele de inflexiune ale funcției F .
4. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x(x^2 + x + a)$, $a \in \mathbb{R}$ și $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o primitivă a lui f .
- a) Determinați a știind că F este strict crescătoare.
- b) Determinați a știind că $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x^2 - 1} = \frac{1}{4}$.
- c) Determinați a știind că funcția F are două puncte de inflexiune.
5. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x}(ax^2 + 4x + a)$, $a \in \mathbb{R}^*$ și $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o primitivă a lui f .
- a) Determinați a știind că $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = 1$.
- b) Determinați a știind că F este strict crescătoare pe \mathbb{R} .
- c) Arătați că pentru orice $a \in \mathbb{R}$, funcția F are două puncte de inflexiune.
6. Fie $F, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = (ax + b)3^{-x}$, $f(x) = x3^{-x}$. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care funcția F este o primitivă a funcției f .
7. Se consideră funcțiile $F, f : \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = (ax + b)\sqrt{3x + 1}$, $f(x) = \sqrt{3x + 1}$. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că funcția F este o primitivă a funcției f .
8. Se dau funcțiile $F, f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{x + 1}$, $f(x) = x\sqrt{x + 1}$.
- a) Dacă F este o primitivă a lui f , calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x^2 - 1}$.
- b) Dacă F este o primitivă a lui f , determinați intervalele de monotonie ale lui F .
- c) Determinați $a, b, c \in \mathbb{R}$ știind că funcția F este o primitivă a funcției f .

9. Se consideră funcțiile $F, f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = x(a \ln^2 x + b \ln x + c)$, $f(x) = \ln^2 x$.

- a) Dacă F este o primitivă a lui f , calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x - 1}$.
- b) Dacă F este o primitivă a lui f , calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.
- c) Determinați $a, b, c \in \mathbb{R}$ știind că funcția F este o primitivă a funcției f .
10. Arătați că există numerele reale a, b, c astfel încât funcția $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = (ax^2 + b) \cos x + cx \sin x$ este o primitivă a funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \sin x$.
11. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^3 + \cos x & \text{pentru } x < 0 \\ a & \text{pentru } x = 0 \\ \ln(x + 1) + b & \text{pentru } x > 0 \end{cases}$ admite primitive.
12. Arătați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{x\}(1 - \{x\})$ admite primitive, unde $\{a\}$ este parte fracționară a numărului real a .

Variante bacalaureat 2009, enunț adaptat.

13. Arătați că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = [x] \cos \frac{(1 + 2x)\pi}{2}$ admite primitive, unde $[a]$ este partea întreagă a numărului real a .
14. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \begin{cases} x^4 + x & \text{pentru } x < 0 \\ \ln(x^2 + 1) + ax & \text{pentru } x \geq 0 \end{cases}$ este primitivă unei alte funcții $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
15. Se consideră funcția $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $G(x) = \begin{cases} 2x^2 - x, & x \leq 1 \\ \ln(x^2 + x - 1) + ax + b, & x > 1 \end{cases}$. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ pentru care G este primitivă unei alte funcții $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
16. Se consideră funcțiile $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \begin{cases} x^{2012} + x & \text{pentru } x < 0 \\ a & \text{pentru } x = 0 \\ x^2 \ln x + bx + c & \text{pentru } x > 0 \end{cases}$. Determinați $a, b, c \in \mathbb{R}$ știind că funcția F este primitivă unei funcții $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
17. Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și funcția $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 1 \\ \ln^2 x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$. Determinați numerele a și b pentru care funcția F este primitivă unei funcții f .
18. Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} axe^x - x, & x \leq 0 \\ x \cos x + b, & x > 0 \end{cases}$. Să se determine numerele a și b știind că funcția f este primitivă pe \mathbb{R} a unei alte funcții.

9. Determinați $\alpha \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^{2012} & \text{pentru } x \leq 0 \\ x^\alpha \ln x + x^2 & \text{pentru } x > 0 \end{cases}$

admite primitive.

10. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât $xf(x) = \arctg x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

a) Determinați $f(0)$ știind că funcția f admite primitive.

b) Pentru $f(0) = 1$, arătați că orice primitivă F a lui f este strict crescătoare.

c) Pentru $f(0) = 1$, calculați limita $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$, unde F este o primitivă a funcției f .

1. Arătați că funcțiile următoare admit primitive.

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \ln x + \sin x, & x > 0 \end{cases}$

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} xe^x, & x \leq 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$

Variante bacalaureat 2009

2. Arătați că funcțiile următoare nu admit primitive.

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x \ln x + 1, & x > 0 \end{cases}$

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \arctg(x-2), & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} xe^x + 1, & x \leq 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$

3. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ o funcție derivabilă. Determinați, în funcție de f , primitivele:

a) $\int (f(x) + f'(x))e^x dx$; b) $\int \left(f'(x) \cdot \arctg x + \frac{f(x)}{x^2 + 1} \right) dx$; c) $\int \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} dx$;

d) $\int (\sin x \cdot f'(x) + \cos x \cdot f(x)) dx$; e) $\int (\sin x \cdot f'(x) - \cos x \cdot f(x)) dx$;

f) $\int \frac{e^x f(x) - e^x f'(x)}{f^2(x)} dx$; g) $\int (f'(x) \cdot f^2(x)) dx$.

4. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ o funcție de două ori derivabilă. Determinați, în funcție de f , următoarele primitive.

a) $\int (f''(x) + f'(x))e^x dx$; b) $\int (-f'(-x) + f(-x))e^x dx$;

c) $\int \frac{f''(x) - f'(x)}{e^x} dx$;

d) $\int ((f'(x))^2 + f(x)f''(x)) dx$;

e) $\int \frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)} dx$,

Variante bacalaureat 2009

25. Se consideră funcțiile $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x^n}{x^2 + 4}$, $n \in \mathbb{N}$.

a) Calculați $\int f_1(x) dx$ și $\int f_3(x) dx$.

b) Arătați că orice primitivă a funcției f_4 este o funcție bijectivă.

c) Determinați n , pentru care funcția f_n admite primitive injective.

26. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$ se consideră funcțiile $f_n: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n \ln x$.

a) Demonstrați că primitivele funcției f_1 sunt convexe pe intervalul $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

b) Calculați $\int \frac{\ln x}{f_n(x)} dx$, $x \in (1, +\infty)$, $n \geq 2$.

27. Se consideră funcțiile $f_n: (-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x^n}{x+3}$, $n \in \mathbb{N}$.

a) Calculați $\int f_1(x) dx$ și $\int f_2(x) dx$.

b) Arătați că orice primitivă a funcției f_4 este crescătoare.

c) Determinați n , pentru care funcția f_n admite primitive descrescătoare pe intervalul $(-3, 0)$.

28. Se consideră funcțiile $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x^n}{e^x}$, $n \in \mathbb{N}$.

a) Calculați $\int f_0(x) dx$ și $\int (f_0(x) - f_1(x)) dx$.

b) Fie F_0 primitiva funcției f_0 care îndeplinește condiția $F_0(0) = 0$. Calculați $F_0(1)$.

c) Arătați că orice primitivă a funcției f_{2012} este concavă pe intervalul $(-\infty, 0)$.

d) Determinați toate numerele $n \in \mathbb{N}^*$ pentru care orice primitivă a lui f_n este convexă pe intervalul $(0, +\infty)$.

Tema 3.3

Funcții integrabile.

Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\Delta = (a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b)$ o diviziune a intervalului $[a, b]$ și $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ cu $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ un sistem de puncte intermediare asociat diviziunii Δ . Numărul $\|\Delta\| = \max\{|x_i - x_{i-1}| \mid i = \overline{1, n}\}$ se numește norma diviziunii Δ . Pentru funcția $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ notăm $\sigma(f, \Delta, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, numită și suma Riemann asociată funcției f , diviziunii Δ și sistemului de puncte intermediare ξ .

Definiție. Funcția $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă pe intervalul $[a, b]$, dacă limita $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma(f, \Delta, \xi) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ este finită. Aceasta se notează cu $\int_a^b f(x) dx$.

Observație. De cele mai multe ori în exerciții întâlnim următorul caz particular. $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $\Delta = \left(0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n}{n} = 1\right)$ - diviziunea echidistantă a intervalului $[0, 1]$, și sistemul de puncte intermediare $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ cu $\xi_i = \frac{i}{n} \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$, $i = \overline{1, n}$. Dacă funcția $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă pe intervalul $[0, 1]$, atunci $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)$.

1. Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție **monotonă**, atunci f este integrabilă pe intervalul $[a, b]$.
2. Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție **continuă**, atunci f este integrabilă pe intervalul $[a, b]$.
3. Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție **continuă pe intervalul $[a, b]$ cu excepția unui număr finit de puncte de discontinuitate de speța I**, atunci f este integrabilă pe intervalul $[a, b]$.

Proprietăți importante
1. **Formula Leibniz-Newton (formula fundamentală a calculului integral).** Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție integrabilă care are primitive, și F este o primitivă oarecare a lui f , atunci $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

2. $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$. 3. $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

4. **Aditivitatea în raport cu un interval.** $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$, $\forall c \in [a, b]$.

5. **Formula de integrare prin părți.** Dacă în plus funcțiile f și g sunt derivabile cu derivatele funcții continue, atunci $\int_a^b f'(x)g(x) dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$.

6. **Teorema de medie pentru integrale.** Dacă funcția $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă, atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât $\int_a^b f(x) dx = (b - a)f(c)$.

7. **Prima formulă de schimbare de variabilă.** Fie funcția $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și funcția $u: [a, b] \rightarrow J$ (J este un interval) continuă cu derivata continuă, atunci $\int_a^b f(u(x))u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) dt$.

8. **A doua formulă de schimbare de variabilă.** Fie $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ o funcție bijectivă, φ, φ^{-1} derivabile, φ' continuă și $\varphi'(t) \neq 0$, $\forall t \in [c, d]$. Dacă funcția $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $[a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$.

9. **Derivata unei integrale.** Fie funcția continuă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Atunci funcția F este o primitivă a funcției f , adică $F'(x) = f(x)$.

9.1. Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și funcția $u: I \rightarrow [a, b]$, (I este un interval) este derivabilă cu derivata continuă, atunci funcția $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ este derivabilă și $F'(x) = f(u(x)) \cdot u'(x)$.

10. **Proprietăți de monotonie și mărginire.**

Dacă funcția $f: [a, b] \rightarrow [0, +\infty)$ este integrabilă, atunci $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Dacă funcțiile $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt integrabile și $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Aplicații ale integralei definite. Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă.

11. **Aria suprafeței plane cuprinsă între graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x = a$ și $x = b$** este egală cu $\int_a^b |f(x)| dx$.

12. **Volumul corpului obținut prin rotația graficului funcției f în jurul axei Ox** este egal cu $V_f = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Probleme propuse

1. Calculați următoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

$$\begin{aligned} a) \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx; & \quad b) \int_0^2 (x - \sqrt{x})^2 dx; & \quad c) \int_1^2 \frac{x^2 + x + 1}{x} dx; \\ d) \int_1^2 \frac{x^2 + x + 1}{\sqrt[3]{x}} dx; & \quad e) \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx; & \quad f) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+2}} dx; \end{aligned}$$

2. Calculați următoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

$$\begin{aligned} a) \int_0^1 (x - e^x) dx; & \quad b) \int_0^1 \left(\frac{1}{e^x} - e^x\right)^2 dx; & \quad c) \int_0^1 (2^x + 3^{-x}) dx; \\ d) \int_{-1}^1 (2^x - 2^{-x}) dx; & \quad e) \int_0^4 \left(\sqrt{2^x} - \frac{2}{\sqrt{3^x}}\right) dx; & \quad f) \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{3x+1}} dx. \end{aligned}$$

3. Calculați următoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

$$\begin{aligned} a) \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx; & \quad b) \int_0^1 \frac{1}{x^2 - 4} dx; & \quad c) \int_0^1 \frac{x+1}{x^2 + 1} dx; & \quad d) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^3 + x + 2}{x^2 + 1} dx; \\ e) \int_2^3 \frac{x^3 - x + 2}{x^2 - 1} dx; & \quad f) \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3} dx; & \quad g) \int_0^1 \frac{x^2}{3x^2 + 1} dx. \end{aligned}$$

4. Calculați următoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

$$\begin{aligned} a) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx; & \quad b) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}} dx; & \quad c) \int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx; & \quad d) \int_2^3 \frac{x+2}{\sqrt{x^2 - 1}} dx; \\ e) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx; & \quad f) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{4-3x^2}} dx; & \quad g) \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{4-3x^2}} dx. \end{aligned}$$

5. Calculați următoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

$$\begin{aligned} a) \int_0^{\pi} \sin x dx; & \quad b) \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx; & \quad c) \int_0^{\pi} \operatorname{tg} x dx; & \quad d) \int_{\pi/6}^{\pi/4} \operatorname{ctg} x dx; \\ e) \int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{dx}{\sin^2 x}; & \quad f) \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x}; & \quad g) \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}. \end{aligned}$$

6. Calculați următoarele integrale (aditivitatea la interval).

$$\begin{aligned} a) \int_0^2 |x-1| dx; & \quad b) \int_0^2 |x^2-1| dx; & \quad c) \int_0^2 x[x] dx; \\ d) \int_{-1}^1 x\{x\} dx; & \quad e) \int_{-1}^1 |x - \sin x| dx; & \quad f) \int_{-1}^1 |x - \arctg x| dx. \end{aligned}$$

7. Calculați următoarele integrale (formula de integrare prin părți):

$$\begin{aligned} a) \int_0^{\pi} x \sin x dx; & \quad b) \int_0^{\pi} x \cos x dx; & \quad c) \int_0^1 x e^x dx; & \quad d) \int_0^1 x^2 e^{-x} dx; & \quad e) \int_1^e \ln x dx; \\ f) \int_1^e \ln^2 x dx; & \quad g) \int_e^{e^2} x^2 \ln x dx; & \quad h) \int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx; & \quad i) \int_e^{e^2} \frac{\ln x}{x^2} dx. \end{aligned}$$

8. Calculați următoarele integrale (prima formulă de schimbare de variabilă):

$$\begin{aligned} a) \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx; & \quad b) \int_0^{\sqrt{\pi}} x^2 \cos x^3 dx; & \quad c) \int_1^e \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx; & \quad d) \int_0^1 x \sqrt{x^2 + 1} dx; \\ e) \int_1^e \frac{\ln^{2012} x}{x} dx; & \quad f) \int_0^{\pi} \cos x \cdot \sin(\sin x) dx; & \quad g) \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin dx}{1 + \cos x}. \end{aligned}$$

9. Calculați următoarele integrale (a doua formulă de schimbare de variabilă):

$$a) \int_0^1 x \sqrt{x+1} dx; \quad b) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1}.$$

10. Se consideră funcțiile $f, F: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -\frac{\cos x + x \sin x}{x^2}$ și $F(x) = \frac{\cos x}{x}$.

a) Arătați că F este o primitivă a funcției f .

b) Calculați $\int_{\pi}^{2\pi} f(x) dx$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^{n\pi} f(t) dt$.

11. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \sin x$.

a) Calculați $\int f(x) dx$.

b) Determinați aria suprafeței plane determinate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x = 0$ și $x = \pi$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^2}$.

12. Se consideră funcțiile $f, F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^4 + 2x^2 + 2}$ și $F(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2 + 1}$.

a) Arătați că $F'(x) + 2f(x) = 0$.

b) Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(t) dt$.

13. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x^2}$.

a) Calculați $\int_0^1 x f(x) dx$.

b) Determinați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3 f(x)$, axa Ox și dreptele de ecuații $x = 0$ și $x = 1$.

c) Arătați că $\int_0^1 f(x) dx \in (1, 2)$.

14. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^x \frac{t^2}{t^2+1} e^t dt$.

- a) Calculați $f'(x)$.
- b) Arătați că $f(x) \geq 0$, $\forall x \in (0, +\infty)$.
- c) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

15. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_{-x}^x \frac{t^{2012}}{t^2+1} dt$.

- a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- b) Arătați că $f(-x) = -f(x)$.
- c) Arătați că $f(x) \geq 0$, $\forall x \in [0, +\infty)$ și $f(x) \leq 0$, $\forall x \in (-\infty, 0]$.

16. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^x (t^4 - 4t + 3) \sqrt{t^4 + 1} dt$.

- a) Calculați $f'(x)$.
- b) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$.
- c) Determinați mulțimea punctelor de extrem ale funcției f .

17. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

- a) Determinați aria suprafeței plane determinate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x=0$ și $x=1$.
- b) Arătați că $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t^2) dt \in \mathbb{R}$.
- c) Calculați $\int_{-1}^1 \frac{e^x}{1+e^x} f(x) dx$.

18. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) = \frac{1}{(1+t^2)(1+t^3)}$.

- a) Să se calculeze $\int_0^1 (t^3 + 1) f(t) dt$.
- b) Să se arate că $\int_{\frac{1}{x}}^1 f(t) dt = \int_1^x t^3 f(t) dt$, $\forall x > 0$.
- c) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{x}}^x f(t) dt$.

19. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + 1} dt$.

Variante bacalaureat 2009

a) Calculați $f'(x)$.

b) Determinați punctele de extrem ale funcției f .

c) Arătați că graficul funcției f nu are asimptote la $+\infty$.

20. Se consideră funcția $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_1^{x^2} \arcsin \frac{t^2}{t^2+1} dt$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$.

b) Arătați că funcția f este strict crescătoare.

c) Arătați că graficul funcției f nu are asimptote.

21. Se consideră o funcție $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cu proprietatea că $xf(x) = \sin x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

a) Să se calculeze $\int_0^{\pi} x^2 f(x) dx$.

b) Să se arate că funcția f este integrabilă pe intervalul $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

c) Să se arate că $\int_1^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \leq \cos 1$.

Variante bacalaureat 2008

22. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^x e^{-t^4} dt$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$.

b) Arătați că funcția f este injectivă.

c) Arătați că funcția f nu este surjectivă.

23. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^n e^{-x^2} dx$.

a) Arătați că $e^x \geq x+1$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) Arătați că $\frac{1}{e} \leq I_1 \leq \frac{\pi}{4}$.

c) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Variante bacalaureat 1998, enunț adaptat.

24. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + 2012} dx$.

a) Calculați I_1 .

b) Arătați că $I_{n+2} + 2012 \cdot I_n = \frac{1}{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

d) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.

e) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n$.

Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 0}$, $I_n = \int_1^2 (1-x)^{2n} \ln(x^2+1) dx$.

a) Calculați I_0 .

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = C_{2n}^0 - \frac{1}{2}C_{2n}^1 + \frac{1}{3}C_{2n}^2 - \dots + \frac{1}{2n+1}C_{2n}^{2n}$.

a) Calculați $\int_0^1 (1-x)^4 dx$.

b) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (1-x)^{2n} dx$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1+x}{1+x^2}$.

a) Arătați că $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \arctg x + \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$ este o primitivă a funcției f .

b) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.

c) Să se arate că șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k^2}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, este convergent.

Bacalaureat 2009, model subiect

Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2+2x+2}$.

a) Calculați $\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}-1} f(x) dx$.

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{2n^2+2 \cdot n+1^2} + \frac{n}{n^2+2 \cdot 2n+2^2} + \dots + \frac{n}{2n^2+2 \cdot n^2+n^2} \right)$.

Se consideră funcția $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

a) Calculați $\int_0^1 xf(x) dx$.

b) Determinați volumul corpului obținut prin rotația graficului funcției f în jurul lui Ox .

c) Arătați că $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$.

d) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2-k^2}}{n^2}$.

Variante Bacalaureat 2009, enunț adaptat

30. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^2 (2x-x^2)^n dx$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

a) Să se calculeze I_1 .

b) Să se demonstreze că $(2n+1)I_n = 2nI_{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

c) Să se arate că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ tinde descrescător către 0.

Bacalaureat 2009, model subiect

31. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 (x-x^2)^n dx$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

a) Să se calculeze I_2 .

b) Să se demonstreze că $I_n = \frac{n}{4n+2} I_{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

c) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Bacalaureat 2009, model subiect

32. Se consideră funcția $f: [1,2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

a) Calculați $\int_1^4 f(\sqrt{x}) dx$.

b) Calculați aria suprafeței delimitate de graficul funcției $g: [1,2] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ și de axa Ox .

c) Arătați că $(4n+2) \int_1^2 f^n(x) dx + n \int_1^2 f^{n-1}(x) dx = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bacalaureat 2011

33. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^{2012}+1}$.

a) Calculați $\int_0^1 x^{2011} \cdot f(x) dx$.

b) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n \cdot f(x) dx$.

c) Arăți că $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t) dt \in \mathbb{R}$.

34. Se consideră funcția $f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x & \text{pentru } x \in [0,1] \\ x+e^x & \text{pentru } x \in (1,2] \end{cases}$

- a) Arătați că funcția f este integrabilă, dar nu admite primitive.
 b) Determinați aria suprafeței plane determinate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x = 0$ și $x = 2$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^2 f^n(x) dx}{n}$.

35. Se consideră o funcție continuă și strict crescătoare $f: [0, 2012] \rightarrow \mathbb{R}$. Arătați că

funcția $g: [0, 2012] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \int_0^x f(t) dt - x f(1006)$ nu este injectivă.

36. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_1^2 \frac{1}{x^n + 1} dx$.

- a) Calculați I_2 .
 b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.
 c) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.
 d) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

37. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + x + 1} dx$.

- a) Calculați $I_1 + I_2 + I_3$.
 b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.
 c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Bacalaureat 2010

38. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 0}$, $I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{t^2 + 1} dt$.

- a) Calculați I_3 .
 b) Să se arate că $I_{2n} = \frac{1}{2n-1} - I_{2n-2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.
 c) Arătați că numărul $I_0 + I_2 + \dots + I_{2012}$ este irațional.
 d) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 0}$ este convergent.
 e) Să se arate că $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \right) = I_0$.

Variante bacalaureat 2009, enunț adaptat

39. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 0}$, $I_n = \int_0^1 \frac{(x^2 + x + 1)^n - x}{x^2 + 1} dx$.

- a) Calculați I_0 .
 b) Verificați dacă $I_2 - I_0 \in \mathbb{Q}$.
 c) Arătați că $I_{4n+1} \in \mathbb{Q}$ oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$.

Bacalaureat 2011, model subiect

40. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_n^{n+1} \frac{2x-1}{x} dx$.

- a) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este crescător.
 b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este mărginit.
 c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(2 - I_n)$.

Bacalaureat 2010

41. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_1^2 \frac{x^n}{x^n + 1} dx$.

- a) Calculați I_1 .
 b) Să se arate că $I_n \leq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
 c) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Variante bacalaureat 2009

42. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$.

- a) Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.
 b) Arătați că $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$.
 c) Arătați că $\int_0^1 [x(x^2 + 1)^{6n+1} + x^{3n+2}] f(x) dx \in \mathbb{Q}$.

43. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 0}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^3 + x^2 + x + 1} dx$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- a) Determinați numerele reale a, b și c știind că $\frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2+1}$, $\forall x \in [0, 1]$.
 b) Calculați I_0 .
 c) Arătați că numărul $I_{4n+2} - I_{4n+1} + I_1 + I_0$ este rațional, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

44. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 0}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^3 + x^2 + x + 1} dx$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- a) Calculați $I_1 + I_3$.
 b) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
 c) Arătați că $I_{n+3} + I_{n+2} + I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1}$.
 d) Arătați că $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \frac{1}{4}$.
 e) Arătați că $I_{2n+3} + I_{2n+1} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

45. Se consideră funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = e^{-x}$.

a) Calculați $\int_0^1 g(x) dx$.

b) Calculați $\int_0^1 x^5 g(x^3) dx$.

c) Demonstrați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ definit prin $I_n = \int_1^n g(x^3) dx$ este convergent.

Bacalaureat 2011

46. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 0}$, $I_n = \int_2^3 \frac{t^n}{t^2 + 1} dt$.

a) Calculați I_4 .

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător.

c) Arătați că $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = +\infty$.

47. Pentru fiecare număr $n \in \mathbb{N}$ se consideră funcția $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \int_0^x \frac{t^n}{t^3 + 1} dt$.

a) Calculați $f_4(1) + f_1(1)$.

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_{2012}(x)}{x^{2013}}$.

c) Arătați că șirul $(f_n(1))_{n \geq 0}$ este convergent.

d) Arătați că șirul $(f_n(2))_{n \geq 0}$ este divergent.

48. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_{\pi/6}^{\pi/4} \operatorname{tg}^n x dx$.

a) Calculați $I_1 + I_3$.

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

c) Demonstrați egalitatea $I_n = \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 \frac{x^n}{x^2 + 1} dx$.

d) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

49. Pentru fiecare $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ se consideră șirul $(I_n(a))_{n \geq 1}$, $I_n(a) = \int_0^a \operatorname{tg}^n x dx$.

a) Calculați $I_1\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

b) Arătați că pentru orice $a \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ șirul $(I_n(a))_{n \geq 1}$ este convergent.

c) Pentru $a \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(a)$.

d) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

50. Pentru fiecare număr real a definim șirul $(I_n(a))_{n \geq 1}$, $I_n(a) = \int_0^a (1 + \sin x)^n dx$.

a) Calculați $I_2(\pi)$.

b) Calculați $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{I_{2012}(a)}{a}$.

c) Arătați că pentru orice $a \in (0, \pi)$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a (1 + \sin x)^n dx = +\infty$.

51. Se consideră șirul $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^n dx$.

a) Calculați x_1 .

b) Arătați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător.

c) Arătați că $x_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin x)^n dx$.

d) Arătați că $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

52. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x}$.

a) Calculați $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

b) Arătați că orice primitivă a funcției f este crescătoare pe intervalul $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

c) Calculați $\int_0^{2\pi} xf(x) dx$.

Bacalaureat 2010

53. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{arctg} x$.

a) Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \operatorname{arctg} \frac{k}{n}$.

54. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \cos^n x dx$.

a) Calculați I_1 .

b) Arătați că $0 \leq I_n \leq \frac{\pi}{2}$, $\forall n \geq 2$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

55. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x$.

a) Calculați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x=0$ și $x=\frac{\pi}{2}$.

b) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

c) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f^n(x) dx$ este convergent.

Bacalaureat 2011

56. Fie funcția $f: [1, e] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{\ln x}$.

a) Să se calculeze $\int_0^1 f(e^x) dx$.

b) Să se determine volumul corpului obținut prin rotirea graficului funcției f în jurul axei Ox .

c) Să se arate că $\int_0^1 e^{x^2} dx + \int_1^e f(x) dx = e$.

Variante bacalaureat 2009

57. Fie funcția $f: [0, 1] \rightarrow [1, 3]$, $f(x) = x^4 + x^2 + 1$. Se admite că funcția f are inversa funcția g .

a) Să se calculeze $\int_0^{3/4} \frac{2t+1}{f(\sqrt{t})} dt$.

b) Să se arate că $\int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 3$.

c) Să se demonstreze că, dacă $\alpha \in [1, 3]$, atunci $\int_0^1 f(x) dx + \int_1^\alpha g(x) dx \geq \alpha$.

Variante bacalaureat 2009

58. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \arctg x$.

a) Calculați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x=0$ și $x=1$.

b) Arătați că funcția f este bijectivă.

c) Calculați $\int_0^{1-\frac{\pi}{4}} f^{-1}(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4}$.

59. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

a) Calculați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x=-2$ și $x=0$.

b) Arătați că funcția f este bijectivă.

c) Calculați $\int_1^4 f^{-1}(x) dx$.

60. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{x\}(1 - \{x\})$, unde $\{x\}$ este partea fracționară a numărului real x .

a) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.

b) Să se demonstreze că funcția f admite primitive pe \mathbb{R} .

c) Să se arate că valoarea integralei $\int_a^{a+1} f(x) dx$ nu depinde de numărul real a .

Variante bacalaureat 2009

61. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{1+x^{2012}}$.

a) Calculați $\int_{-1}^1 xf(x) dx$.

b) Calculați $\int_0^1 [f(x)f''(x) + (f'(x))^2] dx$.

c) Arătați că $\frac{\pi}{2} \leq \int_{-1}^1 f(x) dx \leq 2$.

62. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}^*$ fie funcția $f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$.

a) Calculați $\int \frac{f_{2012}(x)}{f_{2012}(x+1)} dx$, $x \in [0, +\infty)$.

b) Calculați $\int_0^1 (x^2 + 2)f_3(x^2) dx$.

c) Arătați că $\int_1^x f_n(t^3) dt \leq \frac{x-1}{n!}$, $\forall x \geq 1$, $\forall n \geq 1$.

63. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

a) Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.

b) Arătați că funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \int_0^x f(t^2) dt$ este impară.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{-x}^x f(t^{1006}) dt}{x^{2013}}$.

64. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}^*$ se consideră funcția $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{x^n + 1}$.

a) Calculați $\int_0^1 f_4(\sqrt{x}) dx$.

b) Arătați că $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_{2012}(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_{2012}(\cos x) dx$.

c) Arătați că $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(\sin x) dx = 1$.

65. Se consideră funcțiile $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \sqrt{x^4 + 1}$, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$

a) Calculați $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx$.

b) Arătați că funcția g este monotonă pe \mathbb{R} .

c) Arătați că graficul funcției g nu are asimptote la $+\infty$.

66. Pentru fiecare număr natural $n \in \mathbb{N}^*$ definim funcția

$f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \sqrt{x^n + 1}$.

a) Calculați aria suprafeței determinate de graficul funcției f_1 , axa Ox și dreptele de ecuații $x = 0$ și $x = 1$.

b) Calculați $\int_0^1 x [f_1(e^x)]^2 dx$.

c) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ este convergent la 1.

67. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{x^2 + 1} dx$.

a) Calculați I_1 .

b) Arătați că $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

c) Arătați că $I_n = \frac{1}{n+2} [2\sqrt{2} - (n-1)I_{n-2}]$.

68. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$.

a) Să se calculeze I_1 .

b) Să se arate că $(n+2)I_n = (n-1)I_{n-2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.

c) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

69. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$.

a) Calculați $\int_1^e x \cdot f(x) dx$.

b) Arătați că $\int_1^e f^n(x) dx + n \int_1^e f^{n-1}(x) dx = e^e$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_1^e f^n(x) dx$.

70. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^3 + x + 1} dx$, $\forall n \geq 1$.

a) Arătați că $I_{n+3} + I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1}$, $\forall n \geq 1$.

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este strict descrescător.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n$.

71. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{x+1} dx$, $\forall n \geq 1$.

a) Calculați I_1 .

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n$.

72. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos 2x$.

a) Determinați aria suprafeței formate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x = 0$ și $x = \frac{\pi}{2}$.

b) Determinați volumul corpului format prin rotația graficului funcției $g: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x)$ în jurul axei Ox .

c) Arătați că $n \int_0^{\frac{\pi}{4}} f^n(x) dx = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} f^{n-2}(x) dx$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

73. Pentru fiecare număr natural n se consideră funcția

$f_n: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{1+|x-n|}$.

a) Calculați $\int_0^2 f_1(x) dx$.

b) Determinați intervalele de convexitate ale unei primitive oarecare a funcției f_{2013} .

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_{3n-1}^{3n} f_n(x) dx$.

74. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 + 3}$.

a) Arătați că funcția $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ este strict crescătoare.

b) Calculați $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2 + 1} dx$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{2x} f(t) dt}{x}$.

Bacalaureat 2008

Variante de subiecte

4

- 4.1. Subiecte date la examenul de bacalaureat în anii anteriori
- 4.2. Variante de subiecte propuse spre rezolvare

Testul 1 Examen Bacalaureat, iulie 2012

Subiectul I

1. Calculați modulul numărului complex $(1 + i)^2$.
2. Determinați coordonatele punctelor de intersecție a graficelor funcțiilor $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = -x - 2$.
3. Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, inecuația $2^{x+1} \leq 4$.
4. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare una dintre submulțimile cu trei elemente ale mulțimii $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, elementele submulțimii alese să fie termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5. Se consideră vectorii $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j}$ și $\vec{v} = a\vec{i} - \vec{j}$. Determinați numărul real a pentru care $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$.
6. Calculați cosinusul unghiului A al triunghiului ABC , în care $AB = 4$, $AC = 5$ și $BC = 7$.

Subiectul al II-lea

1. Se consideră sistemul
$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0, \text{ unde } m \in \mathbb{R}. \\ x + y + mz = 0 \end{cases}$$
 - a) Calculați determinantul matricei sistemului.
 - b) Determinați valorile reale ale lui m pentru care sistemul are soluție unică.
 - c) În cazul $m = 2$, determinați soluția (x_0, y_0, z_0) a sistemului pentru care $x_0 > 0$ și $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 3$.
2. Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ și mulțimea $G = \{X(p) = I_2 + pA \mid p \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}\}$.
 - a) Arătați că $X(p) \cdot X(q) \in G$, pentru orice $X(p), X(q) \in G$.
 - b) Admitem că (G, \cdot) este grup comutativ având elementul neutru $X(0)$. Determinați inversul elementului $X(p)$ în acest grup.
 - c) Rezolvați ecuația $(X(p))^3 = I_2 + 7A$, unde $X(p) \in G$.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 12x$.
 - a) Arătați că funcția este crescătoare pe intervalul $[2, +\infty)$.
 - b) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{f(x)}$.
 - c) Determinați mulțimea numerelor reale a pentru care ecuația $f(x) = a$ are trei soluții reale distincte.

2. Se consideră funcția $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$.

a) Arătați că orice primitivă a lui f este strict crescătoare pe $(-1, +\infty)$.

b) Calculați $\int_0^1 \frac{f(x)}{x+1} dx$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{2x} f(t) dt}{x}$.

Testul 2 Examen Bacalaureat, iulie 2012, subiect de rezervă

Subiectul I

1. Calculați partea reală a numărului complex $(1+2i)^2$.

2. Se notează cu x_1, x_2 soluțiile ecuației $x^2 - 3x + a = 0$ unde a este un număr real. Determinați a pentru care $x_1 + x_2 + x_1 x_2 = 5$.

3. Se notează cu g inversa funcției bijective $f: (0, +\infty) \rightarrow (4, +\infty)$, $f(x) = 2^x + 3$. Determinați $g(5)$.

4. Se consideră mulțimea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determinați probabilitatea ca, alegând la întâmplare una dintre submulțimile lui A , aceasta să conțină exact trei elemente.

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele $A(1,3)$ și $B(7,12)$. Determinați coordonatele punctului M , știind că $\overline{AM} = \frac{1}{3} \overline{AB}$.

6. Determinați $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, știind că $\frac{\sin x + 2 \cos x}{\cos x} = 3$.

Subiectul al II-lea

1. Se notează cu $D(a, b, c)$ determinantul matricei $A(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a^2 & 3b^2 & 3c^2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

a) Calculați $D(0, 1, -1)$.

b) Determinați numerele reale x pentru care matricea $A(0, 1, x)$ are rangul egal cu 2.

c) Arătați că dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi și $D(a, b, c) = 0$, atunci triunghiul este isoscel.

2. Se consideră inelul $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ și funcția $f: \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 3$.

a) Calculați $f(\hat{1}) + f(\hat{3})$.

b) Descompuneți în factori ireductibili peste \mathbb{Z}_5 polinomul $P = X^3 + 2X^2 + 4X + 3 \in \mathbb{Z}_5[X]$.

c) Arătați că funcția f nu este surjectivă.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+9}{\sqrt{x^2+3}}$.

a) Arătați că funcția $f'(x)\sqrt{x^2+3} = \frac{3-9x}{x^2+3}$, pentru orice număr real x .

b) Determinați asimptota spre $+\infty$ la graficul f .

c) Determinați imaginea funcției f .

2. Se consideră funcția $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$.

a) Arătați că funcția $F: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = x \ln x - x$ este o primitivă a funcției f .

b) Calculați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații $x = 1$ și $x = e$.

c) Arătați că $(p+1) \int_1^x f^p(t) dt + \int_1^x f^{p+1}(t) dt = x f^{p+1}(x)$, pentru orice $x \geq 1$ și orice $p > 0$.

Testul 3 Examen Bacalaureat, mai 2012, sesiunea specială

Subiectul I

1. Determinați numărul real m știind că mulțimile $A = \{2\}$ și $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + mx + 4 = 0\}$ sunt egale.

2. Determinați coordonatele vârfului parabolei asociate funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

3. Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuația $3^{\log_3 x} < 1$.

4. Calculați probabilitatea ca, alegând la întâmplare unul dintre numerele naturale de 2 cifre, acesta să fie format doar din cifre impare.

5. Determinați numărul real a pentru care vectorii $\vec{u} = 3\vec{i} + a\vec{j}$ și $\vec{v} = a\vec{i} + (2a-3)\vec{j}$ sunt coliniari.

6. Calculați raza cercului circumscris triunghiului ABC , știind că $AB = AC = 5$ și $BC = 6$.

Subiectul al II-lea

1. În $M_3(\mathbb{C})$ se consideră matricele $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $A(x) = \begin{pmatrix} \cos x & 0 & i \sin x \\ 0 & 1 & 0 \\ i \sin x & 0 & \cos x \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$.

a) Calculați $\det(A(\pi))$.

b) Arătați că $A(x) \cdot A(y) = A(x+y)$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

c) Determinați numerele reale x pentru care $(A(x))^{2012} = I_3$.

2. Pe mulțimea $G = (0, 1)$ se definește legea de compoziție asociativă $x \circ y = \frac{xy}{2xy - x - y + 1}$.

a) Arătați că $e = \frac{1}{2}$ este elementul neutru al legii de compoziție " \circ ".

b) Arătați că orice element din mulțimea G este simetrizabil în raport cu legea de compoziție "o".

c) Demonstrați că $f: G \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \frac{1}{x} - 1$ este un izomorfism de la grupul (G, \circ) la grupul (\mathbb{R}_+^*, \cdot) .

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{f(x)}$.

b) Demonstrați că funcția f este convexă pe \mathbb{R} .

c) Arătați că funcția $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(\sqrt{x})$ este strict crescătoare pe $(0, +\infty)$.

2. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}^*$ se consideră numerele $I_n = \int_0^1 x^n \cdot \sqrt{1-x^2} dx$ și $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.

a) Calculați J_1 .

b) Calculați I_1 .

c) Demonstrați că $J_{2n} - J_{2n+2} - I_{2n}$, pentru orice număr natural nenul n .

Testul 4 Examen Bacalaureat, august 2012

Subiectul I

1. Arătați că $\log_2(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + \log_2(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = 2$.

2. Calculați distanța dintre punctele de intersecție a graficului funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 5x + 4$ cu axa Ox .

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $3^x + 3^{x+1} = 4$.

4. Determinați rangul termenului care conține x^{14} în dezvoltarea binomului $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{20}$, $x > 0$.

5. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul $A(3, 3)$ și este paralelă cu dreapta d de ecuație $3x + 2y - 1 = 0$.

6. Determinați măsura unghiului C al triunghiului ABC . Știind că $BC = 2$, $AB = \sqrt{2}$ și măsura unghiului BAC este egală cu 45° .

Subiectul al II-lea

1. Se consideră sistemul de ecuații
$$\begin{cases} -x + ay + (2a+4)z = 1 \\ (a+2)x + ay + (a+1)z = 1 \\ (a+1)x + (2a-1)y + 3z = 2 \end{cases}$$
, unde $a \in \mathbb{R}$.

a) Arătați că determinantul matricei sistemului este egal cu $3a^2 + 9a^2 - 3a - 9$.

b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.

c) Pentru $a = -2$, rezolvați sistemul.

2. Se consideră polinomul $f = X^6 + 4X^4 + 3$, $f \in \mathbb{Z}_5[X]$.

a) Arătați că $a^5 = a$ pentru orice $a \in \mathbb{Z}_5$.

b) Arătați că polinomul f este reducibil peste \mathbb{Z}_5 .

c) Arătați că polinomul f nu are rădăcini în \mathbb{Z}_5 .

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$.

b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul funcției f .

c) Demonstrați că, pentru orice număr real $m > 0$, ecuația $f(x) = m$ are o soluție unică în \mathbb{R} .

2. Pentru fiecare număr natural nenul p , se consideră numărul $I_p = \int_0^1 x^p e^{x^2} dx$.

a) Calculați I_1 .

b) Arătați că $2I_p + (p+1)I_{p-2} = e$, pentru orice $p \geq 3$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \left(e^{\frac{1}{n^2}} + 2e^{\frac{2}{n^2}} + \dots + ne^{\frac{n^2}{n^2}} \right)$.

Testul 5 Bacalaureat 2012, Model MECTS (www.edu.ro)

Subiectul I

1. Determinați numărul elementelor mulțimii $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x+1| \leq 24\}$.

2. Determinați coordonatele punctelor de intersecție a dreptei $y = 2x - 1$ cu parabola $y = 2x^2 - 3x + 1$.

3. Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuația $\sqrt[3]{1+7x} = 1+x$.

4. Se consideră mulțimea $A = \{1, 2, \dots, 10\}$. Determinați numărul de submulțimi cu 3 elemente ale mulțimii A , submulțimi care conțin exact 2 numere impare.

5. Determinați ecuația medietoarei segmentului $[AB]$, unde $A(1, -2)$ și $B(3, 4)$.

6. Știind că $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ și $\cos 2x = \frac{1}{2}$ calculați $\sin x$.

Subiectul al II-lea

1. Se consideră sistemul de ecuații
$$\begin{cases} x + my + m^2z = 0 \\ mx + m^2y + z = 0 \\ m^2x + y + mz = 0 \end{cases}$$
, unde $m \in \mathbb{R}$.

a) Determinați valorile lui m pentru care determinantul matricei sistemului este nul.

b) Arătați că, pentru nicio valoare a lui m , sistemul nu are o soluție (x_0, y_0, z_0) cu x_0, y_0, z_0 numere reale strict pozitive.

c) Arătați că rangul matricei sistemului este diferit de 2, oricare ar fi $m \in \mathbb{R}$.

2. Pe mulțimea \mathbb{R} se definește legea de compoziție $x * y = \frac{1}{2}(x + y + xy + 1)$.

- Verificați dacă legea de compoziție "*" este asociativă.
- Arătați că legea de compoziție "*" admite element neutru.
- Rezolvați ecuația $x * x * x = 3$.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x + 2$.

- Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f(-x)}$.
- Demonstrați că funcția f este descrescătoare pe intervalul $[-1, 1]$.
- Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $f(x) = m$ are trei soluții reale distincte.

2. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}, I_n = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx$.

- Calculați I_2 .
- Demonstrați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.
- Demonstrați că $(2n + 1) I_n = 2n I_{n-1}$, pentru orice $n \geq 2$.

Testul 6 Examen Bacalaureat, iunie 2011

Subiectul I

- Arătați că $(\sqrt{2}, \sqrt{5}) \cap \mathbb{Z} = \{2\}$.
- Determinați valorile reale ale lui m pentru care dreapta $x = 2$ este axa de simetrie a parabolei $y = x^2 + mx + 4$.
- Rezolvați în mulțimea $[0, 2\pi)$ ecuația $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
- Determinați $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, pentru care $C_n^2 + A_n^2 = 18$.
- Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care dreptele $d_1: ax + y + 2011 = 0$ și $d_2: x - 2y = 0$ sunt paralele.
- Fie x un număr real care verifică egalitatea $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2$. Arătați că $\sin 2x = 1$.

Subiectul al II-lea

1. Se consideră matricea $A(x) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, unde $x \in \mathbb{R}$.

- Arătați că $A(x)A(y) = A(x + y)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$.
- Arătați că $(A(x) - A(y))^{2011} = O_3$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.
- Determinați inversa matricei $A(x)$, unde $x \in \mathbb{R}$.

2. Fie $\alpha \in \mathbb{C}$ și polinomul $f = X^3 + (1 - \alpha)X^2 + (\alpha - 2)iX + \alpha + (\alpha - 2)i \in \mathbb{C}[X]$.

- Arătați că polinomul f are rădăcina -1 .
- Arătați că, dacă p, q sunt numere complexe și polinomul $g = X^2 + pX + q \in \mathbb{C}[X]$

are două rădăcini distincte, complex conjugate, atunci p și q sunt numere reale și $p^2 < 4q$.

c) Determinați $\alpha \in \mathbb{C}$ pentru care polinomul f are două rădăcini distincte, complex conjugate.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(x + 1) - \ln(x - 1)$.

- Arătați că funcția f este strict descrescătoare pe $(1, \infty)$.
- Determinați asimptotele graficului funcției f .
- Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x)$.

2. Se consideră funcția $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 3x + 2$.

a) Calculați $\int_1^2 f(\sqrt{x}) dx$.

b) Calculați aria suprafeței determinate de graficul funcției $g: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{f(x)}{x}$ și de axa Ox .

c) Arătați că $(4n + 2) \int_1^2 f^n(x) dx + n \int_1^2 f^{n-1}(x) dx = 0$.

Testul 7 Examen Bacalaureat, august 2011

Subiectul I

- Calculați rația progresiei geometrice $(b_n)_{n \geq 1}$, cu termeni pozitivi, dacă $b_1 + b_2 = 6$ și $b_3 + b_4 = 24$.
- Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (1 - a^2)x + 4$ este constantă.
- Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuația $\left(\frac{3}{2}\right)^x < \left(\frac{2}{3}\right)^x$.
- Determinați numărul termenilor raționali ai dezvoltării $(1 + \sqrt{2})^{10}$.
- Calculați distanța de la punctul $A(2, 2)$ la dreapta determinată de punctele $B(1, 0)$ și $C(0, 1)$.
- Triunghiul ABC are măsura unghiului A de 60° , $AB = 4$ și $AC = 5$. Calculați $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.

Subiectul al II-lea

1. Se consideră mulțimea $H = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A^2 = A\}$.

a) Arătați că $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in H$.

- Demonstrați că, dacă $A \in H$, atunci $A^n \in H$, pentru orice număr natural nenul n .
- Arătați că mulțimea H este infinită.

2. Polinomul $f = (X + i)^{10} + (X - i)^{10}$ are forma algebrică $f = a_{10}X^{10} + a_9X^9 + \dots + a_1X + a_0$, unde $a_0, a_1, \dots, a_{10} \in \mathbb{C}$.

- Determinați restul împărțirii polinomului f la $X - i$.
- Arătați că toți coeficienții polinomului f sunt numere reale.

- c) Demonstrați că toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^5 - 5x + 4$.

a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$.

- b) Arătați că graficul funcției f are un punct de inflexiune.

- c) Arătați că, pentru orice $m \in (0, 8)$, ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții reale distincte.

2. Se consideră funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^{-x}$.

a) Calculați $\int_0^1 g(x) dx$.

b) Calculați $\int_0^1 x^5 g(x^3) dx$.

- c) Demonstrați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ definit prin $I_n = \int_n^\infty g(x^3) dx$ este convergent.

Testul 8 Bacalaureat 2011, Model MECTS (www.edu.ro)

Subiectul I

- Calculați modulul numărului complex $z = 1 - i\sqrt{3}$.
- Determinați mulțimea valorilor funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x + 1$.
- Știind că doi termeni ai unei progresii geometrice sunt $b_3 = 6$ și $b_5 = 24$, determinați termenul b_7 .
- Determinați $x > 0$, știind că $\log_a x = 2 \log_a 3 - 3 \log_a 2$, unde $a > 0, a \neq 1$.
- Scrieți ecuația dreptei care conține punctul $A(3, 2)$ și este perpendiculară pe dreapta $d: x + 2y + 5 = 0$.
- Știind că $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ și $\sin x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, calculați $\cos x$.

Subiectul al II-lea

1. Fie matricea $A(x) = \begin{pmatrix} 1 & -2x & 4x^2 \\ 0 & 1 & -4x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ din mulțimea $M_3(\mathbb{R})$.

a) Calculați $(A(2) - A(0))^{2010}$.

- b) Arătați că $A(x) \cdot A(y) = A(x + y)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$.

- c) Demonstrați că matricea $A(x)$ este inversabilă și calculați inversa matricei $A(x)$.

2. Pe mulțimea $G = (0, 1)$ se definește legea de compoziție asociativă $x * y = \frac{xy}{2xy - x - y + 1}$.

- a) Verificați dacă $e = \frac{1}{2}$ este elementul neutru al legii „ $*$ ”.

- b) Arătați că orice element din mulțimea G este simetrizabil în raport cu legea „ $*$ ”.

- c) Demonstrați că funcția $f: G \rightarrow \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{1}{x} - 1$ este un izomorfism de la grupul $(G, *)$ la grupul (\mathbb{R}_+^*, \cdot) .

Subiectul al III-lea

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) + 1$.

- a) Calculați $f'(5)$.

b) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(n+1) - 1}{f(n) - 1} \right)^n$.

- c) Arătați că ecuația $f'(x) = 0$ are exact trei soluții reale distincte.

2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 0}, I_n = \int_0^1 \frac{(x^2 + x + 1)^n - x}{x^2 + 1} dx$.

- a) Calculați I_0 .

- b) Verificați dacă $I_2 - I_0 \in \mathbb{Q}$.

- c) Arătați că $I_{4n+1} \in \mathbb{Q}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$.

Testul 9 Examen Bacalaureat, iunie 2010

Subiectul I

1. Calculați $((1-i)(i-1))^4$.

2. Arătați că funcția $f: (-3, 3) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{3-x}{3+x}$ este impară.

3. Determinați soluțiile întregi ale inecuației $x^2 + 2x - 8 < 0$.

4. Câte elemente din mulțimea $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ sunt divizibile cu 4 sau cu 5?

5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele $M(1, -2)$, $N(-3, -1)$ și $P(-1, 2)$.

Determinați coordonatele punctului Q astfel încât $MNPQ$ să fie paralelogram.

6. Triunghiul ABC are $AB = 6, AC = 3$ și $BC = 5$. Calculați lungimea înălțimii $[AD]$.

Subiectul al II-lea

1. Fie sistemul $\begin{cases} x - 2y - 8z = -65 \\ 3x + y - 3z = 22 \\ x + y + z = 28 \end{cases}$, unde $x, y, z \in \mathbb{R}$ și $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -8 \\ 3 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ matricea asociată

sistemului.

- a) Arătați că rangul matricei A este egal cu 2.

- b) Rezolvați sistemul în $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- c) Determinați numărul soluțiilor sistemului din mulțimea $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

2. Fie mulțimea de matrice $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_5 \right\}$.

a) Determinați numărul elementelor mulțimii A .

b) Arătați că există o matrice nenulă $M \in A$ astfel încât $\begin{pmatrix} \hat{3} & \hat{1} \\ -\hat{1} & \hat{3} \end{pmatrix} \cdot M = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}$.

c) Rezolvați în mulțimea A ecuația $X^2 = I_2$.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctg \frac{x}{x+1}$.

a) Determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f .

b) Studiați monotonia funcției f .

c) Determinați punctele de inflexiune ale funcției f .

2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_n^{n+1} \frac{2x-1}{x} dx$.

a) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător.

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este mărginit.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(2 - I_n)$.

Testul 10 Examen Bacalaureat, iunie 2010, subiect de rezervă

Subiectul I

1. Arătați că numărul $i\sqrt{2} - 1$ este soluție a ecuației $z^2 + 2z + 3 = 0$.

2. Fie funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + a$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 - a$. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care $(f \circ g)(x) > 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = x + 1$.

4. Determinați numărul elementelor mulțimii $A = \{1, 3^3, 3^6, 3^9, \dots, 3^{2010}\}$.

5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele $A(3, 5)$, $B(-2, 5)$ și $C(6, -3)$.

Scrieți ecuația medianei corespunzătoare laturii $[BC]$, în triunghiul ABC .

6. Calculați $\sin \frac{\pi}{12}$.

Subiectul al II-lea

1. Fie sistemul $\begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + 2ay + z = -1 \\ 2ax + y + (a+1)z = 0 \end{cases}$, unde $x, y, z \in \mathbb{R}$ și a este parametru real.

a) Rezolvați sistemul pentru $a = 0$.

b) Verificați dacă pentru $a = -1$ sistemul este compatibil.

c) Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul are soluție unică.

2. Fie $m, n \in \mathbb{R}$ și polinomul $f = X^3 - 3X^2 + mX - n$ care are rădăcinile $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$.

a) Determinați valorile reale m și n pentru care $x_1 = 2 + i$.

b) Determinați valorile reale m și n pentru care restul împărțirii polinomului f la polinomul $(X-1)^2$ este egal cu 0.

c) Arătați că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale și $m > 0$, $n > 0$, atunci x_1, x_2, x_3 sunt strict pozitive.

Subiectul al III-lea

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x + 2}$.

a) Arătați că dreapta de ecuație $y = x$ este asimptotă oblică pentru graficul funcției f spre $+\infty$.

b) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = -2$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x}$.

2. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x}$.

a) Calculați $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

b) Arătați că orice primitivă a funcției f este strict crescătoare pe intervalul $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

c) Calculați $\int_0^{2\pi} xf(x) dx$.

Testul 11 Examen Bacalaureat, august 2010

Subiectul I

1. Care dintre numerele $2\sqrt[3]{6}$ și $3\sqrt[3]{3}$ este mai mare?

2. Determinați mulțimea valorilor funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$.

3. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $x^2 - x + m^2 = 0$ are două soluții reale egale.

4. Determinați numărul termenilor raționali din dezvoltarea $(1 + \sqrt[4]{2})^{41}$.

5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele $A(2, 1)$, $B(-2, 3)$, $C(1, -3)$ și $D(4, a)$, unde $a \in \mathbb{R}$. Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât dreptele AB și CD să fie paralele.

6. Fie mulțimea $A = \left\{0; \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}\right\}$. Care este probabilitatea ca, alegând un element din mulțimea A , acesta să fie soluție a ecuației $\sin^3 x + \cos^3 x = 1$?

Subiectul al II-lea

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \square_3(\mathbb{R})$. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$, notăm $B_n = A^n + A^{n+1} + A^{n+2}$.

a) Arătați că $A^{2010} = a^{670} \cdot I_3$.

b) Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care $\det(B_1) = 0$.

c) Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care toate matricele B_n , $n \in \mathbb{N}^*$ sunt inversabile.

2. Pe mulțimea \mathbb{R} se definește legea $x * y = 2xy - 3x - 3y + m$, $m \in \mathbb{R}$. Fie mulțimea

$$M = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}.$$

a) Determinați $m \in \mathbb{R}$ astfel încât $x * y \in M$, pentru orice $x, y \in M$.

b) Pentru $m = 6$ arătați că $(M, *)$ este grup.

c) Pentru $m = 6$, demonstrați că funcția $f: M \rightarrow \mathbb{R}^*$, $f(x) = 2x - 3$ este un izomorfism între grupurile $(M, *)$ și (\mathbb{R}^*, \cdot) .

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{2x-1} - \sqrt[3]{2x+1}$.

a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă $x = 0$, situat pe graficul funcției f .

b) Determinați ecuația asimptotei orizontale la graficul funcției f spre $+\infty$.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{-\sqrt[3]{2n+1}} \right)^{\sqrt[3]{2n}}$.

2. Se consideră șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n dx}{x^2 + x + 1}$.

a) Calculați $I_1 + I_2 + I_3$.

b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.

c) Calculați $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Testul 12 Bacalaureat 2010, Model MECTS (www.edu.ro)**Subiectul I**

1. Determinați partea reală a numărului complex $(\sqrt{3} + i)^6$.

2. Se consideră funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$. Calculați $(f \circ f)(512)$.

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\cos 2x + \sin x = 0$.

4. Se consideră mulțimea $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Determinați numărul tripletelor (a, b, c) cu proprietatea că $a, b, c \in M$ și $a < b < c$.

5. Calculați distanța dintre dreptele paralele de ecuații $x + 2y = 6$ și $2x + 4y = 11$.

6. Paralelogramul $ABCD$ are $AB = 1$, $BC = 2$, și $m(\angle BAD) = 60^\circ$. Calculați produsul scalar $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$.

Subiectul al II-lea

1. Pentru $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, se consideră sistemul
$$\begin{cases} ax + by + cz = b \\ cx + ay + bz = a \\ bx + cy + az = c \end{cases}, x, y, z \in \mathbb{R}.$$

a) Arătați că determinantul sistemului este $\Delta = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

b) Rezolvați sistemul în cazul în care este compatibil determinat.

c) Știind că $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = 0$, arătați că sistemul are o infinitate de soluții (x, y, z) , astfel încât $x^2 + y^2 = z - 1$.

2. Se consideră mulțimea $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ \hat{0} & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z}_4 \right\}$.

a) Determinați numărul elementelor mulțimii G .

b) Dați un exemplu de matrice $A \in G$ cu proprietatea că $\det A \neq \hat{0}$ și $\det A^2 = \hat{0}$.

c) Determinați numărul soluțiilor ecuației $X^2 = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}$, $X \in G$.

Subiectul al III-lea

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

a) Determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f .

b) Calculați $f'(x)$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

c) Demonstrați că funcția f este concavă pe intervalul $(-\infty, -1)$.

2. Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ se consideră funcțiile $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = |\sin nx|$ și numerele

$$I_n = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f_n(x)}{x} dx.$$

a) Calculați $\int_0^{\pi} f_2(x) dx$.

b) Arătați că $I_n \leq \ln 2$.

c) Arătați că $I_n \geq \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$.

4.2. Variante de subiecte propuse spre rezolvare

Testul 1

Subiectul I

1. Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ o progresie aritmetică cu $a_5 + a_{11} = 20$. Calculați a_8 .
2. Fie $a \in \mathbb{R}$ și funcțiile $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 2$ și $g(x) = 2x + a$. Determinați valorile lui a pentru care $f \circ g = g \circ f$.
3. Rezolvați în mulțimea $(0, +\infty)$ ecuația $x^2 + 9^{\log_3 x} = 8$.
4. Care este probabilitatea ca, alegând o mulțime din mulțimea submulțimilor nevide ale mulțimii $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, aceasta să aibă un număr prim de elemente.
5. Fie $m \in \mathbb{R}$ și vectorii $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} + m^2\vec{j}$. Arătați că unghiul vectorilor \vec{u} , \vec{v} este ascuțit.
6. Arătați că $\sin x + \sqrt{3} \cos x \leq 2$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

Subiectul II

1. Fie mulțimea $M = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid X^2 = 3X\}$.
 - a) Arătați că $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \in M$.
 - b) Dacă $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M$, arătați că $a + d \in \{0, 3, 6\}$.
 - c) Arătați că dacă $X, Y \in M$ și $X + Y \in M$, atunci $XY = -YX$.
2. Pe mulțimea $(0, \infty)$ se definește legea de compoziție $x * y = \frac{xy}{x + y}$.
 - a) Arătați că legea „ $*$ ” este asociativă.
 - b) Arătați că legea „ $*$ ” nu are element neutru.
 - c) Rezolvați ecuația $x * x * x * x = 5$, $x \in (0, \infty)$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 4} - 2x$.
 - a) Determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ la graficul funcției f .
 - b) Arătați că f este strict descrescătoare pe \mathbb{R} .
 - c) Arătați că $f(e^x) < f(x + 1)$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}^*$.
2. Fie $I_n = \int_0^{\pi} e^x \cos nx \, dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Calculați I_1 .
 - b) Arătați că $|I_n| \leq 80$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Testul 2

Subiectul I

1. Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ o progresie geometrică de numere reale, cu proprietatea că $a_1 + a_2 + a_3 = 2$ și $a_4 + a_5 + a_6 = 16$. Determinați rația progresiei.
2. Fie $f: (-\infty, -3) \cup (3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{x-3}{x+3}$. Arătați că f este funcție impară.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\sqrt{3x-2} = 1-2x$.
4. Determinați $n \in \mathbb{N}$ pentru care $n! + (n+1)! < 840$.
5. Fie $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ și $\vec{v} = 4\vec{i} + \vec{j}$. Calculați $|3\vec{u} - \vec{v}|$.
6. Fie $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ cu $\sin x = -\frac{5}{12}$. Calculați $\operatorname{tg} x = \frac{x}{2}$.

Subiectul II

1. Se consideră matricele $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 - a) Calculați inversa matricei AB .
 - b) Rezolvați ecuația $\det(A + xB) = 0$, $x \in \mathbb{R}$.
 - c) Arătați că $(A + B)^n \neq I_2$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Pe mulțimea \mathbb{Z} se consideră legea de compoziție $x * y = 3xy + 3x + 3y + 2$, $x, y \in \mathbb{Z}$.
 - a) Arătați că mulțimea $H = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ este parte stabilă a lui \mathbb{Z} în raport cu legea „ $*$ ”.
 - b) Decideți dacă „ $*$ ” are element neutru.
 - c) Rezolvați ecuația $(x * x) * x = 8$, $x \in \mathbb{Z}$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x - 1$.
 - a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right)$.
 - b) Studiați derivabilitatea funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt[3]{f(x)}$, în punctul $x = 0$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(-1) + f(-2) + \dots + f(-n) + n)$.
2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{x^2 + 1}} \, dx$, $n \geq 1$.
 - a) Calculați I_1 .
 - b) Arătați că $\frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, $\forall n \geq 1$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n(I_{n+1} + I_{n-1})$.

Testul 5

Subiectul I

1. Fie $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$ astfel încât $\frac{z+i}{1+iz}$ este număr real. Calculați modulul lui z .
2. Fie $a \in \mathbb{R}$ și funcția bijectivă $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + a$. Determinați valorile lui a pentru care $f = f^{-1}$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\sin x = \cos 2x$.
4. Câte numere naturale de trei cifre au cel puțin o cifră impară?
5. Fie dreptele d_1 și d_2 respectiv de ecuații: $x - 3y + 1 = 0$ și $3x + y + 2 = 0$, a un număr real și P punctul de coordonate $(0, a)$. Determinați valorile lui a știind că P este egal depărtat de d_1 și d_2 .
6. Triunghiul ABC are aria egală cu $\sqrt{3}$, latura AB egală cu 2 și unghiul $A = \frac{\pi}{3}$. Calculați BC .

Subiectul II

1. Fie matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ m & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$.

- a) Arătați că $\text{rang}(B) = 2$, pentru orice valoare reală a lui m .
- b) Determinați valorile reale ale lui m pentru care $\det(AB) = 0$.
- c) Determinați $X \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{Z})$ astfel încât $X \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$.

2. Fie a un număr real și legea „ $*$ ” definită pe \mathbb{R} , $x * y = xy + ax + y$.

- a) Arătați că există un unic $e \in \mathbb{R}$ astfel încât $e * x = x$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
- b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care legea „ $*$ ” are element neutru.
- c) Pentru $a = 1$, rezolvați ecuația $(x * x) * (x * x) = 15$, $x \in \mathbb{R}$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow [1, \infty)$, $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$.

- a) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x = 0$.
- b) Arătați că f este bijectivă.

- c) Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}^*$ se notează cu x_n unicul număr real din intervalul $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ pentru care $f(x_n) = n$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_1^e x \ln^n x \, dx$.

- a) Calculați I_1 .
- b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este monoton și mărginit.
- c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Testul 6

Subiectul I

1. Determinați numărul elementelor mulțimii $A = \left\{x \in \mathbb{Z} \mid \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = 3\right\}$.
2. Fie funcția bijectivă $f: (1, \infty) \rightarrow [2, \infty)$, $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Determinați f^{-1} .
3. Rezolvați ecuația $\arccos x + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi$, $x \in [-1, 1]$.
4. Care este probabilitatea ca alegând o mulțime din mulțimea submulțimilor mulțimii $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, ea să conțină elementul 1?
5. Determinați numerele reale a și b știind că punctul $A(1, 2)$ este punctul de intersecție a dreptelor de ecuații: $2x + ay = 4$ și respectiv $x - y = b$.
6. Fie $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $\text{ctgx} - \text{tgx} = 4$. Calculați $\text{tg} 2x$.

Subiectul II

1. Fie permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \in S_5$.

- a) Determinați inversiunile permutării 5.
- b) Determinați numărul de elemente ale mulțimii $\{\sigma^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
- c) Fie $i \in \{2, 3, 4, 5\}$ și τ transpoziția $(1 \ i)$. Arătați că $\sigma\tau \neq \tau\sigma$.

2. Pe \mathbb{R} definim legea $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3} + 2012$.

- a) Dați exemplu de două numere reale x și y astfel încât $x * y$ este număr natural.
- b) Arătați că \mathbb{R} este grup în raport cu legea „ $*$ ”.
- c) Arătați că grupul $(\mathbb{R}, *)$ este izomorf cu grupul $(\mathbb{R}, +)$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{|\ln x|}{x}$.

- a) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x_0 = 1$.
- b) Determinați punctele de extrem ale funcției f .
- c) Determinați mulțimea valorilor reale ale lui m pentru care ecuația $f(x) = m$ are exact trei soluții.

2. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x - e^{-x}$.

- a) Calculați aria suprafeței mărginite de graficul funcției f , axa Ox și dreptele $x = -1$, respectiv $x = 0$.
- b) Arătați că orice primitivă a funcției f este funcție convexă.

- c) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(t) \, dt$.

Testul 7

Subiectul I

1. Arătați că numărul $(1 + \sqrt{2})^{2012} + \sqrt{2}$ este număr natural, unde $\{x\}$ reprezintă partea fracționară a numărului x .
2. Dreptele $x = 1$ și $x = 2$ sunt axe de simetrie ale graficului funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Arătați că funcția f este periodică.
3. Rezolvați ecuația $2(\cos x - \sin x) = \frac{1}{\sin x + \cos x}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Care este probabilitatea ca alegând unul din numerele $A_5^0, A_5^1, A_5^2, A_5^3, A_5^4, A_5^5$, el să fie număr impar?
5. În triunghiul ABC notăm cu M mijlocul laturii BC și cu N mijlocul laturii AC . Arătați că $3 \overline{AB} = 2 \overline{AM} - 2 \overline{BN}$.
6. Fie $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ cu $\sin x = \frac{5}{13}$. Calculați $\operatorname{ctg} 2x$.

Subiectul II

1. Pentru fiecare $m \in \mathbb{Q}$ se notează cu $A(m) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ m & 1 & -1 \\ 0 & m & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Calculați $\det(A(m))$, $m \in \mathbb{Q}$.
- b) Arătați că $A(m)$ este inversabilă, oricare ar fi $m \in \mathbb{Q}$.
- c) Calculați $(A(0))^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Pe $(0, \infty)$ se definește legea de compoziție $x * y = \sqrt{x^{\log_3 y}}$.

- a) Arătați că dacă $x * y = 1$, atunci $x = 1$ sau $y = 1$.
- b) Demonstrați că mulțimea $G = (0, \infty) \setminus \{1\}$ este grup în raport cu legea „ $*$ ”.
- c) Rezolvați ecuația $x * x * x = 3$, $x \in (0, \infty)$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x - 2 \frac{x-1}{x+1}$.

- a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.
- b) Arătați că graficul funcției f nu are asimptotă spre $+\infty$.
- c) Arătați că $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{2} \ln(n+1)$, pentru oricare $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

- a) Calculați aria suprafeței mărginite de graficul lui f , axa Ox și dreptele $x = 0$, $x = 1$.
- b) Calculați $\int_1^2 x^2 f(x) dx$.
- c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 x^{2n} f(x) dx$.

Testul 8

Subiectul I

1. Fie $z \in \mathbb{C}$ astfel încât $2z^2 + z + 2 = 0$. Calculați $|z|$.
2. Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + 2x + 3$ este monotonă.
3. Rezolvați ecuația $4^x - 3 \cdot 6^x + 2 \cdot 9^x = 0$, $x \in \mathbb{R}$.
4. Determinați numărul natural n , $n \geq 2$, știind că numărul funcțiilor strict monotone $f: \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ este egal cu 20.
5. Aflați coordonatele simetricului punctului $A(1, 2)$ față de dreapta $x - 2y + 5 = 0$.
6. Triunghiul dreptunghic ABC are $m(\angle A) = 90^\circ$, $m(\angle B) = 30^\circ$ și raza cercului circumscris egală cu 6. Calculați perimetrul triunghiului ABC .

Subiectul II

1. Fie permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ și funcția $f: S_4 \rightarrow S_4$, $f(x) = \sigma \cdot x$.

- a) Arătați că σ este permutare impară.
- b) Fie $x \in S_4$. Arătați că $f(x)$ este permutare pară dacă și numai dacă x este permutare impară.
- c) Arătați că, indiferent de ordinea factorilor, produsul celor 24 de permutări din S_4 este diferit de σ .

2. Fie $G = \left\{ A(x) = \begin{pmatrix} 1+4x & 0 & 8x \\ 0 & 0 & 0 \\ -x & 0 & 1-2x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\} \right\}$.

- a) Arătați că $A(x) \cdot A(y) \in G$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$.
- b) Demonstrați că G este grup în raport cu înmulțirea matricelor.
- c) Arătați că funcția $f: (\mathbb{R}^*, \cdot) \rightarrow (G, \cdot)$, $f(x) = A\left(\frac{x-1}{2}\right)$ este izomorfism de grupuri.

Subiectul III

1. Fie $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{x}{x+1}$.

- a) Arătați că f este strict crescătoare pe \mathbb{R} .
- b) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x)$.
- c) Arătați că $-\frac{1}{x} < f(x) < -\frac{1}{x+1}$, oricare ar fi $x \in (0, \infty)$.

2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 x^{2n} \sin x dx$.

- a) Calculați I_1 .
- b) Arătați că $0 \leq I_n \leq \frac{\sqrt{3}}{4n+2}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
- c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n$.

Testul 9

Subiectul I

1. Determinați numărul natural n astfel încât $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) + (2n+1) = 625$.
2. Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^5 - 2x^3 + 3$ nu este injectivă.
3. Rezolvați ecuația $\cos^2 x + \cos^2 2x = 1, x \in [0, \pi]$.
4. Câte funcții $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ au $f(1) \neq f(2)$.
5. Fie $m \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $\vec{u} = \vec{i} + 5\vec{j}$ și $\vec{v} = 2\vec{i} + m\vec{j}$ sunt coliniari. Arătați că $|\vec{v}| = 2\sqrt{26}$.
6. Calculați aria unui triunghi echilateral înscris într-un cerc de rază 1.

Subiectul II

1. Fie mulțimea $M = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid 2A^2 + A + I_2 = O_2\}$.
 - a) Arătați că matricea $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ aparține mulțimii M .
 - b) Demonstrați că orice matrice din M este inversabilă.
 - c) Arătați că mulțimea M are o infinitate de elemente.
2. Fie (S_4, \cdot) grupul permutărilor de grad 4 și $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
 - a) Determinați ordinul permutării σ în grupul S_4 .
 - b) Arătați că mulțimea $H = \{\tau \in S_4 \mid \tau \text{ permutare pară}\}$ este subgrup al grupului S_4 .
 - c) Arătați că dacă $f: (S_4, \cdot) \rightarrow (S_4, \cdot)$ este morfism de grupuri, atunci $f(\sigma) \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

Subiectul III

1. Fie $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x+1) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.
 - a) Determinați ecuația asimptotei spre $+\infty$ a graficului funcției f .
 - b) Arătați că f este strict descrescătoare.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(1)}{2} + \frac{f(2)}{3} + \dots + \frac{f(n)}{n+1} \right)^{\frac{1}{n}}$.
2. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2^{-x^2}$ și șirul $(I_n)_{n \geq 1}, I_n = \int_1^n f(x) dx$.
 - a) Calculați $\int_0^1 xf(x) dx$.
 - b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este monoton și mărginit.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} f(x) dx$.

Testul 10

Subiectul I

1. Arătați că $\log_2 3 > \log_3 4$.
2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$. Determinați numărul punctelor de intersecție a graficului funcției f cu axa Ox .
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\log_x(x^2 + 2) = \log_x 3x$.
4. Într-o clasă sunt 20 de fete și 10 băieți. Câte echipe mixte formate din 3 fete și 2 băieți se pot forma cu elevii din clasă?
5. Fie punctul $A(1, 2)$ și dreapta d de ecuație $x - y - 3 = 0$. Determinați coordonatele piciorului perpendicularei din A pe d .
6. Fie triunghiul ascuțitunghic ABC . Arătați că $\sin B > \cos C$.

Subiectul II

1. Fie $M = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A^2 = A'\}$, A' este transpusa matricei A .
 - a) Arătați că matricea $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ aparține lui M .
 - b) Dacă $A \in M$ și A este inversabilă, calculați $\det(A)$.
 - c) Dacă $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M$ și $\det(A) = 0$, arătați că $a^2 + b^2 - a = 0$.
2. Fie mulțimea $G = \{f_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f_a(x) = ax + 3(1-a), a \in \mathbb{R}^*\}$.
 - a) Arătați că $f_a \circ f_b = f_{ab}, \forall a, b \in \mathbb{R}^*$.
 - b) Demonstrați că G este grup în raport cu operația de compunere a funcțiilor.
 - c) Determinați $a \in \mathbb{R}^*$ astfel încât $(f_a \circ f_a \circ f_a)(x) = 8x - 21$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

Subiectul III

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x}{x^2 - 3x + 2}$.
 - a) Determinați ecuațiile asimptotelor verticale ale graficului funcției f .
 - b) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^{\frac{1}{x}}$.
 - c) Rezolvați ecuația $f''(x) = 0, x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.
2. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \int_0^1 \frac{t^x}{t^2 + 2} dt$.
 - a) Calculați $f(1)$.
 - b) Arătați că $f(x+2) + 2f(x) = \frac{1}{x+1}$, oricare ar fi $x > 0$.
 - c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$.

Testul 11

Subiectul I

1. Fie $z \in \mathbb{C}$ cu $|z| = |z - 1|$. Calculați partea reală a lui z .
2. În funcțiile $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x + 3$ și $g(x) = -x^2 + 4x + a$, $a \in \mathbb{R}$. Determinați valorile reale ale lui a pentru care imaginile celor două funcții au exact un element în comun.
3. Rezolvați ecuația $2^{3x} + 1 = 3^{2x}$, $x \in \mathbb{R}$.
4. Câte submulțimi ordonate cu 3 elemente, ale mulțimii $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, conțin elementul 1?
5. Fie punctele $A(-1, 3)$ și $B(0, 4)$. Determinați coordonatele simetricului lui B față de A .
6. În triunghiul ABC , punctul $D \in (BC)$ este piciorul bisectoarei din A a triunghiului și R_1, R_2 sunt razele cercurilor circumscrise triunghiurilor ABD , respectiv ACD . Arătați că dacă $R_1 = R_2$, atunci $AB = AC$.

Subiectul II

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

- a) Calculați rangul matricei $A^2 - I_3$.
- b) Determinați numerele reale a și b astfel încât $A^2 = aA + bI_3$.
- c) Determinați inversa matricei A .

2. Pe mulțimea $G = (1, \infty)$ definim legea $x * y = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 y - x^2 - y^2 + 5}$.

- a) Arătați că $x * y = \sqrt{\frac{1}{4}(x^2 - 1)(y^2 - 1) + 1}$, oricare ar fi $x, y \in (1, \infty)$.
- b) Demonstrați că G este grup în raport cu legea „*“.
- c) Demonstrați că funcția $f: (0, \infty) \rightarrow (1, \infty)$, $f(x) = \sqrt{2x + 1}$ este izomorfism de la grupul $((0, \infty), \cdot)$ la grupul $(G, *)$.

Subiectul III

1. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x^2} - 1 - x^2$.

- a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de pe grafic, de abscisă $x_0 = 1$.
- b) Arătați că $2f(x) \geq x^4$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
- c) Studiați derivabilitatea în punctul $x = 0$ a funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt[4]{f(x)}$.

2. Fie șirul $I_n = \int_0^1 (x^2 + 2x + 2)^n dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.

- a) Calculați I_1 .
- b) Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \infty$.
- c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5^n} ((2n+1) I_n - 2n I_{n-1})$.

Testul 12

Subiectul I

1. Arătați că numărul $\frac{1}{1+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}+3}$ este număr natural.
2. Fie $f: \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție impară. Calculați $f(-2) \cdot f(-1) \cdot f(0) \cdot f(1) \cdot f(2)$.
3. Rezolvați ecuația $\sqrt[3]{1-x} = x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.
4. Determinați numărul de elemente ale unei mulțimi care are exact 16 submulțimi cu un număr impar de elemente.
5. Fie punctele $A(-1, 0)$, $B(2, -3)$ și $C(3, -2)$. Scrieți ecuația înălțimii din A a triunghiului ABC .
6. Arătați că $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ = \frac{3}{2}$.

Subiectul II

1. Fie mulțimea $M = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid X^4 = O_2\}$ și $A = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

- a) Verificați dacă $A \in M$.
- b) Arătați că dacă $X \in M$, atunci $X^2 = O_2$.
- c) Arătați că ecuația $Y^2 = A$ nu are soluții în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

2. Pe intervalul $(2, \infty)$ se consideră legea de compoziție asociativă $x * y = (x - 2)^{\ln(y-2)} + 2$.

- a) Arătați că legea de compoziție „*“ are element neutru.
- b) Determinați elementele nesimetrizabile din intervalul $(2, \infty)$, în raport cu legea „*“.
- c) Rezolvați ecuația $x * x * x * x = 5$, $x \in (2, \infty)$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x + x - 1$.

- a) Arătați că funcția f este bijectivă.
- b) Determinați asimptotele graficului funcției $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.
- c) Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ definit astfel: $x_1 = -1$ și $x_{n+1} = f(x_n)$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$.

- a) Calculați aria suprafeței mărginite de graficul funcției f , axa Ox și dreptele $x = 0$ și $x = \pi$.
- b) Calculați $\int_0^{2\pi} x f(x) dx$.
- c) Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x (f(t) - 1) dt$.

Testul 13

Subiectul I

1. Câte numere raționale conține mulțimea $\{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{2012}\}$.
2. Fie funcția bijectivă $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + x + 2$. Calculați $(f^{-1} \circ f^{-1})(2)$.
3. Rezolvați ecuația $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0$, $x \in [0, 2\pi)$.
4. Câte permutări ale mulțimii $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ au pe prima poziție un număr par?
5. Demonstrați egalitatea: $C_3^3 + C_4^3 + C_5^3 + C_6^3 = C_7^4$.
6. În triunghiul ABC are loc relația $\sin A = 2 \sin B \cos C$. Arătați că triunghiul ABC este isoscel.

Subiectul II

1. Fie mulțimea $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ și $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.
 - a) Arătați că orice matrice din mulțimea M , diferită de O_2 , este inversabilă.
 - b) Arătați că dacă $X \in M_2(\mathbb{Q})$ și $AX = XA$, atunci $X \in M$.
 - c) Rezolvați ecuația $X^2 = A$, $X \in M_2(\mathbb{Q})$.
2. Fie mulțimea $G = \{f_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f_k(x) = 3^k x + 2 \cdot 3^k - 2, k \in \mathbb{Z}\}$.
 - a) Să se arate că $f_k \circ f_p = f_{k+p}$, oricare ar fi $k, p \in \mathbb{Z}$.
 - b) Să se arate că G este grup în raport cu operația de compunere a funcțiilor.
 - c) Să se arate că mulțimea $H = \{f_{3k} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ este subgrup al grupului (G, \circ) .

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctg x - \arctg(x+1)$.
 - a) Determinați punctele de extrem ale funcției f .
 - b) Determinați numărul de soluții reale ale ecuației $f(x) = m$, $m \in \mathbb{R}$.
 - c) Arătați că $f(x) > -\frac{1}{x^2+1}$, oricare ar fi $x \in [0, \infty)$.
2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_0^1 x^n \sin x \, dx$.
 - a) Calculați I_1 .
 - b) Arătați că $I_n + n(n-1)I_{n-2} = n \sin 1 - \cos 1$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n$.

Testul 14

Subiectul I

1. Determinați partea reală a numărului complex $z = \frac{1+i}{1-2i} + \frac{1+2i}{1-i}$.
2. Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = [2x] - [x] - \left[x + \frac{1}{2}\right]$ este periodică, cu perioada $\frac{1}{2}$.
3. Rezolvați ecuația $4^x = 2^{\frac{1}{x}}$, $x \in \mathbb{R}^*$.
4. Determinați numerele naturale n , $n \geq 2$ pentru care $C_n^1 + 2C_n^2 = 16$.
5. Fie punctele $A(1, 2)$ și $G(3, 4)$. Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC , determinați coordonatele mijlocului BC .
6. Triunghiul ABC are $BC = 10$ și raza cercului circumscris $R = 5$. Calculați $\cos A$.

Subiectul II

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2b \\ b & 1 & -a \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ cu $a, b \in \mathbb{R}$.
 - a) Determinați valorile reale ale lui a și b pentru care $\det(A) = -6$.
 - b) Arătați că pentru orice valori reale ale lui a și b , rangul matricei A este cel puțin 2.
 - c) Fie $M = \{X \in M_3(\mathbb{R}) \mid \det(X) = 1\}$. Rezolvați ecuația $AX = -\sqrt[3]{6} I_3$, $X \in M$.
2. Pe \mathbb{R} definim legea de compoziție $x * y = xy + 3x + 3y + 7$.
 - a) Arătați că legea „ $*$ ” este comutativă.
 - b) Calculați $\frac{(1 * 2) * 3}{1 * (2 * 3)}$.
 - c) Arătați că legea „ $*$ ” nu are element neutru.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x + 3x - 1$.
 - a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul $A(1, e + 2)$.
 - b) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(-1) + f(-2) + \dots + f(-n) + \frac{3n^2 + 5n}{2} \right)$.
 - c) Determinați valorile reale ale lui m pentru care $f(x) \geq mx$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
2. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $f(x) = \arctg x$.
 - a) Calculați $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2+1} \, dx$.
 - b) Calculați $\int_{-1}^1 f^{101}(x) \, dx$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^3 f^n(x) \, dx$.

Testul 15

Subiectul I

1. Câte numere raționale conține mulțimea $\{\sqrt[n]{1024} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$.
2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + x + a, a \in \mathbb{R}$. Determinați valorile reale ale lui a pentru care f este impară.
3. Rezolvați ecuația $\log_2 \frac{4^x + 2}{3} = x, x \in \mathbb{R}$.
4. Câte funcții $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ au mulțimea imaginilor formată din exact două elemente?
5. Fie punctele $A(1, 3), B(-3, 5)$ și $M(-1, a), a \in \mathbb{R}$. Determinați valorile reale ale lui a pentru care M se află pe mediatoarea segmentului $[AB]$.
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor a, b și c . Dacă $R = 4$ și $r = 1$, calculați $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac}$.

Subiectul II

1. Fie numerele întregi a, b și matricea $A = \begin{pmatrix} a^2 & a^2 + 1 & a^2 + 2 \\ b^2 - 1 & b^2 & b^2 + 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați $\det(A)$.
 - b) Arătați că $\text{rang}(A) \geq 2$, oricare ar fi numerele întregi a și b .
 - c) Arătați că dacă $\text{rang}(A) = 2$, atunci $a = 0$ și $|b| = 1$.
2. Pe mulțimea $G = (-2, 2)$ se definește legea de compoziție $x * y = \frac{4(x+y)}{4+xy}$.
 - a) Rezolvați ecuația $x * x = x, x \in (-2, 2)$.
 - b) Arătați că G este grup în raport cu legea „*“.
 - c) Arătați că funcția $f: (0, \infty) \rightarrow (-2, 2), f(x) = \frac{2(x-1)}{x+1}$ este izomorfism de la grupul $((0, \infty), \cdot)$ la grupul $(G, *)$.

Subiectul III

1. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.
 - a) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .
 - b) Studiați derivabilitatea funcției $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = |f(x)|$ în punctul $x_0 = -2$.
 - c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x^2} \right)^{\frac{1}{x}}$.
2. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ și notăm cu $I_n = \int_0^1 f^n(x) dx, n \in \mathbb{N}$.
 - a) Determinați aria suprafeței mărginite de graficul funcției f , axa Ox și dreptele $x = -1, x = 1$.
 - b) Arătați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.
 - c) Arătați că $2n I_{n+1} - (2n-1) I_n = \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^*$.

Testul 16

Subiectul I

1. Determinați numărul natural n pentru care $8(1 + 3^2 + 3^4 + \dots + 3^{2n}) = 6560$.
2. Determinați mulțimea valorilor întregi ale lui a pentru care graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + ax + 1$ nu taie axa Ox .
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\sqrt[3]{x+1} + \sqrt{x+2} = 5$.
4. Care este probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de trei cifre, el să fie cubul unui număr prim?
5. Fie triunghiul ABC și $M \in (BC)$ astfel încât $5 \overline{AM} = 2 \overline{AB} + 3 \overline{AC}$. Calculați $\frac{BM}{MC}$.
6. Triunghiul ABC are $AC^2 + AB^2 + AB \cdot AC = BC^2$. Determinați măsura unghiului A .

Subiectul II

1. Fie mulțimea $M = \left\{ A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A^3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$.
 - a) Arătați că rangul lui A este 2, oricare ar fi $A \in M$.
 - b) Arătați că pentru orice $A \in M$, ecuația $X^2 = A$ nu are soluție în $M_2(\mathbb{R})$.
 - c) Arătați că dacă $A \in M$, atunci matricea $A - I_2$ este inversabilă.
2. Considerăm inelul $(\mathbb{Z}, *, \circ)$ unde $x * y = x + y + 2$ și $x \circ y = xy + 2x + 2y + 2$.
 - a) Determinați elementul neutru al legii „*“.
 - b) Arătați că inelul $(\mathbb{Z}, *, \circ)$ nu are divizori ai lui zero.
 - c) Determinați $a, b \in \mathbb{Z}$ știind că funcția $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = ax + b$ este morfism de la inelul $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ la inelul $(\mathbb{Z}, *, \circ)$.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$.
 - a) Studiați derivabilitatea funcției f în punctul $x_0 = 1$.
 - b) Determinați punctele de inflexiune ale graficului funcției f .
 - c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x)$.
2. Fie funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln(1+x)$.
 - a) Determinați primitiva F a funcției f , cu $F(0) = 0$.
 - b) Calculați $\int_0^1 \frac{f(x)}{x+1} dx$.
 - c) Calculați $\int_0^{\pi/4} f(\tan x) dx$.

Testul 17

Subiectul I

1. Determinați numerele reale x pentru care $[x-1] = \{x\}$.
2. Determinați inversa funcției bijective $f: \mathbb{R} \rightarrow (3, \infty)$, $f(x) = 2^x + 3$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\cos x = \tan x$.
4. Care este probabilitatea ca alegând un număr k din mulțimea $\{0, 1, 2, \dots, 6\}$, el să îndeplinească condiția $C_7^k < C_7^{k+1}$?
5. Fie $a \in \mathbb{R}$ și vectorii $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{v} = 3\vec{i} + a\vec{j}$. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care vectorii $\vec{u} + \vec{v}$ și $\vec{u} - \vec{v}$ sunt perpendiculari.
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor $AB = 4$, $BC = 5$ și $AC = 7$. Calculați $\sin A$.

Subiectul II

1. Fie mulțimea $M = \left\{ A(x) = \begin{pmatrix} 1+3x & 6x \\ -x & 1-2x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$.
 - a) Determinați valorile reale ale lui x pentru care $\det(A(x)) = 2$.
 - b) Arătați că $A(x) \cdot A(y) = A(xy + x + y)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$.
 - c) Arătați că $(A(3))^n = A(4^n - 1)$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Fie corpul $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ și $H = \{x^3 \mid x \in \mathbb{Z}_7\}$.
 - a) Rezolvați ecuația $\hat{5}x + \hat{4} = \hat{1}$, $x \in \mathbb{Z}_7$.
 - b) Determinați numărul elementelor lui H .
 - c) Determinați perechile $(x, y) \in \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7$ pentru care $x^3 + \hat{2}y^3 = \hat{0}$.

Subiectul III

1. Fie $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$.
 - a) Determinați asimptotele graficului funcției f .
 - b) Determinați imaginea funcției f .
 - c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right)^x$.
2. Fie șirul $(I_n)_{n \geq 1}$, $I_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg}^n x \, dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Calculați I_2 .
 - b) Arătați că $I_{n+2} = \frac{1}{n+1} - I_n$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Testul 18

Subiectul I

1. Numerele $\sqrt{3}$ și 3 sunt termeni ai unei progresii aritmetice $(a_n)_{n \geq 1}$ cu rația r . Arătați că r este număr irațional.
2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x}$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$. Calculați $f(2)$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\log_2 x = \log_3 x$.
4. Determinați valorile naturale ale lui n pentru care dezvoltarea $(1 + \sqrt[3]{2})^n$ are exact 7 termeni raționali.
5. Fie $A(1, 2)$ și $B(3, -1)$. Determinați ecuațiile dreptelor care trec prin A și sunt situate la distanța 2 de B .
6. Triunghiul ABC are $AB = 4$, $AC = 6$ și $BC = 2\sqrt{19}$. Calculați $\sin A$.

Subiectul II

1. Se consideră sistemul
$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + my + 3z = 0 \\ x + 3y + z = 4 \end{cases}$$
, unde $m \in \mathbb{R}$.
 - a) Determinați valorile reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil determinat.
 - b) Stabiliți dacă există valori reale ale lui m pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
 - c) Determinați valorile reale ale lui m pentru care sistemul are o soluție (x_0, y_0, z_0) cu componentele în progresie aritmetică.
2. Fie polinomul $f = (X^2 + X + 1)^{10} + (X^2 - X + 1)^{10} \in \mathbb{R}[X]$ și $f = a_{20}X^{20} + a_{19}X^{19} + \dots + a_1X + a_0$ forma sa algebrică.
 - a) Determinați restul împărțirii lui f la $X^2 - 1$.
 - b) Calculați $a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{20}$.
 - c) Calculați a_7 .

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \setminus \{-4\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+3}{x+4}$.
 - a) Determinați asimptotele graficului funcției f .
 - b) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + f(1) f(2) \dots f(n))^n$.
 - c) Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ definit astfel: $x_1 = 1$ și $x_{n+1} = f(x_n)$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 3$ și $I_n = \int_1^3 f^n(x) \, dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Determinați aria suprafeței mărginite de graficul lui f , axa Ox și dreptele $x = 0$, $x = 1$.
 - b) Calculați $\int_1^3 (x-2) f^2(x) \, dx$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n}$.

Testul 19

Subiectul I

1. Fie numărul complex nereal z astfel încât $\frac{z^2 + z + 1}{z}$ este număr real. Calculați modulul numărului z .
2. Fie $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x + 5$. Determinați mulțimea B știind că f este surjectivă.
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $x^2 + 8^{\log_2 x} = 12$.
4. Determinați numărul real x știind că termenul din mijloc al dezvoltării $(1+x)^8$ este egal cu 70.
5. Fie hexagonul regulat $ABCDEF$ de latură 1. Calculați $|\overline{AC} + \overline{EF}|$.
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor a, b, c . Dacă $b + c - a = 2r$, unde r este raza cercului înscris în triunghi, calculați măsura unghiului A .

Subiectul II

1. Fie sistemul:
$$\begin{cases} x + 3y + z = 0 \\ x + y + mz = 0 \\ x + 2y + (m+1)z = 0 \end{cases}, \text{ unde } m \in \mathbb{R}.$$
 - a) Determinați valorile lui m pentru care sistemul are soluții nenule.
 - b) Determinați soluțiile (x_0, y_0, z_0) ale sistemului pentru care $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 6$.
 - c) Fie A matricea sistemului pentru $m = -2$. Arătați că $A^n \neq I_2$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.
2. În polinomul $f_a = (X+a)^{12} + (X-a)^{12}$, unde a este un număr real.
 - a) Determinați restul împărțirii lui f_a la polinomul $x^2 - a^2$.
 - b) Determinați rădăcinile lui f_a în cazul în care f_a are cel puțin o rădăcină reală.
 - c) Arătați că pentru orice $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, rădăcinile în \mathbb{C} ale lui f_a au partea reală zero.

Subiectul III

1. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \sin x$.
 - a) Arătați că f este strict crescătoare.
 - b) Calculați: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x^3}$.
 - c) Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit astfel: $x_0 = 1$ și $x_{n+1} = f(x_n)$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. Fie $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctg \frac{1}{x+1}$.
 - a) Arătați că orice primitivă a lui \mathbb{R} este concavă.
 - b) Calculați: $\int_0^1 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx$.
 - c) Calculați: $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+2} f(t) dt$.

Testul 20

Subiectul I

1. Determinați numărul natural x astfel încât: $1 + 5 + 9 + \dots + x = 496$.
2. Fie funcțiile $f, g: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ astfel încât $(g \circ f)(x) = x^4$, oricare ar fi $x \in (0, \infty)$. Arătați că f este injectivă.
3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x+1} + \log_2 x = 6$.
4. Aflați cel mai mic termen al dezvoltării $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)^7$.
5. Fie punctele $A(-1, 2)$, $B(-4, 6)$ și $C(3, -1)$. Aflați lungimea bisectoarei din A a triunghiului ABC .
6. Calculați $\cos 2^\circ + \cos 6^\circ + \cos 10^\circ + \dots + \cos 178^\circ$.

Subiectul II

1. Fie sistemul
$$\begin{cases} a^2x - b^2y + z = 1 \\ (a^2 + 1)x - (b^2 - 1)y + 2z = 2 \\ (a^2 + 2)x - (b^2 - 2)y + 4z = 4 \end{cases}, \text{ unde } a, b \in \mathbb{R}.$$
 - a) Calculați determinarea matricei sistemului.
 - b) Determinați valorile lui a și b pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
 - c) Arătați că dacă (x_0, y_0, z_0) este soluția sistemului, atunci: $x_0 + y_0 + z_0 \neq 2012$.
2. Fie polinomul $f = X^4 - 4X + 1$ și $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$ rădăcinile lui.
 - a) Calculați $\left(1 - \frac{1}{x_1}\right)\left(1 - \frac{1}{x_2}\right)\left(1 - \frac{1}{x_3}\right)\left(1 - \frac{1}{x_4}\right)$.
 - b) Arătați că $x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 + x_4^5 = 0$.
 - c) Arătați că f are exact două rădăcini reale.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x^4 + 10x^2 + 1$.
 - a) Arătați că există $a, b \in \mathbb{R}$ cu $a < b$ astfel încât să se poată aplica funcției f teorema lui Rolle.
 - b) Determinați imaginea funcției f .
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n)}{n^5} \right)$.
2. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(\ln x)$.
 - a) Calculați $I_n = \int_0^e \frac{f(x)}{x} dx$.
 - b) Calculați aria suprafeței mărginite de graficul lui f , axa Ox și dreptele $x = 1$ și $x = e$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_e^{e^2} f^n(x) dx$.

Testul 21

Subiectul I

1. Arătați că $(-\infty, \log_2 3) \cap (1, +\infty) \neq \emptyset$.
2. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 1$. Calculați $f(f(1))$.
3. Rezolvați ecuația $4^x + 2^x = 72$.
4. Determinați $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, știind că $A_n^2 = 110$.
5. Determinați ecuația dreptei ce trece prin punctul $A(1, 1)$ și este perpendiculară pe dreapta de ecuație $x + y - 1 = 0$.
6. Calculați raza cercului înscris în triunghiul ABC cu $AB = 3, BC = 4, CA = 5$.

Subiectul II

1. Considerăm permutările $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ și $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculați σ^2 .

b) Arătați că mulțimea $\{\sigma^m \mid m \in \mathbb{N}^*\}$ are 3 elemente.

c) Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\sigma^m = \tau^n$. Arătați că 6 divide mn .

2. Se consideră mulțimea $M = \left\{ A(n) \mid A(n) = \begin{pmatrix} 1+n & -n \\ n & 1-n \end{pmatrix}, n \in \mathbb{Z} \right\}$.

a) Arătați că $A(n) \cdot A(m) = A(n+m)$, oricare ar fi $n, m \in \mathbb{Z}$.

b) Demonstrați că M este grup în raport cu înmulțirea matricelor.

c) Arătați că $f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (M, \cdot), f(n) = A(n)$ este izomorfism de grupuri.

Subiectul III

1. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

a) Calculați derivata funcției f .

b) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul $A(0, 1)$.

c) Determinați asimptotele la graficul funcției f .

2. Pentru fiecare număr natural nenul n definim $I_n = \int_0^1 x^n \cdot \sin x \, dx$.

a) Calculați I_1 .

b) Arătați că $I_{n+1} \leq I_n$, oricare ar fi $n \geq 1$.

c) Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Testul 22

Subiectul I

1. Calculați suma primilor zece termeni ai unei progresii aritmetice având primul termen egal cu -10 și rația egală cu 2 .
2. Determinați coordonatele vârfului parabolei ce reprezintă graficul funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^2 + x - 3$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\log_2(x+1) = -1$.
4. Câte submulțimi ordonate cu 3 elemente are o mulțime cu 4 elemente?
5. Scrieți coordonatele unui punct ce aparține dreptei de ecuație $x - 2y + 3 = 0$.
6. Fie $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \sin a = \frac{3}{5}$. Calculați $\cos a$.

Subiectul II

1. Considerăm sistemul de ecuații liniare $\begin{cases} x + y + mz = 0 \\ x + 2y + z = 1 \\ -x + y + z = 4 \end{cases}$, unde $m \in \mathbb{R}$.

a) Determinați valorile reale ale lui m pentru care $(-2, 1, 1)$ este soluție a sistemului.

b) Calculați determinantul matricei sistemului.

c) Rezolvați sistemul pentru $m = \frac{1}{3}$.

2. Pe \mathbb{R} definim legea de compoziție $x \circ y = xy + x + y$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$.

a) Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $x \circ x = 8$.

b) Arătați că legea „ \circ ” este asociativă.

c) Arătați că dacă $x, y \in (-1, \infty)$, atunci $x \circ y \in (-1, \infty)$.

Subiectul III

1. Considerăm șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ definit prin $a_1 = 1$ și $a_{n+1} = \sqrt{12 + a_n}, n \geq 1$.

a) Arătați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este crescător.

b) Arătați că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este mărginit superior de 4 .

c) Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$.

2. Considerăm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x \cdot e^{-x}$.

a) Calculați $\int_0^1 e^x f(x) \, dx$.

b) Calculați $\int_0^1 f(x) \, dx$.

c) Demonstrați că $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) \, dt}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Testul 23

Subiectul I

1. Calculați $(1 + \sqrt[3]{2})(1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})$.
2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2 + 3x$. Calculați $f(-10) + f(-9) + \dots + f(9) + f(10)$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $8^{x+1} = 4^{1-x}$.
4. Rezolvați în mulțimea $[0, 2\pi)$ ecuația $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
5. Arătați că vectorii $\vec{v}_1 = \vec{i} + 8\vec{j}$ și $\vec{v}_2 = 4\vec{i} - 7\vec{j}$ au module egale.
6. Calculați perimetrul triunghiului ABC știind că $A = 120^\circ$, $AB = 3$ și $AC = 7$.

Subiectul II

1. Considerăm matricele $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Arătați că $\text{rang} A + \text{rang} B = 3$.
- b) Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\det(A + xB) = 0$.
- c) Arătați că $(A + B)^n = A^n + B^n$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Polinomul $f = X^3 - X - 1 \in \mathbb{C}[X]$ are rădăcinile complexe x_1, x_2, x_3 .

- a) Aflați restul împărțirii lui f la polinomul $X^2 - 1$.
- b) Calculați $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$.
- c) Arătați că $f(x_1 + x_2) = -2$.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x - 1 - \ln(x+1)$.

- a) Calculați derivata funcției f .
- b) Arătați că funcția f este convexă.
- c) Demonstrați că $f(x) \geq 0$, oricare ar fi $x \in (-1, \infty)$.

2. Considerăm funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$.

- a) Calculați $\int_1^2 f(x) dx$.

- b) Calculați $\int_1^{\sqrt{3}} f(x^2) dx$.

- c) Determinați valorile lui $a \in (1, \infty)$ pentru care $\int_a^\infty f(x) dx = -1$.

Testul 24

Subiectul I

1. Calculați partea întreagă a numărului $\frac{1}{\sqrt{2}-2}$.
2. Determinați valorile reale ale numărului m știind că abscisa vârfului parabolei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + mx + 1$ este egală cu 2.
3. Rezolvați ecuația $\sin x = -1$ în mulțimea numerelor reale.
4. Determinați termenul din mijloc al dezvoltării $(1 + \sqrt[3]{2})^6$.
5. Calculați lungimea vectorului $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$, unde $\vec{v}_1 = \vec{i} - \vec{j}$ și $\vec{v}_2 = 2\vec{i} - 3\vec{j}$.
6. Fie $a \in \mathbb{R}$ cu $\sin a = 0,6$. Calculați $\text{tg}^2 a$.

Subiectul II

1. Fie matricele $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Determinați rangul matricei A^2 .
- b) Arătați că inversa matricei $I_3 - A$ este $I_3 + A + A^2$.
- c) Calculați inversa matricei $I_3 + A$.

2. Pentru fiecare număr natural nenul n considerăm polinomul $f_n = X^{2n} + X^n + 1 \in \mathbb{C}[X]$.

- a) Determinați rădăcinile complexe ale polinomului f_1 .
- b) Aflați câtul împărțirii polinomului f_2 la polinomul f_1 .
- c) Demonstrați că f_1 divide f_n dacă și numai dacă 3 nu divide n .

Subiectul III

1. Considerăm șirul $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, $n \geq 1$.

- a) Arătați că $a_{2^{n+1}} - a_{2^n} \geq \frac{1}{2}$, oricare ar fi $n \geq 1$.

- b) Arătați că $a_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$, oricare ar fi $n \geq 1$.

- c) Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

- a) Scrieți o primitivă a funcției f .

- b) Calculați $\int_0^1 xf(x) dx$.

- c) Calculați $\int_0^1 x^3 f'(x) dx$.

Testul 25

Subiectul I

1. Arătați că $100^{1/7} \in \mathbb{N}$.
2. Determinați punctul de maxim al funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 + 2x + 1$.
3. Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 1$ este injectivă.
4. Câte diagonale are un poligon convex cu 10 laturi?
5. Calculați distanța de la punctul $A(1, 1)$ la dreapta determinată de punctele $B(2, 3)$ și $C(-1, 5)$.
6. Calculați raza cercului circumscris unui triunghi ABC cu $AB = 5$ și $m(\angle C) = 120^\circ$.

Subiectul II

1. Considerăm matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- a) Calculați $\det A$.
 - b) Calculați $\text{rang} B$.
 - c) Determinați matricea $X \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ astfel încât $XA = B$.
2. Fie $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât rădăcinile $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ ale polinomului $f = X^3 + aX^2 + bX - 1$ verifică $|z_1| \geq 1$, $|z_2| \geq 1$, $|z_3| \geq 1$.
- a) Calculați $z_1 z_2 z_3$.
 - b) Arătați că $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$.
 - c) Demonstrați că $a + b = 0$.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1 - x \ln x}{x}$.

- a) Calculați derivata funcției f .
- b) Calculați $\lim_{x \downarrow 0} f(x)$.
- c) Demonstrați că există un unic punct $c \in (0, \infty)$ cu proprietatea că $c \cdot \ln c = 1$.

2. Fie funcția $f: (-2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}}$.

- a) Calculați $\int_0^1 x f(x) dx$.
- b) Calculați $\int_0^1 f(x) \cdot \arcsin \frac{x}{2} dx$.
- c) Arătați că $\int_{-1}^0 f(x^2) dx = \int_0^1 f(x^2) dx$.

Testul 26

Subiectul I

1. Determinați $z \in \mathbb{C}$ știind că $z + 2\bar{z} = 9i$.
2. Arătați că dreapta de ecuație $y = x + 1$ intersectează parabola de ecuație $y = x^2 - 3x + 2$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $(1 + \sqrt{2})^x = 3 + 2\sqrt{2}$.
4. Considerăm mulțimea $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determinați probabilitatea ca, alegând o submulțime a mulțimii M , aceasta să aibă 3 elemente.
5. Considerăm punctele $A(1, 2)$, $B(0, 1)$ și $G(-1, 2)$. Aflați coordonatele punctului C știind că G e centrul de greutate al triunghiului ABC .
6. Fie $a \in \mathbb{R}$ cu $\text{tg } a = \frac{1}{2}$. Calculați $\text{tg} \left(a + \frac{\pi}{3} \right)$.

Subiectul II

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Calculați $\det(A + {}^tA)$, unde tA este transpusa matricei A .
 - b) Arătați că $A^2 - A = I_2$.
 - c) Fie $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$, cu $AB = BA$. Arătați că $\text{rang } B \neq 1$.
2. Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție periodică și mulțimea $M = \{t \in \mathbb{R} \mid f(x+t) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$.
- a) Arătați că dacă $t \in M$, atunci $-t \in M$.
 - b) Arătați că M e subgrup al grupului $(\mathbb{R}, +)$.
 - c) Dați exemplu de funcție periodică f pentru care $M = \mathbb{Z}$.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 1) \arctg x$.

- a) Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^3 - 1}$.
- b) Calculați derivata funcției f .
- c) Determinați asimptota la graficul funcției f către ∞ .

2. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$.

- a) Calculați $\int_0^1 x f(x) dx$.
- b) Calculați $\int_0^1 x f(x^2) dx$.
- c) Demonstrați că șirul $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{k^2 + 4n^2}$, $n \geq 1$, este convergent.

Testul 27

Subiectul I

- O progresie geometrică de numere reale are al doilea termen egal cu 2 și al cincilea termen egal cu 16. Calculați rația progresiei.
- Calculați $\frac{p}{q} + \frac{q}{p}$ știind că $p + q = 6$ și $pq = 3$.
- Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$.
- Determinați numărul submulțimilor cu cel mult 3 elemente ale mulțimii $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ce conțin cel puțin un număr impar.
- Fie ABC un triunghi echilateral de latură 4. Calculați $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$.
- Fie $a \in \mathbb{R}$ cu $\operatorname{tg} a = \frac{1}{3}$. Calculați $\sin^2 a$.

Subiectul II

- Considerăm matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.
 - Calculați rang A .
 - Arătați că $A^n = 14^{n-1}A$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
 - Arătați că inversa matricei $I_3 - A$ este $I_3 - \frac{1}{13}A$.
- Considerăm polinomul $f = X^3 + X^2 + aX + b \in \mathbb{Z}[X]$.
 - Aflați valorile întregi ale lui a știind că $\sqrt{2}$ este rădăcină a polinomului f .
 - Aflați valorile întregi ale lui a și b pentru care f admite rădăcina dublă 1.
 - Demonstrați că nu există $a, b \in \mathbb{Z}$ astfel încât f să aibă o rădăcină triplă.

Subiectul III

- Considerăm funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln^2 x - \ln x + x$.
 - Calculați $f'(1)$.
 - Rezolvați ecuația $f''(x) = 0, x \in (0, \infty)$.
 - Determinați punctele de extrem ale funcției f .
- Pentru fiecare număr $n \in \mathbb{N}^*$ definim $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{(x+1)^2} dx$.
 - Calculați I_1 .
 - Arătați că $I_{n+2} + 2I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
 - Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Testul 28

Subiectul I

- Determinați partea reală a numărului complex $z = \frac{1+i}{1-i}$.
- Fie $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ rădăcinile ecuației $x^2 - 5x + 2 = 0$. Calculați $x_1 + x_2 - x_1x_2$.
- Arătați că funcția $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x$, este injectivă.
- Arătați că $C_{100}^{50} = 2 C_{99}^{50}$.
- Fie $ABCD$ un pătrat de latură $\sqrt{2}$. Calculați lungimea vectorului $\overline{AB} + \overline{DA}$.
- Fie $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ cu $\sin x = \frac{1}{2}$. Calculați $\operatorname{tg} 2x$.

Subiectul II

- Considerăm numerele distincte $a, b, c \in \mathbb{R}$ și sistemul de ecuații liniare

$$\begin{cases} x + ay + a^2z = a^3 \\ x + by + b^2z = b^3 \\ x + cy + c^2z = c^3 \end{cases}$$
 - Arătați că determinantul sistemului este egal cu $(c-a)(c-b)(b-a)$.
 - Arătați că sistemul este compatibil determinat.
 - Rezolvați sistemul.
- Considerăm inelul claselor de resturi $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$.
 - Rezolvați în \mathbb{Z}_{12} ecuația $2x = \hat{6}$.
 - Rezolvați în \mathbb{Z}_{12} ecuația $x^2 = \hat{1}$.
 - Arătați că dacă $x \in \mathbb{Z}_{12}$ verifică $x^{11} = \hat{1}$, atunci $x = \hat{1}$.

Subiectul III

- Fie $m \in \mathbb{R}$ și funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{mx}{x^2 + 1}$.
 - Determinați asimptotele graficului funcției m .
 - Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care $f'(0) = 1$.
 - Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că $|f(x)| \leq 1$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
- Considerăm funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + e^x$ și $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \int_0^x f(t) dt$.
 - Calculați $F(1)$.
 - Arătați că funcția F este inversabilă.
 - Calculați $\int_0^{\frac{e-2}{3}} F^{-1}(x) dx$.

Testul 29

Subiectul I

1. Ordonăți crescător numerele $\sqrt[3]{64}$, $\lg 100$ și $\sqrt{17}$.
2. Arătați că $4x^2 + 3x + 1 > 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\arctg(x+1) = \frac{\pi}{4}$.
4. Determinați $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, știind că $n+135 = C_n^2$.
5. Arătați că unghiul vectorilor $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j}$ și $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$ este obtuz.
6. În triunghiul ABC avem $AB = 5$, $BC = 6$, $CA = 7$. Calculați lungimea medianei din A .

Subiectul II

1. Pentru fiecare număr real x considerăm matricea $A(x) = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați $\det A(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Arătați că $A(x) \cdot A(y) = A(x+y)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$.
 - c) Determinați inversa matricei $A(\frac{\pi}{4})$.
2. Considerăm ecuația cu coeficienți reali $2x^3 + x^2 - 13x + m = 0$, având rădăcinile $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$.
 - a) Rezolvați ecuația pentru $m = 0$.
 - b) Calculați $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
 - c) Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că $x_1 x_2 = 1$.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln \frac{1+x}{x}$.
 - a) Arătați că funcția este strict monotonă.
 - b) Determinați asimptotele graficului funcției f .
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(1) + f(2) + \dots + f(n))$.
2. Fie funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$.
 - a) Calculați $\int_1^e f(x) dx$.
 - b) Calculați $\int_1^e e^x (f(x) + f'(x)) dx$.
 - c) Arătați că $\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \int_t^1 f(x) dx = -1$.

Testul 30

Subiectul I

1. Calculați modulul numărului complex $z = -3 + 4i$.
2. Aflați punctele de intersecție ale graficului funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 3x + 2$ cu axa Ox .
3. Rezolvați ecuația $\log_3 x = \log_{25} 2x$.
4. Calculați $C_7^3 - A_6^2$.
5. Aflați $a \in \mathbb{R}$ știind că dreptele $d_1: x - 2y = 0$ și $d_2: ax + y + 5 = 0$ sunt paralele.
6. Fie $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sin x + \cos x = 1$. Calculați $\sin 2x$.

Subiectul II

1. Considerăm matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{Z})$.
 - a) Calculați $\det A$.
 - b) Determinați valorile lui $a \in \mathbb{Z}$ pentru care $\text{rang} A = 2$.
 - c) Calculați A^{-1} pentru $a = 0$.
2. Considerăm polinomul $f = X^4 + X^2 - X + 1 \in \mathbb{C}[X]$ cu rădăcinile complexe x_1, x_2, x_3, x_4 .
 - a) Calculați restul împărțirii lui f la polinomul $g = X^2$.
 - b) Calculați $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}$.
 - c) Arătați că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.

Subiectul III

1. Fie $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$.
 - a) Arătați că funcția f este continuă în punctul $x = 1$.
 - b) Calculați $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.
 - c) Arătați că $f'(x) \leq 0$, oricare ar fi $x > 0$.
2. Fie M mulțimea funcțiilor continue $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ cu $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$.
 - a) Arătați că funcția $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x$ aparține mulțimii M .
 - b) Funcția $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 + x + a$ aparține lui M . Determinați $a \in \mathbb{R}$.
 - c) Demonstrați că pentru orice funcție $f \in M$ există $c \in [0, 1]$ astfel încât $f(c) = c$.

Testul 31

Subiectul I

1. Fie $a = \sqrt[3]{1024}$, $b = \sqrt[3]{4}$ și $c = \sqrt{4}$. Verificați dacă $ab = c^4$.
2. Determinați imaginea funcției $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\left(\frac{2}{5}\right)^x - \left(\frac{5}{2}\right)^{x+1} = 0$.
4. Determinați numărul elementelor unei mulțimi M știind că M are 32 de submulțimi cu un număr impar de elemente.
5. Fie ABC un triunghi echilateral de latură $\sqrt{3}$. Calculați lungimea vectorului $\overline{AB} + \overline{AC}$.
6. Arătați că $\sin x \cdot \sin(x + \pi) \leq 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

Subiectul II

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați A^3 .
 - b) Determinați rangul matricei $A \cdot A'$, unde A' este transpusa matricei A .
 - c) Demonstrați că nu există nicio matrice $B \in M_3(\mathbb{C})$ cu $B^2 = A$.
2. Considerăm polinomul $f = (X^{10} - 2)^{10} - X - 2 \in \mathbb{C}[X]$.
 - a) Calculați suma coeficienților polinomului f .
 - b) Calculați suma tuturor rădăcinilor complexe ale lui f .
 - c) Demonstrați că polinomul $g = X^{10} - X - 2$ divide f .

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot e^{-x}$.
 - a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
 - b) Arătați că $f(x) \leq \frac{1}{e}$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
 - c) Demonstrați că $f^{(n)}(x) = (-1)^n(x - n) \cdot e^{-x}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$ și $x \in \mathbb{R}$.
2. Pentru fiecare număr $n \in \mathbb{N}^*$ notăm $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{2x+3} dx$.
 - a) Calculați I_2 .
 - b) Arătați că $2I_{n+1} + 3I_n = \frac{1}{n+1}$, oricare ar fi $n \geq 3$.
 - c) Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n = \frac{1}{5}$.

Testul 32

Subiectul I

1. Calculați modulul numărului complex $z = \frac{2}{1+i}$.
2. Determinați punctele de intersecție ale graficului funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 6$ cu dreapta de ecuație $y = x$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\log_x 2 = \log_3 3$.
4. Calculați suma coeficienților binomiali ai dezvoltării $(a + b)^{10}$.
5. Calculați lungimea înălțimii din A în triunghiul ABC știind că $A(0, 1)$, $B(1, 1)$ și $C(3, 2)$.
6. Arătați că $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \geq 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.

Subiectul II

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ și mulțimea $\mathcal{M} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$.
 - a) Arătați că $AX = XA$, oricare ar fi $X \in \mathcal{M}$.
 - b) Arătați că $A^2 - 12A + 36I_2 = 0_{\mathbb{R}}$.
 - c) Determinați matricele $B \in M_2(\mathbb{R})$ cu proprietatea că $B^2 + B = A$.
2. Considerăm mulțimea $M = \{\cos q\pi + i \sin q\pi \mid q \in \mathbb{Q}\}$.
 - a) Arătați că dacă $x, y \in M$, atunci $xy \in M$.
 - b) Demonstrați că M formează grup cu înmulțirea numerelor complexe.
 - c) Arătați că funcția $f: (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (M, \cdot)$, $f(q) = \cos q\pi + i \sin q\pi$ este morfism de grupuri.

Subiectul III

1. Considerăm șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ definit prin $x_1 = \frac{9}{2}$ și $x_{n+1} = x_n^2 - 8x_n + 20$, $n \geq 1$.
 - a) Arătați că $x_n \geq 4$, oricare ar fi $n \geq 1$.
 - b) Arătați că $x_{n+1} - x_n \leq 0$, oricare ar fi $n \geq 1$.
 - c) Demonstrați că șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ converge la 4.
2. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{1 + \sin^2 x}$.
 - a) Arătați că orice primitivă a funcției f este injectivă.
 - b) Calculați $\int_0^{\pi/2} f(x) \cos x dx$.
 - c) Calculați $\int_0^{\pi/4} f(x) dx$.

Testul 33

Subiectul I

1. Calculați partea fracționară a numărului $x = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$.
2. Rezolvați în mulțimea numerelor reale inecuația $x^2 + x > 12$.
3. Arătați că funcția $f: [1, 2] \rightarrow [3, 4]$, $f(x) = 5 - x$ este inversabilă.
4. Determinați termenul dezvoltării $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{x}\right)^9$ ce nu îl conține pe x .
5. Punctele A, B, C, D verifică $3\overline{AB} = 2\overline{AC} + \overline{AD}$. Arătați că B, C și D sunt coliniare.
6. Știind că $a \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ și $\cos a = -\frac{1}{3}$, calculați $\sin 2a$.

Subiectul II

1. Considerăm sistemul de ecuații liniare
$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ ax + y - 2z = 1 \\ -x + 3y + z = b \end{cases}$$
, cu $a, b \in \mathbb{R}$.
 - a) Calculați determinantul sistemului.
 - b) Determinați a și b pentru care $(1, 0, -1)$ este soluție a sistemului.
 - c) Determinați a și b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
2. Fie $M = \left\{ \begin{pmatrix} 1+2a & a \\ -2a & 1-a \end{pmatrix} \mid a \in (-1, \infty) \right\}$.
 - a) Arătați că dacă $X, Y \in M$, atunci $XY \in M$.
 - b) Demonstrați că M formează grup în raport cu înmulțirea matricelor.
 - c) Arătați că funcția $f: (0, \infty) \rightarrow M$, $f(a) = \begin{pmatrix} 2a-1 & a-1 \\ -2a+2 & 2-a \end{pmatrix}$ este izomorfism de la grupul multiplicativ al numerelor reale nenule la grupul (M, \cdot) .

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x + 1}$.
 - a) Calculați derivata funcției f .
 - b) Determinați asimptotele graficului funcției f .
 - c) Determinați punctele graficului funcției f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta $y = 2x$.
2. Fie $A = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ și $B = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$.
 - a) Calculați $A + B$.
 - b) Arătați că $A = B$.
 - c) Calculați A .

Testul 34

Subiectul I

1. Fie $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât $2^a = 3$ și $3^b = 4$. Calculați ab .
2. O funcție f de grad 1 are $f(0) = 2$ și $f(4) = -4$. Calculați $f(1)$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$.
4. Calculați probabilitatea ca, alegând o pereche (a, b) din mulțimea $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$, să avem $a + b = 5$.
5. Determinați ecuația dreptei ce trece prin origine și este perpendiculară pe dreapta de ecuație $x + 3y + 5 = 0$.
6. Calculați măsura unghiului A al triunghiului ABC știind că $AB = 5$, $AC = 8$ și $BC = 7$.

Subiectul II

1. Considerăm matricele $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -9 & -5 \end{pmatrix}$ și $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați C^{-1} .
 - b) Arătați că $AC = CB$.
 - c) Demonstrați că $B^n = C^{-1} \cdot A^n \cdot C$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Fie polinomul $P = X^4 + 3X^3 + 4X^2 + aX + b \in \mathbb{R}[X]$, având rădăcinile $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{C}$.
 - a) Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ știind că polinomul $f = X^2 + 3X + 3$ divide P .
 - b) Calculați $(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_1 - x_4)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_2 - x_4)^2 + (x_3 - x_4)^2$.
 - c) Demonstrați că oricare ar fi $a, b \in \mathbb{R}$, polinomul P nu are toate rădăcinile reale.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x + x + 1$.
 - a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.
 - b) Arătați că funcția f este surjectivă.
 - c) Calculați $(f^{-1})'(2)$.
2. Considerăm funcția $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
 - a) Calculați $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{f(x)} dx$.
 - b) Calculați $\int_0^1 x \sqrt{1 - x^2} dx$.
 - c) Calculați aria subgraficului funcției f .

Testul 35

Subiectul I

1. Considerăm progresia aritmetică $a_n = 1 + 7n$, $n \geq 1$. Calculați suma primilor 10 termeni.
2. Arătați că graficele funcțiilor $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ și $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = -2x^2 + 4x - 7$ nu au puncte comune.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.
4. Determinați $n \in \mathbb{N}$ știind că $n^2 - 4n = C_7^2$.
5. Fie O punctul de intersecție al diagonalelor paralelogramului $ABCD$. Calculați $\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} + \overline{OD}$.
6. Calculați raza cercului înscris în triunghiul ABC în care $AB = AC = 4$ și $BC = 6$.

Subiectul II

1. Se dau dreptele $d_1: x + y - 2 = 0$, $d_2: 2x - y - 1 = 0$ și $d_3: -3x + my - 1 = 0$, cu $m \in \mathbb{R}$.
 - a) Calculați determinantul $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & m & -1 \end{vmatrix}$.
 - b) Determinați $m \in \mathbb{R}$ știind că dreptele d_1, d_2, d_3 sunt concurente.
 - c) Rezolvați sistemul $\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \\ -3x + my - z = 0 \end{cases}$ știind că dreptele d_1, d_2, d_3 nu sunt concurente.
2. Fie mulțimea $M = \left\{ \begin{pmatrix} a + b\sqrt{2} & b \\ 0 & a - b\sqrt{2} \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$.
 - a) Arătați că $X + Y \in M$, oricare ar fi $X, Y \in M$.
 - b) Arătați că $XY \in M$, oricare ar fi $X, Y \in M$.
 - c) Demonstrați M formează inel cu adunarea și înmulțirea matricelor.

Subiectul III

1. Pentru fiecare $a \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ considerăm funcția $f_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_a(x) = a^x - x - 1$.
 - a) Calculați $f'_a(0)$.
 - b) Determinați valorile lui a pentru care graficul funcției are asimptotă la $+\infty$.
 - c) Determinați valorile lui a știind că $f_a(x) \geq 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
2. Fie $I_n = \int_0^{\pi} \sin^n \frac{x}{2} dx$, $n \geq 1$.
 - a) Calculați I_1 .
 - b) Arătați că $I_{n+1} \leq I_n$, $\forall n \geq 1$.
 - c) Demonstrați că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Testul 36

Subiectul I

1. Considerăm mulțimile $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ și $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ divide } 12\}$. Determinați numărul elementelor mulțimii $A - B$.
2. Determinați coordonatele punctului situat la intersecția graficului funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x - 2| - 4$, cu prima bisectoare a sistemului de coordonate xOy .
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $3^{2x+1} + 9^x = 36$.
4. Determinați valorile lui n pentru care $C_{10}^n = C_9^n + C_9^7$.
5. Determinați distanța dintre dreptele paralele $d_1: y = x$ și $d_2: y = x + 1$.
6. În triunghiul ABC avem $AB = 2$, $AC = 3$ și $A = 120^\circ$. Calculați raza cercului circumscris triunghiului.

Subiectul II

1. Considerăm matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați A^3 .
 - b) Determinați inversa matricei A^5 .
 - c) Rezolvați ecuația $X^2 = A$ în mulțimea $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Considerăm polinomul $f = X^3 - 6X^2 + 3X + m \in \mathbb{C}[X]$, având rădăcinile $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{C}$.
 - a) Calculați $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$.
 - b) Determinați $m \in \mathbb{C}$ știind că rădăcinile polinomului sunt în progresie aritmetică.
 - c) Determinați $m \in \mathbb{C}$ știind că rădăcinile polinomului sunt în progresie geometrică.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \ln x$.
 - a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.
 - b) Demonstrați că există $c \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$, astfel încât $f(c) = 0$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{n^2}$.
2. Considerăm funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x(x^2 + 1)}$.
 - a) Calculați $\int_1^4 f(x) dx$.
 - b) Calculați $\int_1^2 xf(x^2) dx$.
 - c) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t) dt$.

Testul 37

Subiectul I

1. Fie $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \in \mathbb{C}$. Arătați că $z^2 + \bar{z} \in \mathbb{R}$.
2. Determinați valorile reale ale numărului m știind că $x^2 + x + m \geq 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
3. Arătați că funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$, $f(x) = 1 + x^4$ este surjectivă.
4. Determinați numărul termenilor raționali ai dezvoltării $(1 + \sqrt{3})^{100}$.
5. Simetricul punctului $A(1, 2)$ față de $B(4, a)$ este $C(b, 4)$. Calculați $a + b$.
6. Fie $x \in \mathbb{R}$ cu $\operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Calculați $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

Subiectul II

1. Fie A matricea pătratică de ordin 3 cu toate elementele egale cu 1.
 - a) Calculați $\det(A - 3I_3)$.
 - b) Aflați $n \in \mathbb{N}$ știind că $\det(A^n + I_3) = 82$.
 - c) Determinați inversa matricei $I_3 + A$.
2. Considerăm mulțimea $G = \left\{ \begin{pmatrix} a-4b & 5b \\ -5b & a+4b \end{pmatrix} \mid a^2 + 9b^2 = 1, a, b \in \mathbb{R} \right\}$.
 - a) Verificați dacă matricea $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \frac{8}{5} \end{pmatrix}$ aparține lui G .
 - b) Arătați că dacă $X, Y \in G$, atunci $XY \in G$.
 - c) Demonstrați că G formează grup în raport cu înmulțirea matricelor.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$.
 - a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.
 - b) Arătați că $(x^2 + 1)f''(x)f(x) = f'(x)$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$.
 - c) Determinați asimptota graficului funcției f către $+\infty$.
2. Fie $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$.
 - a) Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.
 - b) Calculați $\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx$.
 - c) Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_n^{n+1} f(x) dx$.

Testul 38

Subiectul I

1. Mulțimile A și B au fiecare câte 7 elemente, iar mulțimea $A \cup B$ are 10 elemente. Determinați numărul elementelor mulțimii $A \cap B$.
2. Punctul $V(-1, 1)$ este vârful parabolei $y = x^2 + ax + b$. Calculați $2a + b$.
3. Rezolvați ecuația $\lg^2 x^2 = 1$.
4. Determinați numărul funcțiilor strict monotone $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
5. Dreptele $d_1: y = x$, $d_2: y = 2x + 1$ și $d_3: x + ay + 1 = 0$ sunt concurente. Determinați a .
6. Fie ABC un triunghi în care $A = 30^\circ$, $B = 75^\circ$ și $AB = 4$. Calculați raza cercului circumscris triunghiului.

Subiectul II

1. Considerăm matricele $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - a) Arătați că matricea $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ verifică $XA = BX$.
 - b) Demonstrați că $B^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
 - c) Calculați A^{100} .
2. Fie polinomul $f = 2X^3 - 3X^2 - X + 5 \in \mathbb{C}[X]$, având rădăcinile complexe x_1, x_2, x_3 .
 - a) Determinați câtul și restul împărțirii lui f la polinomul $g = 2X - 1$.
 - b) Calculați $(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3)$.
 - c) Calculați $\frac{1}{1 - x_1} + \frac{1}{1 - x_2} + \frac{1}{1 - x_3}$.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sin x$.
 - a) Arătați că funcția f este strict crescătoare.
 - b) Arătați că funcția f este surjectivă.
 - c) Demonstrați că graficul funcției nu admite asimptote.
2. Pentru fiecare $n \in \mathbb{N}^*$ considerăm funcția $f_n: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \begin{cases} \frac{\sin nx}{\sin x}, & x \neq 0 \\ n, & x = 0 \end{cases}$.

Notăm $I_n = \int_0^{\pi/2} f_n(x) dx$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

 - a) Calculați I_2 .
 - b) Arătați că $I_{n+2} - I_n = \frac{2}{n+1} \sin \frac{(n+1)\pi}{2}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}^*$.
 - c) Calculați I_{2013} .

Testul 39

Subiectul I

1. Dați exemplu de număr real x astfel încât $\sqrt{2} + x$ să fie număr rațional nenul.
2. Pentru ce valori reale ale lui m funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 + mx + 3$ este crescătoare pe intervalul $[2, \infty)$?
3. Determinați valorile reale ale lui x pentru care $\arcsin x \leq \frac{\pi}{4}$.
4. Determinați $n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $7 \cdot n! < 1000$.
5. Fie punctele $A(1, 2)$, $B(3, 1)$ și $C(-1, 4)$. Calculați lungimea medianei din A în triunghiul ABC .
6. Demonstrați că $\sin 4 < 0$.

Subiectul II

1. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați rangul matricei A .
 - b) Determinați $u, v \in \mathbb{R}$ pentru care $A^3 = uA^2 + vA$.
 - c) Determinați o matrice nenulă $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ astfel încât $AX = O_3$.
2. Considerăm polinomul $f = X^3 - 6X^2 + 9X + m \in \mathbb{Q}[X]$.
 - a) Determinați $m \in \mathbb{Q}$ știind că $X - 1$ divide f .
 - b) Determinați rădăcinile polinomului pentru $m = -4$.
 - c) Aflați valorile lui $m \in \mathbb{Q}$ pentru care polinomul f are o rădăcină dublă.

Subiectul III

1. Considerăm funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)}$.
 - a) Arătați că funcția f nu este derivabilă în $x \in \{-1, 1\}$.
 - b) Calculați $f'(x)$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
 - c) Determinați punctele de extrem ale funcției f .
2. Pentru $p, q \in \mathbb{N}$, $p, q \geq 2$, notăm $I(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$.
 - a) Calculați $I(3, 3)$.
 - b) Demonstrați că $I(p, q) = I(q, p)$, oricare ar fi $p, q \geq 2$.
 - c) Arătați că $p \cdot I(p, q) = (q-1) \cdot I(p+1, q-1)$, oricare ar fi $p, q \in \mathbb{N}$, $p \geq 2, q \geq 3$.

Testul 40

Subiectul I

1. Determinați $a \in \mathbb{R}$ știind că $(a, a+1) \cap (0, 1) \neq \emptyset$.
2. Determinați funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de gradul 2 știind că $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ și $f(2) = 8$.
3. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\sin 2x = 2 \cos^2 x$.
4. Determinați coeficientul lui x^2 din dezvoltarea $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^6$.
5. Considerăm punctele $A(1, 0)$, $B(3, 2)$, $C(-1, 3)$. Calculați cosinusul unghiului \widehat{BAC} .
6. Determinați semnul numărului $\cos 2 \cdot \cos 4$.

Subiectul II

1. Considerăm matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
 - a) Calculați A^{-1} .
 - b) Arătați că $A^n - A^{n-2} = A^2 - I_3$, pentru orice număr natural $n \geq 2$.
 - c) Calculați A^{100} .
2. Fie $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$.
 - a) Arătați că $X - Y \in M$, oricare ar fi $X, Y \in M$.
 - b) Arătați că $X \cdot Y \in M$, oricare ar fi $X, Y \in M$.
 - c) Demonstrați că M formează corp împreună cu adunarea și înmulțirea matricelor.

Subiectul III

1. Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - 12x^2 + 1$.
 - a) Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{f(x)} - x^2)$.
 - b) Determinați punctele de extrem ale funcției f .
 - c) Determinați punctele de inflexiune ale funcției f .
2. Considerăm funcția $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
 - a) Calculați $\int_0^1 f(x) \cdot f'(x) dx$.
 - b) Calculați volumul corpului obținut prin rotația graficului funcției f în jurul axei Ox .
 - c) Calculați aria subgraficului funcției f .

Soluții M1

Partea 1. ALGEBRĂ/GEOMETRIE (clasele IX-X)

Tema 1.1 Mulțimi de numere. Mulțimi și elemente de logică matematică

1. a) Propoziția este falsă, contraexemplu $x = 2,5$ și $y = 2,5$. b) Propoziția este falsă, contraexemplu $x = \frac{1}{3}$. c) Propoziția este falsă, contraexemplu pentru $x = 1000$ $x^2 + y^2 \neq 2012 \quad \forall y \in \mathbb{R}$.
2. Propoziția este falsă, contraexemplu $x = 1 + \sqrt{2}$ și $y = 1 - \sqrt{2}$ sunt iraționale, iar suma lor este egală cu 2.
3. a) $[\sqrt{2012}] + (2 + \sqrt{2}) \cdot \{-\sqrt{2}\} = 44 + (2 + \sqrt{2})(-\sqrt{2} + 2) = 42$.
- b) $\left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{2012 \cdot 2013}\right] = \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2012} - \frac{1}{2013}\right] = 0$. c) $[\sqrt{2009}] + 3 \cdot \left\{-\frac{1}{3}\right\} = 44 + 3\left(-\frac{1}{3} - (-1)\right) = 46$. d) $[\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + \dots + [\sqrt{100}] = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot 3 + \dots + 19 \cdot 9 + 10 = 625$.
- e) $\left[(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2\right] = 10 + [2\sqrt{21}] = 19$. 4. a) $x \in \left[k, k + \frac{1}{2}\right), k \in \{0; 1; 2\} \Rightarrow A = \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left[1, \frac{3}{2}\right) \cup \{2\}$.
- b) $\{x\} = \frac{1}{3} \Rightarrow B = \left\{\frac{-2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right\}$. 5. $[\sqrt{n^2 + n}] = n \Leftrightarrow n \leq n^2 + n < (n+1)^2$, inegalități care sunt evidente.
6. $x > 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x} \in (0, 1) \Leftrightarrow \left[\frac{1}{x}\right] = 0$. 7. a) $\{\{x\} + y\} = \{x - [x] + y\} = \{x + y\} = \{x + \{y\}\}$.
- b) $\{\{x + y\} + z\} = \{x + y + z\} = \{x + \{y + z\}\}$. 8. a) Fie $k \in \mathbb{Z}$. Pentru $x \in \left[k, k + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow [x] = k, \left[x + \frac{1}{2}\right] = k$ și $[2x] = 2k$, deci egalitatea este evidentă. Pentru $x \in \left[k + \frac{1}{2}, k + 1\right) \Rightarrow [x] = k, \left[x + \frac{1}{2}\right] = k + 1$ și $[2x] = 2k + 1$, deci egalitatea este evidentă. b) Dacă $x = -a$ avem $[-a + b] = 0 \Rightarrow b \geq a$. Pentru $x = -b$, avem $[a - b] = 0 \Rightarrow b \leq a$. În final $a = b$.
9. Pentru $x \neq 0$ inecuația $(m^2 - 1)x + 2 \leq 0$ are cel puțin o soluție, deci $x = 0$.
10. $\{x \in \mathbb{R} \mid (x+2)(x^2 - 4) \geq 0\} = \{-2\} \cup [2, +\infty)$, deci elementul căutat este egal cu -2 .
11. $A = \left[1, \frac{10}{3}\right]$, deci $B = \{0, 1, 2\}$ cu maximul egal cu 2. 12. $A \cap \mathbb{N} = \{1, 2\}$. 13. $A = (-2, 2) \Rightarrow A \cap B \cap \mathbb{Z} = \{-1\}$. 14. $\text{card}(A) = 26, \text{card}(B) = 17, \text{card}(A \cap B) = 9$ și $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) = 34$. 15. $\frac{1}{7} = 0, (142857) \Rightarrow \text{card}(A) = 6$. 16. $\frac{4}{11} = 0, (36)$ deci suma cerută este egală cu 10. 17. $\frac{10}{13} = 0, (769230) \Rightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_{2012} = 335 \cdot (7 + 6 + 9 + 2 + 3 + 0) + 7 + 6 = 9058$.
18. Numerele 1 și 2 sunt printre rădăcinile ecuației $x^2 + mx + 4 = 0$, deci $m \in \{-5, -4\}$. 19. Soluția 1. Înlocuind soluțiile 1 și 2 în ecuația $x^2 + mx + n = 0$, obținem sistemul $\begin{cases} m + n + 1 = 0 \\ 2m + n + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow (m, n) = (-3, 2)$. Soluția 2. $n = x_1 \cdot x_2 = 2$ și $-m = x_1 + x_2 = 3$. 20. Observăm că soluțiile întregi ale ecuației se găsesc printre divizorii lui 4, deci soluțiile posibile sunt 1, 2 sau 4, adică

- $a \in \{4, 5\}$. 21. a) $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3} \in A, \{\sqrt{3}\} = \sqrt{3} - 1 \in A$. b) Fie $x = a + b\sqrt{3}, y = c + d\sqrt{3} \in A$. $xy = ac + 3bd + \sqrt{3}(ad + bc) \in A$. c) Prin inducție se arată ușor că, dacă $x \in A$, atunci $x^n \in A, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Fie acum $x = \sqrt{3} - 1, [x] = 0 \Rightarrow \{x, x^2, \dots, x^{2012}\} \subset A$, deci A are cel puțin 2012 elemente. 22. Presupunem că există $a, b \in \mathbb{Z}$ astfel încât $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2} \Rightarrow (\sqrt{3} - b\sqrt{2})^2 = a^2 \Rightarrow a^2 = 3 + 2b^2 - 2b\sqrt{6} \Rightarrow b = 0$ și $a = \sqrt{3} \in \mathbb{Z}$, contradicție. 23. $x^2 + 2xy + 2y^2 = (x + y)^2 + y^2 = 0 \Rightarrow (x, y) = (0, 0)$. 24. $x^2 + 3xy + 4y^2 = \left(x + \frac{y\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{13y^2}{4} \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$. 25. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 6y - 2z + 14 = (x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = -2, y = -3, z = 1 \Rightarrow x + y + z = -4$.
26. a) $x^2 + y^2 + z^2 - (xy + xz + yz) = \frac{1}{2}[(x - y)^2 + (x - z)^2 + (y - z)^2] = 0 \Rightarrow x = y = z$. b) În a) luăm $x = a, y = b$ și $z = 2$, deci $a = b = 2$. 27. a) Se aplică inegalitatea mediilor pentru numerele $\frac{a}{b}$ și $\frac{b}{a}$. b) Înmulțim între ele inegalitățile $a + b \geq 2\sqrt{ab}, b + c \geq 2\sqrt{bc}$ și $a + c \geq 2\sqrt{ac}$ și obținem inegalitatea cerută. 28. a) $\frac{\sqrt{x-1}}{x} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \geq 2\sqrt{x-1} \Leftrightarrow (\sqrt{x-1} - 1)^2 \geq 0$. b) Împărțim inegalitatea cu xy și obținem inegalitatea $\frac{\sqrt{x-1}}{x} + \frac{\sqrt{y-1}}{y} \leq 1$, care este adevărată din a). 29. Cum $\sqrt{a}, \sqrt[4]{b} \geq 0$, avem trei cazuri: $\sqrt{a} = 0, \sqrt[4]{b} = 2 \Rightarrow a = 0, b = 16$ sau $\sqrt{a} = 1, \sqrt[4]{b} = 1 \Rightarrow a = 1, b = 1$ sau $\sqrt{a} = 2, \sqrt[4]{b} = 0 \Rightarrow a = 4, b = 0$. Deci $A = \{(0, 16), (1, 1), (4, 0)\}$. 30. De exemplu $a = 1$ și $b = 1$. 31. De exemplu $a = \sqrt{2}$ și $b = -\sqrt{2}$. 32. De exemplu $(0, 1, 9)$. 33. a) $\ln 2 < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$.
- b) $\sqrt[4]{6} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$. c) $\frac{1}{2} < \sqrt{5} < \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$. d) $\frac{1}{2} < \log_3 2 < \ln 2 < 1 < \sqrt{3}$.

Tema 1.2 Funcții definite pe mulțimea numerelor naturale (șiruri)

1. $a_{n+1} - a_n = \frac{4n+4}{n+4} - \frac{4n}{n+3} = \frac{12}{(n+4)(n+3)} > 0$, deci șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este crescător.
2. $a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 - (n+1) - n^2 + n = 2n > 0$, deci șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este crescător.
3. a) $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \dots - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 0$, deci șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este crescător. b) $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0$, deci șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este descrescător. c) $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0$, deci șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este crescător.
4. a) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right) \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, de unde mărghinirea șirului. b) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) = 1 - \frac{1}{(n+1)^2} \in (0, 1)$. c) $x_n = \frac{1}{n+1} \in (0, 1)$.

- 5. a)** Fie r rația progresiei. $a_{23} - a_5 = 18r = 36 \Rightarrow r = 2$. $a_5 = a_0 + 5r = 7 \Rightarrow a_0 = -3$. $a_{13} = a_0 + 13r = 23$.
b) $a_n = 2015 = -3 + 2n \Rightarrow n = 1009$, deci $2015 = a_{1009}$. **c)** $T = a_2 + a_5 + a_8 + \dots + a_{2012} = \frac{671}{2}(a_2 + a_{2012}) = 671 \cdot 2011 = 1349381$. **6.** Fie r rația progresiei. $a_4 - a_2 = 4 = 2r \Rightarrow r = 2$.
 $a_1 + a_3 + a_5 + a_6 = 30 = 4a_1 + 11r \Rightarrow a_1 = 2$. $S_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 420$. **7.** $2(x-1)^2 = x + (x+2) \Rightarrow x_1 = 0$; $x_2 = 3$.
8. $2(1-x) = (x+1) + 4 \Rightarrow x = -1$. **9.** $2(2^{-a+2} + 1) = 2^{a-1} + 2^{a+1} + 1$, și notând $2^a = t > 0$ obținem ecuația $2\left(\frac{4}{t} + 1\right) = \frac{t}{2} + 2t + 1 \Rightarrow t_1 = -\frac{8}{5}$, $t_2 = 2$, deci $a = 1$. **10. a)** În sumă sunt $\frac{100-1}{3} + 1 = 34$ termeni, deci $1 + 4 + 7 + \dots + 100 = \frac{34}{2}(1 + 100) = 1717$. **b)** În sumă sunt $\frac{2010-2}{4} + 1 = 503$ termeni, deci $2 + 6 + 10 + \dots + 2010 = \frac{503}{2}(1 + 2010) = 503 \cdot 1006 = 506018$. **c)** În sumă sunt $\frac{2n+3-1}{2} + 1 = n + 2$ termeni, deci $1 + 3 + 5 + \dots + (2n+3) = (n+2)^2$. **d)** În sumă sunt n termeni, deci $1 + 5 + 9 + \dots + (4n-3) = \frac{n}{2}(4n-2) = 2n^2 - n$. **11.** Suma cerută este egală cu $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$. **12.** $a_{n+1} = (a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1}) - (a_1 + a_2 + \dots + a_n) = 2n + 2 \Rightarrow a_n = 2n$, obținem deci un șir în progresie aritmetică. **13. a)** Forma generală a termenilor din sumă este $4n-3$, $n \geq 1$. Fie $x = 4n-3 \Rightarrow 1 + 5 + 9 + \dots + (4n-3) = \frac{n}{2}(1 + 4n-3) = 2n^2 - n = 231 \Rightarrow n = 11 \Rightarrow x = 41$. **b)** Fie $x = 2n-1$, $n \geq 1$. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2 = 225 \Rightarrow n = 15 \Rightarrow x = 29$. **c)** $x + (x+1) + \dots + (x+x) = \frac{x+1}{2}(3x) = 45 \Rightarrow x(x+1) = 30 \Rightarrow x = 5$. **d)** Fie $x = 3n-1$, $n \geq 1$. $2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) = \frac{n}{2}(3n+1) = 57 \Rightarrow n = 6 \Rightarrow x = 17$. **14.** Rația progresiei aritmetice este egală cu 3, primul termen este 1, deci $a_{10} = 28$. **15.** $a_6 + a_{16} = a_3 + a_{19} = 10$. **16. a)** $a_2 + a_3 + a_{19} + a_{20} = 8 = 2(a_1 + a_{21}) \Rightarrow a_1 + a_{21} = 4$. $a_1 + a_2 + \dots + a_{21} = \frac{21}{2}(a_1 + a_{21}) = 42$. **b)** $a_2 + a_4 + \dots + a_{20} = \frac{10}{2}(a_2 + a_{20}) = 5(a_1 + a_{21}) = 20$.
17. a) $a_1 + a_4 + a_{n-3} + a_n = 2(a_1 + a_n) = 300 \Rightarrow a_1 + a_n = 150$. $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2} \cdot 150 = 600 \Rightarrow n = 8$.
b) $S_{3n} = 9S_n \Rightarrow \frac{3n}{2}(2a_1 + (3n-1)r) = \frac{9n}{2}(2a_1 + (n-1)r) \Rightarrow r = 2a_1$. $a_4 = a_1 + 3r = 7a_1 = 21 \Rightarrow a_1 = 3$. **18.** $b = \frac{a+c}{2}$ și $b^2 = ac \Rightarrow ac = \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 \Rightarrow (a+c)^2 = 4ac \Rightarrow (a-c)^2 = 0 \Rightarrow a = c = b$.
19. $a - 17 = 17 - 2 = 15 \Rightarrow a = 32$ și $2b = a^2 \Rightarrow b = 512$. **20.** Fie q rația progresiei geometrice. $a + b + c = a(1 + q + q^2) = a[1 + q(q+1)]$ și cum $1 + q(q+1)$ este număr par, rezultă că a este număr par, de unde concluzia. **21.** $(x-1)^2 = x + 5 \Rightarrow x_1 = -1$, $x_2 = 4$, deci $x = 4$. **22.** Cum $a \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow x_1, x_2 \neq 0$. $x_2^2 = 3x_1x_2 \Rightarrow x_2 = 3x_1 \Rightarrow x_1 + x_2 = 4x_1 = 4 \Rightarrow x_1 = 1 \Rightarrow a = 3$. **23.** Avem $x_2^2 = x_1x_2^2 \Rightarrow x_1 = 1 \Rightarrow a = -3$.
24. Șirul este o progresie geometrică cu rația 2, deci $4 = a_3 = a_0 \cdot 2^3 \Rightarrow a_0 = \frac{1}{2}$. **25.** Fie q rația

- progresiei geometrice $\frac{b_3}{b_1} = \frac{24}{6} = q^2 \Rightarrow q = 2 \Rightarrow b_1 = 3$. **26.** Evident $s > 1$. Pe de altă parte $s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{100}} = \frac{1 - \frac{1}{2^{101}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2^{101}}\right) < 2$. **27.** $s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{2012}} = \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{2013}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}\left(1 + \frac{1}{2^{2013}}\right) > \frac{2}{3}$. **28.** $a = \frac{1 - \frac{1}{5^{11}}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{4}\left(1 - \frac{1}{5^{11}}\right) \in (1, 2) \Rightarrow [a] = 1$; $b = \frac{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^{12}}{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)} = \frac{5}{6}\left(1 + \frac{1}{5^{12}}\right) \in (0, 1) \Rightarrow [b] = 0$. În final $[a] + [b] = 1$. **29.** Dacă $x = 1$, egalitatea din enunț este echivalentă cu $12^2 - 1 = 11 \cdot 13$ evident adevărată. Dacă $x \neq 1$, egalitatea este echivalentă cu $\left(\frac{1-x^{12}}{1-x}\right)^2 - x^{11} = \frac{1-x^{11}}{1-x} \cdot \frac{1-x^{13}}{1-x} \Rightarrow (1-x^{12})^2 - x^{11}(1-x)^2 = (1-x^{11})(1-x^{13})$, egalitate care se verifică imediat.
30. Fie q rația progresiei geometrice, $\frac{b_3 + b_4}{b_1 + b_2} = \frac{b_3(1+q)}{b_1(1+q)} = q^2 = 4 \Rightarrow q = 2$. **31. a)** Fie q rația progresiei. $b_4 - b_0 = b_0(q^4 - 1) = b_0(1 + q^2)(q^2 - 1) = 3(1 + q^2) = 15 \Rightarrow q^2 = 4 \Rightarrow q = 2 \Rightarrow b_0 = 1$, $b_2 = 4$. **b)** Suma are 9 termeni, deci $S_8 = b_0 \frac{1-q^9}{1-q} = 511$. **32.** $a_2 - a_1 = r \in \mathbb{Z}$. Dacă presupunem că $r < 0$, $\exists k \in \mathbb{N}^* : a_{k+1} = a_1 + kr < 0$ contradicție. Deci $r \geq 0$. **33.** Rația progresiei este $q = \frac{b_2}{b_1} \in \mathbb{Q}$. Presupunem că $q \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$. Fie $q = \frac{a}{b}$ scrierea ca fracție ireductibilă. $a > 1$ și $b_1 = a^p \cdot \alpha$, $(a, \alpha) = 1$, $p \in \mathbb{N}$. Avem $b_{p+2} = b_1 q^{p+1} = a^p \alpha \frac{b^{p+1}}{a^{p+1}} = \alpha \frac{b^{p+1}}{a} \notin \mathbb{N}$, contradicție. **34.** Fie q rația progresiei, deci $\frac{b_5}{b_3} = q^2 = 4 \Rightarrow b_1 = \frac{b_3}{q^2} = \frac{3}{2} \Rightarrow b_7 = b_1 q^6 = 96$. **35.** $f(2) + f(2^2) + \dots + f(2^9) = 2 + 2^2 + \dots + 2^9 + 9 = 2 \frac{2^9 - 1}{2 - 1} + 9 = 1031$. **36.** $S_1 = 3(1 - 3 + 3^2 - 3^3 + \dots + 3^{10}) + 11 = 3 \frac{1 - (-3)^{11}}{1 - (-3)} + 11 = \frac{3}{4}(1 + 3^{11}) + 11$. Termenii din suma S_2 sunt în progresie aritmetică cu rația 3, $S_2 = \frac{12}{2}(f(0) + f(11)) = 210$. **37. a)** $S_1 = \underbrace{(-5) + (-5) + \dots + (-5)}_{25\text{-ori}} + f(50) = -125 + 250 - 1 = 124$.
b) Termenii sumei sunt în progresie aritmetică, deci $S_2 = \frac{51}{2}(f(0) + f(50)) = 51 \cdot 124 = 6324$.
c) $S_3 = 5(1 - 2 + 2^2 - 2^3 + \dots - 2^9) = \frac{5}{3}(1 - 2^{10})$.

1. $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left\{\frac{1}{2}\right\} + \{1\} = \frac{1}{2} \neq f(0) = 0$. 2. $f\left(x + \frac{1}{3}\right) = \left\{3\left(x + \frac{1}{3}\right)\right\} = \{3x + 1\} = \{3x\} = f(x)$.
3. a) $f(x+2) = \left\{\frac{x+2}{2}\right\} + \{x+2\} = \left\{\frac{x}{2}\right\} + \{x\} = f(x) \Rightarrow 2$ este perioadă pentru funcția f .
b) $g(x+6) = \left\{\frac{x+6}{2}\right\} + \left\{\frac{x+6}{3}\right\} = g(x) \Rightarrow 6$ este perioadă pentru g . 4. $1 - a^2 = 0 \Rightarrow a = \pm 1$.
5. $f(x) = 4|x-2| - 4|2-x| = 0$, deci f este constantă. 6. Pentru $x \in [3, 8]$, $f(x) = (8-x) + (x-3) = 5$.
7. Pentru $x \in (0, +\infty)$ $\frac{x}{x^2+1} \in (0, 1) \Rightarrow f(x) = 0$. 8. $\frac{f(x)-f(y)}{x-y} = \frac{y-x}{(x-y)(x-1)(y-1)} = \frac{-1}{(x-1)(y-1)} < 0, \forall x, y \in (1, +\infty), x \neq y$, deci f este descrescătoare. 9. $f(g(x)) = g(f(x))$, $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 2(x+a)-1 = 2x-1+a \Leftrightarrow a=0$. 10. $f(f(f(x))) = 3-8x, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f este strict descrescătoare. 11. $f(f(0)) = f(0) = 0$. 12. $f(x) = 0 \Rightarrow x(x^2-4) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = -1$. Punând condiția $g(x_i) = 0, i = \overline{1, 3} \Rightarrow a \in \{-1, 1\}$. 13. $f(x) \leq 2 \Rightarrow x(x^2-4) \leq 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -2] \cup [0, 2] = A$, deci $\max A = 2$. 14. $f(a) = a \Leftrightarrow a^3 - 9a = 0 \Leftrightarrow a \in \{-3, 0, 3\}$, deci suma cerută este egală cu 0.
15. Punem condiția ca ecuația $f(x) = y$ să admită soluții reale $\Leftrightarrow x^2(y-1) - x(y+1) + y-1 = 0 \Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow (-y+3)(3y-1) \geq 0 \Leftrightarrow y \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$, deci $\text{Im } f = \left[\frac{1}{3}, 3\right]$. 16. Ecuația $|x| = y$ admite soluții reale dacă și numai dacă $y \in [0, +\infty)$, deci $\text{Im } f = [0, +\infty)$. 17. $(f \circ g)(x) = x^2 - 1$, deci imaginea funcției $f \circ g$ este $[-1, +\infty)$. $(g \circ f)(x) = (x-1)^2$, deci imaginea funcției $g \circ f$ este $[0, +\infty)$. 18. a) $1 \notin \text{Im } f \Leftrightarrow$ ecuația $f(x) = 1$ nu are nicio soluție, ceea ce este adevărat. b) $f(1) = \frac{1}{2}$ și în plus $f(x) = \frac{x}{x^2+1} \leq \frac{1}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$. Deci $\max(f) = \frac{1}{2}$, punctul de maxim fiind $x = 1$. c) $f(-1) = \frac{-1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \in \text{Im } f$. 19. $f(1) = -1$ și în plus $x^4 - 2x^2 = (x^2-1)^2 - 1 \geq -1 \Leftrightarrow f(x) \geq -1, \forall x \in \mathbb{R}$. 20. a) $x \in f^{-1}(\{0; 2\}) \Leftrightarrow f(x) \in \{0; 2\} \Leftrightarrow x \in \{\pm 1, \pm \sqrt{3}\} = f^{-1}(\{0; 2\})$. b) $f(x) \in (3, +\infty) \Leftrightarrow x^2 > 4 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty) = f^{-1}((3, +\infty))$ c) $f(x) \in [3, 8] \Leftrightarrow x^2 \in [4, 9] \Leftrightarrow x \in [-3, -2] \cup [2, 3] = f^{-1}([3, 8])$. d) Ecuația $f(x) = m$ are o sigură rădăcină dacă și numai dacă $m = -1$.
21. Punem condițiile $f(1) = 0$ și $f(0) = -1$, deci $n = -1$ și $m = 0$. 22. a) $f(-x) = -x^3 + \frac{1}{x} = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}^*$. b) $f(-x) = -x^3 + \frac{2^{-x} + 2^x}{-x} = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}^*$. c) $f(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. d) $f(-x) = \ln \frac{3+x}{3-x}$

- $-f(x), \forall x \in (-3, 3)$. 23. Punem condiția $f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -x(e^{-x} + e^x) + a = -[x(e^x + e^{-x}) + a] \Leftrightarrow a = 0$. 24. Avem $f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$, deci $f(1) = f(-1) \Leftrightarrow a+b+4 = -(a+b)+4 \Leftrightarrow a+b=0$. 25. Dacă f este funcție pară, atunci $f(1) = f(-1)$, deci f nu este injectivă. 26. $f(0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = 0 \Rightarrow O(0,0) \in G_f$. 27. $f(g(x)) = x \Leftrightarrow 2(ax+b)+1 = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$. 28. Prin inducție după n . Pentru $n=1$ egalitatea devine $f(x) = 2^1 x + 2^1 - 1$ evident adevărată. Dacă $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n-\text{ori}}(x) = 2^n x + 2^n - 1$, atunci $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n+1-\text{ori}}(x) = 2^n f(x) + 2^n - 1 = 2^n (2x + 1) + 2^n - 1 = 2^{n+1} x + 2^{n+1} - 1$. 29. a) Funcția f este strict crescătoare, fiind suma a două funcții strict crescătoare ($f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = x^3$ și $f_2(x) = x+1$), deci este injectivă. b) $f(0) = f(1) = 1$, deci f nu este injectivă. c) $f(0) = f(-1)$, deci f nu este injectivă. d) Ecuația $f(x) = 2$ nu are nicio soluție număr natural, deci f nu este surjectivă.
30. Arătăm că ecuația $f(x) = y$ are soluție unică $\forall y \in [2, +\infty)$. $x + \frac{1}{x} = y \Leftrightarrow x^2 - yx + 1 = 0 \Leftrightarrow \Delta = y^2 - 4 \geq 0, y \in [2, +\infty) \Leftrightarrow x = \frac{y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2} \in [1, +\infty) \Leftrightarrow x = \frac{y + \sqrt{y^2 - 4}}{2}$. 31. Ecuația $f(x) = y$ are unica soluție $x = \frac{1}{2}(1 + \log_2 y) \in \mathbb{R}, \forall y \in (0, +\infty)$, deci $f^{-1}: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(y) = \frac{1}{2}(1 + \log_2 y)$. 32. Determinăm singura soluție strict pozitivă a ecuației $f(x) = y, y \in (1, +\infty) \Leftrightarrow x^2 + x + 1 - y = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{4y-3}}{2} > 0, \forall y \in (1, +\infty)$, deci $f^{-1}: (1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty), f^{-1}(y) = \frac{-1 + \sqrt{4y-3}}{2}$. 33. Dacă $g(3) = a \Leftrightarrow f(a) = 3 \Rightarrow a = 0, g(0) = b \Rightarrow f(b) = 0 \Rightarrow b = -1$. Deci $g(3) + g(0) = -1$. 34. Pentru $x \in [1, +\infty) \Rightarrow f(x) \in [5, +\infty) = \text{Im } f = [a, +\infty) \Rightarrow a = 5$. 35. Funcția f este strict descrescătoare pe intervalul $(-\infty, 1]$ și strict crescătoare pe $[1, +\infty)$, deci $a \leq -1$. 36. Fie $f^{-1}(4) = a \Rightarrow f(a) = 4 = f(f(1))$ și cum f este injectivă rezultă că $a = f(1) = 2$. 37. $f \circ f = 1_{\mathbb{R}} \Leftrightarrow f(f(x)) = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a^2 x + ab + b = x, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow a = 1$ și $b = 0$ sau $a = -1$ și $b \in \mathbb{R}$. Deci perechile $(1, 0)$ și $(-1, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ cu $b \in \mathbb{R}$ verifică cerința $f \circ f = 1_{\mathbb{R}}$. 38. a) $T \in H \Leftrightarrow f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$ și înlocuind x cu $x-T$ obținem $f(x-T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -T \in H$. b) $f(x+T_1+T_2) = f(x+T_1) = f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow T_1+T_2 \in H$.

Tema 1.4 Funcția de gradul I. Funcția de gradul al II-lea

1. Fie $f(x) = ax + b \Rightarrow f(1) = 2, f(-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a+b=2 \\ -a+b=0 \end{cases} \Rightarrow a=1=b \Rightarrow f(x) = x+1$. 2. a) $G_f \cap O_x = \left\{ \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \right\} \in G_g$ și $(0, 1) \in G_f \cap O_y$, deci $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ și $g(0) = -1 \Rightarrow g(x) = -2x - 1$.

b) $G_f \cap O_y = \{(0,1)\} \in G_g$ și $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \in G_f \cap O_x$, deci $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ și $g(0) = 1 \Rightarrow g(x) = -2x + 1$.

c) $G_f \cap O_y = \{(0,1)\}$ și $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \in G_f \cap O_x$, deci $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ și $g(0) = -1 \Rightarrow g(x) = 2x - 1$.

3. Avem $A(1,0) \in G_f \cap G_g \cap O_x$ și cum $B(0,3) \in G_g \cap O_y \Rightarrow C(2,3) \in G_f$. Deci

$f(1) = 0, f(2) = 3 \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 2a+b=3 \end{cases} \Rightarrow a=3, b=-3 \Rightarrow f(x) = 3x-3$. 4. $\text{Im } f = [-5, -1] = [a, b] \Rightarrow$

$a = -5, b = -1$. 5. Se impune condiția $\text{Im } f = [1, 7]$. Avem două cazuri $\begin{cases} f(1)=1 \\ f(4)=7 \end{cases}$ sau $\begin{cases} f(1)=7 \\ f(4)=1 \end{cases}$,

deci $a=2, b=-1$ sau $a=-2, b=9$. 6. $m^2 - 2 < 0 \Leftrightarrow m \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 7. a) $\frac{m-1}{2m+2} > 0 \Rightarrow$

$m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. b) $f_m(1) = 0 \Rightarrow m = -\frac{5}{7}$. c) Funcția f_m este descrescătoare, deci $m \in (-1, 1)$.

d) Funcția f_m este constantă, deci $m = 1$. 8. a) $|x+1| = 2|x| \Leftrightarrow x+1 = \pm 2x \Rightarrow x \in \left\{-\frac{1}{3}, 1\right\}$. b) Avem

condiția $x \geq 0$, deci $x^2 - 4 = \pm 3x \Rightarrow x \in \{-4, -1, 1, 4\} \cap [0, +\infty) = \{1, 4\}$. c) $\begin{cases} x+2=0 \\ x^2+x-2=0 \end{cases} \Rightarrow x = -2$.

d) Pentru $x \in (-\infty, 3) \Rightarrow (3-x) + (4-x) = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{2} \notin (-\infty, 3)$; pentru $x \in [3, 4] \Rightarrow (x-3) + (4-x) = 1 \Rightarrow x \in [3, 4]$, iar

pentru $x \in (4, +\infty) \Rightarrow (x-3) + (x-4) = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{2} \notin (4, +\infty)$. 9. a) $\frac{1}{x+1} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x-1}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow x \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right]$.

b) $\frac{x}{x+2} - \frac{x+1}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-4x-2}{(x+2)(x-1)} \leq 0 \Leftrightarrow x \in \left(-2, -\frac{1}{2}\right] \cup (1, +\infty)$. c) $\frac{x^2-16}{x(x+4)} = \frac{x-4}{x} > 0 \Rightarrow$

$x \in ((-\infty, 0) \cup (4, +\infty)) \setminus \{-4\}$. d) $(x-2)(x^2-3x+2) = (x-2)^2(x-1) \leq 0 \Rightarrow x \in (-\infty, 1] \cup \{2\}$.

10. a) $x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right] \cap \mathbb{Z} = \{1\}$. b) $x \in \left[-1, \frac{5}{2}\right] \cap \mathbb{Z} = \{-1, 0, 1, 2\}$. c) $x^2 \in (1, 4) \Rightarrow x \in ((-2, -1) \cup (1, 2)) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$.

11. a) $x-1 \in (-3, 3) \Rightarrow x \in (-2, 4)$. b) Pentru $x \in (-\infty, -1) \Rightarrow 1-x-1-x \leq 4 \Rightarrow x \in [-2, -1]$; pentru

$x \in [-1, 1] \Rightarrow 1-x+x+1 \leq 4 \Rightarrow x \in [-1, 1]$, iar pentru $x \in (1, +\infty) \Rightarrow x-1+x+1 \leq 4 \Rightarrow x \in (1, 2]$. În

final $x \in [-2, 2]$. c) $x^2 - 1 \in (-1, 1) \Rightarrow x^2 \in (0, 2) \Rightarrow x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \setminus \{0\}$.

12. a) $x+2 \in [-1, 1] \Rightarrow x \in [-3, -1] \cap \mathbb{Z} = \{-3, -2, -1\}$. b) $4|3-x| \leq 2|x-3| \Rightarrow 2|x-3| \leq 0 \Rightarrow x \in \{3\}$.

c) Cum $x \in \mathbb{Z}$ rezultă că avem 3 cazuri: $\begin{cases} |x+2|=0 \\ |x^2-4|=1 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset, \begin{cases} |x+2|=1 \\ |x^2-4|=0 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$ și

$\begin{cases} |x+2|=0 \\ |x^2-4|=0 \end{cases} \Rightarrow x \in \{-2\}$. 13. Ecuația $f(x) = 0$ nu are soluții în intervalul $(0, +\infty)$, deci

$2m-2 \leq 0 \Rightarrow m \in (-\infty, 1]$. 14. Fie $f(x) = ax+b \Rightarrow f(f(x)) = a^2x+ab+b = 4x+3 \Rightarrow \begin{cases} a^2=4 \\ b(a+1)=3 \end{cases}$ și

cum $a > 0$ obținem $a=2, b=1$, deci $f(x) = 2x+1$. 15. $x \in (-4, 2) \cap \mathbb{Z} = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$.

16. Notând $a = x^2 + 2x$ obținem ecuația $a + \frac{1}{a} = 2 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow x^2 + 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

17. $x_v = 2 \Rightarrow -\frac{m}{2} = 2 \Rightarrow m = -4$. 18. Punem condiția ca ecuația $f(x) = y$ să admită soluții reale,

deci $x^2 + x + 1 - y = 0 \Rightarrow \Delta \geq 0 \Rightarrow 4y - 3 \geq 0 \Rightarrow y \in \left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$. 19. Funcția f este descrescătoare pe

$(0, 2)$ și crescătoare pe $(2, +\infty)$, deci $\text{Im } f = [y_v, +\infty) = [-3, +\infty)$. 20. a) $\text{Im } f = f(\mathbb{R}) =$

$[1, +\infty) \Rightarrow \text{Im } f \circ f \circ f = f(f([1, +\infty))) = f([1, +\infty)) = [1, +\infty)$. b) $a > x_v = 1$. c) $f(m-x) =$

$f(m+x), \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ dreapta $x = m$ este axă de simetrie pentru $G_f \Leftrightarrow m = x_v = 1$. 21. $x_v > 0$ și

$y_v > 0$, deci $m \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{8}, +\infty\right) = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{2}\right)$. 22. $|y_v| = 1 \Leftrightarrow |a-1| = 1 \Leftrightarrow a \in \{0, 2\}$. 23. Fie

$f(x) = ax^2 + bx + c$. Avem $a-b+c=1, c=1, a+b+c=3 \Rightarrow a=b=c=1$, deci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x + 1$.

24. $x_v = 1$ și $y_v = 2 \Rightarrow a = -2, b = 3$. 25. $x_v = 2$ și $y_v = 3 \Rightarrow a = -4, b = 7 \Rightarrow f(x) = x^2 - 4x + 7 \Rightarrow$

$f(3) = 4$. 26. $x_v = 2 \Rightarrow \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4$ și $f(1) = 2 \Rightarrow b = -1$. 27. $x_v = -1 \Rightarrow f(-1) = m^2 - 1 = g(-1) =$

$= 1 \Rightarrow m = \pm\sqrt{2}$. 28. a) $\Delta < 0 \Leftrightarrow 4(m-1)^2 - 4m(m+1) = -12m + 4 < 0 \Rightarrow m \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$. b)

$f_2(x) = 2x^2 - 2x + 3$, iar $\text{Im } f_2 = [y_v, +\infty) = \left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$. c) $\text{Im } g = f_2([-1, 1]) = \left[\frac{5}{2}, 7\right]$. d)

$x_v = 2 \Rightarrow \frac{m-1}{m} = 2 \Rightarrow m = -1$. e) $\begin{cases} m > 0 \\ \Delta = -12m + 4 < 0 \end{cases} \Rightarrow m \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$. f) Avem două cazuri

$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m \in \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$ sau $\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ m > 0 \\ x_1, x_2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \left(0, \frac{1}{3}\right] \\ x_1 + x_2 = \frac{2(m-1)}{m} \leq 0 \Leftrightarrow m \in \left(0, \frac{1}{3}\right] \\ x_1 x_2 = \frac{m+1}{m} \geq 0 \end{cases}$

Finalizare $m \in (0, +\infty)$. 29. $\Delta = 0 \Rightarrow 1 - 4m^2 = 0 \Rightarrow m = \pm\frac{1}{2}$. 30. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 - a) + a =$

$= 2x^2 - a > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci $a < 0$. 31. Avem condițiile $a+1 \neq 0$ și

$\Delta > 0 \Leftrightarrow 9(a-1)^2 - 4(a+1)(a-1) > 0 \Leftrightarrow a \in \left((-\infty, 1) \cup \left(\frac{13}{5}, +\infty\right)\right) \setminus \{-1\}$. 32. a) Dacă $a = 1$ ecuația

$4x+2=0$ admite soluții. Dacă $a \neq 1$ avem condiția $\Delta < 0 \Leftrightarrow 8(a+1) < 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -1)$.

b) Dacă $a = 1$ inecuația $4x+2 > 0$ admite soluții, deci nu convine. Dacă $a \neq 1$ avem condițiile

$a-1 < 0, \Delta \leq 0 \Leftrightarrow 8(a+1) \leq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -1]$. c) $\Delta = 0 \Leftrightarrow a = -1$. d) $x_v = 2 \Rightarrow -\frac{a+1}{a-1} = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$.

33. $y_v = \frac{-\Delta}{4a} = 2 \Rightarrow \frac{4a+3}{4} = 2 \Rightarrow a = \frac{5}{4}$. 34. Funcția f este strict crescătoare pe intervalul $[x_v, +\infty)$,

deci punem condiția $x_v \leq 1 \Rightarrow a \geq -\frac{1}{2}$. 35. Funcția f este strict crescătoare pe intervalul $(-\infty, x_v]$, deci

punem condiția $x_v \geq 2 \Rightarrow a \geq \frac{3}{2}$. 36. a) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1 \Leftrightarrow x_1 x_2 = x_1 + x_2 \Leftrightarrow m+1 = -(2m+3) \Rightarrow m = -\frac{4}{3}$.

- b) $x_1^2 = x_2^2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$, avem deci două cazuri: dacă $x_1 = x_2 \Rightarrow \Delta = 4m^2 + 8m + 5 = 0 \Rightarrow m \notin \mathbb{R}$, dacă $x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$. c) $|x_1 - x_2| = 1 \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = 1 \Rightarrow 4m^2 + 8m + 5 = 1 \Rightarrow m = -1$.
- d) $x_1 + 1 = x_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = 2x_1 + 1 = -2m - 3 \Rightarrow x_1 = -m - 2 \Rightarrow -m^2 - 2m - 1 = 0 \Rightarrow m = -1$.
37. $x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = x_1x_2(x_1 + x_2) = (2m - 1)(m - 1) = 2m^2 - 3m + 1$ cu valoarea minimă egală cu $-\frac{\Delta}{4a} = -\frac{1}{8}$. 38. $x_1^2x_2 = x_1x_2^2 \Leftrightarrow x_1x_2(x_1 - x_2) = 0$, dacă o rădăcină este nulă, atunci $m = -1$, iar dacă rădăcinile sunt egale atunci $\Delta = 4m^2 - 3 = 0 \Rightarrow m = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 39. $x_1x_2 < 0 \Rightarrow m - 1 < 0 \Rightarrow m \in (-\infty, 1)$

40. $x_1 \cdot x_2 < 0 \Leftrightarrow \frac{c}{a} < 0 \Leftrightarrow ac < 0 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow x_1 \neq x_2$ și $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. 41. Cele două ecuații au cel puțin o rădăcină comună. Observăm că ecuațiile nu pot avea două rădăcini comune (nu sunt coeficienții proporționali). Fie α rădăcina comună. $\alpha^2 - \alpha + m = 0$, $\alpha^2 - 2\alpha + m + 10 = 0 \Rightarrow$ prin scădere $\alpha = 10 \Rightarrow m = -90$. 42. $2a = x_1 + x_2 = -2 \Rightarrow a = -1$. 43. a) $f(x) = y \Leftrightarrow yx^2 - x + y = 0 \Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow y \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] = \text{Im } f$. b) $m > \max f = \frac{1}{2} = f(1)$. c) $n \leq \min f = -\frac{1}{2} = f(-1)$. 44. a)

Avem $x_2^2 + x_2 - 12 = 1 = x_1^2 + x_1 - 12$, deci $\frac{x_1}{x_2^2 + x_2 - 12} + \frac{x_2}{x_1^2 + x_1 - 12} = x_1 + x_2 = -1$.

b) $\frac{x_1}{x_2^2 + 2x_2 - 13} + \frac{x_2}{x_1^2 + 2x_1 - 13} = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = -\frac{37}{13}$. c) Prin inducție (completă) după n . $S_0 = 2 \in \mathbb{Z}$, iar dacă presupunem $S_i \in \mathbb{Z}, \forall i \in \{0, 1, \dots, k\}$, atunci $S_{k+1} = -S_k + 13S_{k-1} \in \mathbb{Z}$. 45.

$a = -\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}\right) = -\frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{3}$. 46. Luăm $x_2 = 1 - \sqrt{3}$, $s = x_1 + x_2 = 2$ și $p = x_1x_2 = -2$, deci ecuația va fi $x^2 - 2x - 2 = 0$. 47. $a = x_1 + x_2 = 3$, iar

$x_1x_2^2 + x_2x_1^2 = x_1x_2(x_1 + x_2) = 3b = 6 \Rightarrow b = 2$. 48. Din a doua ecuație obținem $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$ sau $\frac{x}{y} = 2$, deci obținem soluțiile (1, 2) și (2, 1). 49. Adunând cele două ecuații obținem $x^2 + 4x - 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -5$. Pentru $x = 1 \Rightarrow y = \pm 1$, iar pentru $x = -5 \Rightarrow y = \pm\sqrt{13}$. Soluțiile sunt (1, 1), (1, -1), (-5, $\sqrt{13}$), (-5, $-\sqrt{13}$).

Tema 1.5 Puteri și radicali. Ecuații iraționale

1. a) $\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} < \sqrt[12]{5^3} < \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{2^4}$. b) $\sqrt{3} = \sqrt[12]{3^4} < \sqrt[12]{8^3} < \sqrt[12]{5^4}$. c) Numerele sunt $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{1}}{2}$, $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}$ și $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{2}$. d) Se cunoaște inegalitatea mediilor $\max\{a, b\} \geq \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b} \geq \min\{a, b\}$, $a, b \in (0, +\infty)$ cu egalitate dacă și numai dacă $a = b$. Luăm $a = \sqrt{2}$ și $b = \sqrt{3}$, deci $\sqrt{3} > \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2} > \sqrt[4]{6} > \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} > \sqrt{2}$.

2. $\left[\sqrt[n]{n}\right] = 1 \Leftrightarrow \sqrt[n]{n} \in [1, 2) \Leftrightarrow 1 \leq n < 2^n$, inegalitate adevărată pentru $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
3. $a = \sqrt{(2 + \sqrt{3})^2} + \sqrt{(2 - \sqrt{3})^2} = 4$. 4. $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 14$. $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 52$.
5. Funcția f este strict descrescătoare pe intervalul $(-\infty, 2)$ și cum $1 < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < 2 \Rightarrow f(1) > f(\sqrt{2}) > f(\sqrt[3]{3})$. 6. $\underbrace{\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\dots\sqrt{a}}_{n \text{ radicali}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}} = a^{\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{2 \cdot 1 - \frac{1}{2}}} = a^{\frac{2^n - 1}{2^n}} \in \mathbb{N}$

Alegem, de exemplu $a = 2^{2^n}$.

7. $x = \sqrt{5 - a} + \sqrt{4 + a} \Rightarrow x^2 = 9 + 2\sqrt{5 - a}\sqrt{4 + a} \Rightarrow \sqrt{5 - a}\sqrt{4 + a} = \frac{x^2 - 9}{2}$.
8. $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4}} = 2^{\frac{15}{16}} \in (1, 2)$.
9. $1 < \sqrt[6]{6\sqrt[6]{6\sqrt[6]{6\sqrt[6]{6}}}}} = 6^{\frac{1}{6} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n!}} < 6^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}} = 6^{\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{2 \cdot 1 - \frac{1}{2}}} = 6^{\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{2}} < 6$.
10. $\sqrt[3]{\frac{2\sqrt{2}}{4}} = 2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{2}{6}} = 2^{\frac{5}{12}} = 2^a \Rightarrow a = \frac{5}{12}$.
11. $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt[4]{2} + 1)(\sqrt[8]{2} + 1)(\sqrt[16]{2} + 1)(\sqrt[32]{2} - 1) = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt[4]{2} + 1)(\sqrt[8]{2} + 1)(\sqrt[16]{2} - 1) = \dots = 1$, de unde cerința.
12. $\frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}} = (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) = 9$.
13. $\sqrt{3 - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}} - \sqrt{5} = \sqrt{3 - \sqrt{(2\sqrt{5} - 3)^2}} - \sqrt{5} = \sqrt{3 - (2\sqrt{5} - 3)} - \sqrt{5} = \sqrt{(5 - 1)^2} - \sqrt{5} = -1$.
14. $27 = 5 - x + 3 + x + 3\sqrt[3]{5 - x} \cdot \sqrt[3]{3 + x}(\sqrt[3]{5 - x} + \sqrt[3]{3 + x}) \Rightarrow \sqrt[3]{5 - x} \cdot \sqrt[3]{3 + x} = \frac{19}{9}$.
15. $\sqrt{101} = 10,049\dots \Rightarrow a_2 = 4$. 16. a) Condiții de existență: $\begin{cases} x + 2 \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$. Ecuația devine $x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$, deci soluția finală este $x = 2$. b) Condiții de existență: $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x - 5 \geq 0 \end{cases}$. Ecuația devine $x^2 - 11x + 24 = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 8$, deci soluția finală este $x = 8$. c) Notăm $\sqrt{x} = a \geq 0$, deci $a^2 + a - 6 = 0 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow x = 4$. d) Condiții de existență: $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ 1 - 2x \geq 0 \end{cases}$. Ecuația devine $3x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = \frac{5}{3}$, deci soluția finală este $x = 0$.
17. a) Condiții de existență $x \geq -1$. Prin ridicare la pătrat avem $x = 0$. b) Condiții de existență $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$. Avem $x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ soluție.

c) Condiții de existență $\begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 2 \end{cases} \cdot x-1+2-x+2\sqrt{(x-1)(2-x)}=1 \Rightarrow x_1=1, x_2=2.$

d) Condiții de existență $\begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq 5 \end{cases} \cdot x^2-11x+24=0 \Rightarrow x_1=3, x_2=8, \text{ în final } x=3 \text{ singura soluție.}$

e) Condiții de existență $x \geq 0. \sqrt{x}-1=\pm 2 \Rightarrow x=9$ singura soluție.

18. a) Condițiile de existență sunt $x+4>0, x-4>0$. Dacă notăm $\frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-4}}=a>0$ obținem

$$a+\frac{2}{a}=\frac{11}{3} \Rightarrow a_1=3, a_2=\frac{2}{3} \Rightarrow x_1=5, x_2=-\frac{52}{5}, \text{ soluția finală este } x=5.$$

b) Condițiile de existență sunt $\frac{x+4}{x-4}>0$. Dacă notăm $\sqrt{\frac{x+4}{x-4}}=a>0$ obținem

$$a+\frac{2}{a}=\frac{11}{3} \Rightarrow a_1=3, a_2=\frac{2}{3} \Rightarrow x_1=5, x_2=-\frac{52}{5} \text{ ambele soluții sunt bune.}$$

19. a) Condiții $(x+2)(x+3) \geq 0$, iar ecuația devine $x^2+5x-6=0 \Rightarrow x_1=1, x_2=-6$, ambele soluții sunt bune.

b) Condiții $x+2 \geq 0, x+3 \geq 0$, iar ecuația devine $x^2+5x-6=0 \Rightarrow x_1=1, x_2=-6$ singura soluție fiind $x=1$

20. a) Condiții $x>0, x \neq -1$. Notăm $\frac{\sqrt{x}}{x+1}=a$ și obținem $a+\frac{1}{a}=\frac{5}{2} \Rightarrow a_1=2, a_2=\frac{1}{2} \Rightarrow x=1$

b) Notăm $x^2+x-1=a \geq 0$ și ecuația se scrie $\sqrt{a}+\sqrt{a+3}=3 \Rightarrow a=1 \Rightarrow x^2+x-2=0 \Rightarrow x_1=1, x_2=-2.$

c) Condiția de existență este $x>0$. Notăm $\frac{x}{2+\sqrt{x}}=a>0 \Rightarrow a+\frac{1}{a}=\frac{10}{3} \Rightarrow a_1=3, a_2=\frac{1}{3}$. Pentru

$$a=3 \Rightarrow x=\left(\frac{3+\sqrt{33}}{2}\right)^2, \text{ iar pentru } a=\frac{1}{3} \Rightarrow x=1.$$

21. a) $x=7$.

b) $\sqrt[3]{x-1}=a \Rightarrow a^3+a=0 \Rightarrow a=0 \Rightarrow x=1.$

c) Ecuația se scrie $1-x=(x+1)^3 \Rightarrow x^3+3x^2+4x=0 \Rightarrow x=0.$

d) Ecuația se scrie $x+1=(1-2x)^3 \Rightarrow 8x^3-12x^2+7x=0 \Rightarrow x=0.$

22. a) Condițiile sunt $x \geq 1, x+8 \geq 6\sqrt{x-1}$. Ecuația se scrie $(\sqrt{x-1}-3)^2=1 \Rightarrow x_1=17, x_2=5.$

b) Notăm

$$\sqrt{x-1}=t \geq 0 \Rightarrow \sqrt{(t-3)^2}+\sqrt{(2t-1)^2}=3 \Rightarrow |t-3|+|2t-1|=3 \Rightarrow t_1=1, t_2=\frac{1}{3} \Rightarrow x_1=2, x_2=\frac{10}{9}.$$

23. a) $f(x)=\begin{cases} 2\sqrt{x-1}-3, & x \in (5, +\infty) \\ 1, & x \in [2, 5] \\ 3-2\sqrt{x-1}, & x \in [1, 2) \end{cases}$

Deci $f(x)=1 \Leftrightarrow x \in [2, 5].$

b) $\text{Im } f = [1, +\infty) \Rightarrow m \in [1, +\infty).$

24. a) $f(x)=|\sqrt{x-1}+1|+|\sqrt{x-1}+2|=2\sqrt{x-1}+3.$

Deci $f(x)=3 \Leftrightarrow x=1.$

b) $\text{Im } f = [3, +\infty)$ și cum f este strict crescătoare rezultă că ecuația $f(x)=m$ admite o singură soluție reală, pentru orice $m \in [3, +\infty).$

25. a) Funcția $f:[0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x)=\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}$ este strict crescătoare, deci ecuația $f(x)=2$ are soluția unică $x=1$.

Analog se rezolvă și celelalte ecuații: b) $x=3$, c) $x=1$, d) $x=1$, e) $x=8$.

26. Ecuația se scrie $(\sqrt{x-1}-1)^2+(\sqrt{y+2}-2)^2=0 \Rightarrow x=2, y=2$ cu soluția $(2, 2).$

27. a) Condiții $x+2 \geq 0, x \geq 0$.

Inecuație devine $x^2-x-2>0 \Rightarrow x \in ((-\infty, -1) \cup (2, +\infty)) \cap [0, +\infty) = (2, +\infty)$

b) Condiții $x+2 \geq 0$.

Pentru $x<0$ inecuația este satisfăcută. Pentru $x \geq 0$ inecuația devine $x^2-x-2 \leq 0 \Rightarrow x \in [0, 2].$

Finalizare $x \in [-2, 2].$

c) Inecuația se scrie $2-x^2 \geq 1 \Rightarrow x \in [-1, 1].$

Funcția exponențială și funcția logaritmică.

Tema 1.6

Ecuații și inecuații exponențiale și logaritmice

1. $a=16, b=3$. 2. $a=0, b=2, c=27$. 3. a) 1; b) 2; c) $\frac{2}{3}$; d) 0; e) 5; f) $\frac{9}{16}$.

4. a) $4<5<8 \Rightarrow 2<\log_2 5<3$; b) $8<9 \Rightarrow 3<\log_2 9$; $125<128 \Rightarrow 3=\log_5 125<\log_5 128=7\log_5 2$.

5. a) $\log_{12} 18 = \frac{\log_3 18}{\log_3 12} = \frac{\log_3 2 + \log_3 9}{\log_3 4 + \log_3 3} = \frac{a+2}{2a+1}$; b) $\log_5 20 = \frac{1}{1-2a}$; c) $\log_{15} 45 = \frac{a+2}{a+1}$;

d) $\log_6 60 = \frac{\log_2 60}{\log_2 6} = \frac{\log_2 3 + \log_2 4 + \log_2 5}{\log_2 2 + \log_2 3} = \frac{a+2+ab}{1+a}$, deoarece $\log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = ab$.

6. a) $A = \log_a x^{1+2+\dots+n} = \frac{n(n+1)}{2} \log_a x$; b) $B = \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}\right) \cdot \ln x = \frac{n \ln x}{n+1}$;

c) $C = \lg\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{998}{999} \cdot \frac{999}{1000}\right) = \lg \frac{1}{1000} = -3$; d) $D = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\lg^2 2} - \frac{n}{n+1} \log_2^2 2 = 0$;

e) $E = \log_{10!} 2 + \log_{10!} 3 + \dots + \log_{10!} 10 = \log_{10!} 10! = 1.$

7. Dacă $p \in \mathbb{N}$, atunci $[lg k] = p \Leftrightarrow p \leq lg k < p+1 \Leftrightarrow 10^p \leq p \leq 10^{p+1} - 1$. Suma din enunț este egală cu $2008 + 9 \cdot \sum_{p=0}^{2007} p \cdot 10^p = \frac{10}{9} (2007 \cdot 10^{2008} - 2008 \cdot 10^{2007} + 1) + 2008.$

8. a) $\lg\left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{\lg a + \lg b}{2} \Leftrightarrow ab = \left(\frac{a+b}{3}\right)^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 7ab$; b), c) - se procedează analog;

d) $\lg\left(\frac{a+3b}{2\sqrt{3}}\right) = \frac{\lg a + \lg b}{2} \Leftrightarrow \left(\frac{a+3b}{2\sqrt{3}}\right)^2 = ab \Leftrightarrow a^2 + 6ab + 9b^2 = 12ab \Leftrightarrow (a-3b)^2 = 0 \Leftrightarrow a=3b.$

9. Se impun condițiile de existență; obținem: a) $(2, \infty)$; b) $(1, \infty)$; c) $(-1, 1)$; d) $(-2, 2) \setminus \{1\}$;

e) $(-\infty, 3) \cup (4, \infty)$; f) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$. 10. a) Avem $f(x) = x(1 + \log_2 2)$, deci f este funcție de gradul 1 strict crescătoare, deci injectivă; b) Analog, $f(x) = x(1 - \log_2 2)$, este funcție strict descrescătoare.

12. Se înmulțește relația $\log_a x + \log_c x = 2 \log_b x$ cu $\log_x a$ și se folosește a doua formulă de la

probabilitatea cerută este $\frac{10}{5^3} = \frac{2}{25}$. 27. Trei dintre numerele $f(0), f(1), f(2), f(3)$ sunt egale cu 0, iar al patrulea cu 1. Sunt 4 cazuri favorabile, deci probabilitatea este $\frac{4}{4^4} = \frac{1}{64}$. 28. Sunt doar două funcții nesurjective – cele constante; deci sunt $2^5 - 2 = 30$ de funcții surjective; $p = \frac{30}{32}$.

29. a) 9^5 ; b) $4 \times 4 \times 9^3 = 16 \cdot 729$; c) $A_6^5 = 6! = 720$. 30. a) $C_8^3 = 56$; b) $C_n^2 = 45$; $n = 10$; c) $C_n^3 = 35$; $n = 7$; d) $C_5^2 \cdot C_5^3 = 100$. 31. a) $A_4^3 = 28$; b) $A_5^4 = 120$; c) $5^4 = 625$. 32. a) 64; b) 9; c) 16; d) 125; e) 32; f) $2 \cdot C_5^3 = 20$. 33. a) $\frac{6}{90}$; b) $\frac{243}{900}$; c) $\frac{4}{90}$; d) $\frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{10}{120}$; e) $\frac{36}{40}$; f) $\frac{12}{30}$; g) $\frac{2^3 - 1}{2^6 - 1} = \frac{7}{63}$. 34. $\frac{1}{10}$. 35. $\frac{27}{36}$.

Tema 1.9 Vectori în plan. Geometrie vectorială. Geometrie analitică

1. În triunghiul ABP dreptele BC, PM sunt mediane și N este centrul de greutate al triunghiului, deci M, N, P sunt coliniare. 2. Fie O centrul paralelogramului. În triunghiul ABD dreptele AO și DE sunt mediane, iar F se află pe mediana din D la $\frac{1}{3}$ de punctul E , adică este centrul de greutate al

$\triangle ABD$. Deci $F \in AO = AC$. 3. $\frac{MA}{AN} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{PA} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \overrightarrow{PM} + \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} \overrightarrow{PN} \Rightarrow a = \frac{2}{3}$ și $b = \frac{1}{3}$.

4. $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = -\frac{3}{4} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \Rightarrow a = -\frac{3}{4}$ și $b = -1$.

5. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = 3\overrightarrow{BC} \Rightarrow |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}| = 12$. 6. Din teorema bisectoarei avem

$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = \frac{3}{4} \Rightarrow \overrightarrow{AE} = \frac{4}{7} \overrightarrow{AB} + \frac{3}{7} \overrightarrow{AC} \Rightarrow a = \frac{4}{7}, b = \frac{3}{7}$. 7. $\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}) +$

$\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}) = \vec{0}$. 8. Fie O centrul paralelogramului. $\overrightarrow{MO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD})$,

de unde cerința. 9. Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC , atunci $\vec{0} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$, deci $M = G$. 10. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$, $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN}$ și

adunând aceste relații obținem $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$. 11. Fie G este centrul de greutate al triunghiului ABC

și G' este centrul de greutate al triunghiului MNP . $\overrightarrow{GG'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GP}) =$

$\frac{1}{3} \left[\left(\frac{1}{3} \overrightarrow{GA} + \frac{2}{3} \overrightarrow{GB} \right) + \left(\frac{1}{3} \overrightarrow{GB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{GC} \right) + \left(\frac{1}{3} \overrightarrow{GC} + \frac{2}{3} \overrightarrow{GA} \right) \right] = \frac{1}{3}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0}$, deci $G = G'$. 12.

Fie G este centrul de greutate al triunghiului ABC , atunci $\vec{0} = \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HG}$, deci $H = G$ de unde rezultă că triunghiul ABC este echilateral. 13. Fie E piciorul bisectoarei din A . Din teorema

bisectoarei avem $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = \frac{b}{c} \Rightarrow \overrightarrow{AE} = \frac{b}{b+c} \overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{b+c} \overrightarrow{AD}$, de unde rezultă cerința.

14. $AB = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$, $AC = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = 13$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = (-9, 15)$, $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{81 + 225} = \sqrt{306}$, deci perimetrul triunghiului ABC este egal cu $18 + \sqrt{306}$. 15. a) Vectorul \vec{v} căutat este de forma $\vec{v} = a(4\vec{i} + 3\vec{j})$, $a \in \mathbb{R}$ și cum $|\vec{v}| = |a||4\vec{i} + 3\vec{j}| = 5|a| = 6 \Rightarrow a = \pm \frac{6}{5} \vec{u}$. b) Vectorul \vec{v} căutat este de forma $\vec{v} = a(-3\vec{i} + 4\vec{j})$, $a \in \mathbb{R}$ și cum $|\vec{v}| = |a||-3\vec{i} + 4\vec{j}| = 5|a| = 5 \Rightarrow a = \pm(-3\vec{i} + 4\vec{j})$.

16. $m_u = \frac{3}{a} = -1 \Rightarrow a = 3$. 17. a) Fie D mijlocul laturii BC .

$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{5}{2}\vec{i} + \frac{5}{2}\vec{j} \Rightarrow |\overrightarrow{AD}| = \frac{5}{2}\sqrt{2}$.

b) $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = -3\vec{i} - \vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{3}(-7\vec{i} - 4\vec{j})$. 18. $AB = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5$, $AC =$

$= \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ Fie D piciorul bisectoarei din A . Din teorema bisectoarei avem

$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC} = \frac{5}{13} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{1}{1 + \frac{5}{13}} \overrightarrow{AB} + \frac{\frac{5}{13}}{1 + \frac{5}{13}} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{18}(-27\vec{i} + 99\vec{j}) \Rightarrow |\overrightarrow{AD}| = \frac{1}{18}\sqrt{27^2 + 99^2}$.

19. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos A = 10$. 20. Fie $Q(x, y)$. $\overrightarrow{MN}(-4, 1) = \overrightarrow{QP}(-1 - x, 2 - y) \Rightarrow x = 3$,

$y = 1 \Rightarrow Q(3, 1)$. 21. $|\vec{u}| = |\vec{v}| \Rightarrow \sqrt{4 + 9} = \sqrt{(a-1)^2 + 1} \Rightarrow a = 1 \pm 2\sqrt{3}$. 22. $\vec{u} \cdot \vec{v} = m(m-2) - 3 =$

$0 \Rightarrow m = 3$. 23. $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1)}{\sqrt{1+4}\sqrt{9+1}} = \frac{1}{\sqrt{50}}$. 24. $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{1 \cdot a + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{1+1}\sqrt{a^2+1}} =$

$\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} a > 1 \\ 2(a-1)^2 = a^2 + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a > 1 \\ a = 2 \pm \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow a = 2 + \sqrt{3}$ 25. Fie $\overrightarrow{AD} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Avem condițiile

$\begin{cases} \overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{BD} \parallel \overrightarrow{BC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ \frac{x+4}{1} = \frac{y-3}{2} \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{22}{5}, y = \frac{11}{5} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \left(-\frac{22}{5}, \frac{11}{5}\right)$. 26. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \cdot 2 + (-4) \cdot 3 < 0 \Rightarrow$ cerința.

27. $AB = AC = 5 \Rightarrow \triangle ABC$ este isoscel. Fie D proiecția lui A pe BC . $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 3\vec{j} \Rightarrow AD = 3$.

28. $|\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}|^2 = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB})^2 = AD^2 + AB^2 + 2AD \cdot AB \cdot \cos A = 36 + 16 + 24 = 76 \Rightarrow |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}| = \sqrt{76}$.

29. $\cos B = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} \Rightarrow \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{7}{\sqrt{50}}$. $S_{ABC} = \frac{BA \cdot BC \cdot \sin B}{2} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{7}{\sqrt{50}}}{2} = \frac{7}{2}$.

30. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}[(2\vec{i} - 3\vec{j}) + (-2\vec{i} - 3\vec{j})] = -\vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{AG}(0, -2)$. 31. a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\vec{u}, \vec{v}) =$

$4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$. b) $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = (\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = 13 \Rightarrow |\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{13}$. c) $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u} + \vec{v}}) =$

$\frac{\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u} + \vec{v}|} = \frac{\vec{u}^2 + \vec{u} \cdot \vec{v}}{4 \cdot \sqrt{13}} = \frac{5}{2\sqrt{13}}$. 32. $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{\vec{u}, \vec{v}} = \frac{5\pi}{6}$. 33. Mijlocul segmentului

AB este $C\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, panta dreptei AB este $m_{AB} = 1$. Dacă d este mediatoarea segmentului AB , atunci

$$d: y - \frac{1}{2} = -1 \left(x + \frac{1}{2} \right) \Rightarrow d: x + y = 0. \quad \mathbf{34. a)} \text{ Fie } d \text{ dreapta c\u00e2ut\u0103t\u0103. } m_d = m_{AB} = -1 \Rightarrow d: y = -x. \quad \mathbf{b)}$$

$$\text{Fie } C(x, 0) \Rightarrow m_{AC} \cdot m_{AB} = \frac{-1}{x-1} \cdot (-1) = -1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow C(0, 0).$$

$$\mathbf{35.} \quad M \text{ este mijlocul segmentelor } AC \text{ \u015fi } BD, \text{ deci } 1 = \frac{1+x_C}{2}, -1 = \frac{3+y_C}{2} \Rightarrow C(1, -5) \text{ \u015fi } \\ 1 = \frac{2+x_D}{2}, -1 = \frac{-1+y_D}{2} \Rightarrow D(0, -1). \quad \mathbf{36.} \text{ Fie } M(x, y) \Rightarrow \overline{AM}(x+1, y+5) = \frac{2}{5} \overline{AB}(3, 6) \Rightarrow M\left(\frac{1}{5}, -\frac{13}{5}\right).$$

$$\mathbf{37.} \quad \sqrt{(u-6)^2 + v^2} = \sqrt{u^2 + (v-6)^2} = \sqrt{(u-12)^2 + (v-12)^2} \Rightarrow u = 7, v = 7, \text{ deci } M(7, 7).$$

$$\mathbf{38.} \quad d: y - 5 = m(x - 2), \text{ unde panta dreptei } d \text{ este } m = -\frac{1}{2}, \text{ deci } d: x + 2y - 12 = 0. \quad \mathbf{39.}$$

$$d: y - 2 = m(x - 1), \text{ unde panta dreptei } d \text{ este } m = -1, \text{ deci } d: x + y - 3 = 0. \quad \mathbf{40.} \text{ Fie } D \text{ mijlocul segmentului } [BC], \text{ deci } D(2, 1). \text{ Mediana din } A \text{ are ecua\u021bia}$$

$$y - y_A = m_{AM}(x - x_A) \Rightarrow AD: 4x - y - 7 = 0. \quad \mathbf{41.} \overline{AB}(-4, 2) \parallel \overline{CD}(3, a+3) \Rightarrow \frac{-4}{3} = \frac{2}{a+3} \Rightarrow a = -\frac{9}{2}.$$

$$\mathbf{42.} \quad x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \Rightarrow C(2, -2). \quad \mathbf{43.} BC: x + y - 1 = 0, \text{ deci } d(A, BC) =$$

$$= \frac{|x_A + y_A - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}. \quad \mathbf{44.} \quad m_1 = m_2 \Rightarrow -a = \frac{1}{2} \Rightarrow a = -\frac{1}{2} \quad \mathbf{45.} \text{ Fie } d' \text{ dreapta c\u00e2ut\u0103t\u0103.}$$

$$m_d \cdot m_{d'} = -1 \Rightarrow m_{d'} = 2 \Rightarrow d': y - 2 = 2(x - 3). \quad \mathbf{46.} \text{ Fie } d \text{ dreapta c\u00e2ut\u0103t\u0103. } m_{AB} \cdot m_d = -1 \Rightarrow m_d = -3 \Rightarrow$$

$$d: y - 2 = -3(x - 1). \quad \mathbf{47.} \text{ Punctul } C(-1, 2) \text{ este mijlocul segmentului } [AB], \text{ panta dreptei } AB \text{ este egal\u0103 cu } -1. \text{ Mediatoarea segmentului } [AB] \text{ are ecua\u021bia } d: x - y + 3 = 0, \text{ deci}$$

$$d(M, d) = \frac{|1 - 5 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad \mathbf{48.} \quad m_{AB} = \frac{3}{4} \Rightarrow m_{BC} = -\frac{4}{3} \Rightarrow h_C: y + 3 = -\frac{4}{3}(x - 2). \quad \mathbf{49.} \text{ Punctul}$$

$$A(-2011, 0) \in d_1 \text{ \u015fi cum dreptele } d_1 \text{ \u015fi } d_2 \text{ sunt paralele, rezult\u0103 c\u0103}$$

$$d(d_1, d_2) = d(A, d_2) = \frac{|-2011 + a|}{\sqrt{2}} = 2 \Rightarrow a = 2011 \pm 2\sqrt{2}. \quad \mathbf{50.} \text{ Avem trei cazuri:}$$

$$d(d_1, d_2) = d(d_1, d_3), \quad d(d_2, d_1) = d(d_2, d_3) \text{ sau } d(d_3, d_1) = d(d_3, d_2). \text{ Fie } A(-2, 1) \in d_1 \text{ \u015fi}$$

$$B(-4, 3) \in d_2. \text{ Cazul 1. } d(A, d_2) = d(A, d_3) \Rightarrow \frac{|-6 + 4|}{5} = \frac{|-6 + 4 + a|}{5} \Rightarrow a_1 = 4, a_2 = 0, \text{ dar } a = 0$$

$$\text{nu convine. Cazul 2. } d(B, d_1) = d(B, d_3) \Rightarrow \frac{|-12 + 12 + 2|}{5} = \frac{|-12 + 12 + a|}{5} \Rightarrow a_1 = 2, a_2 = -4, \text{ dar}$$

$$a = 2 \text{ nu convine. Cazul 3. } d(A, d_3) = d(B, d_3) \Rightarrow \frac{|-6 + 4 + a|}{5} = \frac{|-12 + 12 + a|}{5} \Rightarrow a = 1.$$

$$\mathbf{51.} \quad \{A(-4, 0)\} = d_2 \cap Ox \text{ \u015fi } \{B(0, -2)\} = d_2 \cap Oy, \text{ deci } d_1 = AB': x - 2y + 4 = 0, \text{ unde}$$

$$B'(0, 2) = \text{sim}_{Ox} B. \quad \mathbf{52.} \quad \begin{cases} 1 + 2a + b = 0 \\ -1 + a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = -2, b = 3 \Rightarrow a + b = 1. \quad \mathbf{53.} \quad \frac{m}{3} = \frac{m-2}{-1} \Rightarrow m = \frac{3}{2}. \quad \mathbf{54.}$$

$$\frac{2}{1} = \frac{1}{a} = \frac{-b}{2} \Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = -4 \Rightarrow a + b = -\frac{7}{2}. \quad \mathbf{55. a)} AB: 2x + y - 1 = 0 \text{ de unde cerin\u021ba. b) Aria}$$

$$\text{triunghiului } ABC \text{ este egal\u0103 cu } |2a + b - 1|, \text{ de unde cerin\u021ba.}$$

Tema 1.10

Trigonometrie. Aplica\u021bii ale trigonometriei \u015fi ale produsului sclar \u00een geometria plan\u0103

$$\mathbf{1. a)} \quad S = \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \dots + \sin^2 44^\circ + \frac{1}{2} + \cos^2 44^\circ + \dots + \cos^2 1^\circ + 0 = 44,5. \quad \mathbf{b)} \quad P = \sin 1^\circ \cdot$$

$$\sin 2^\circ \cdot \dots \cdot \sin 2011^\circ = 0, \text{ pentru c\u0103 } \sin 180^\circ = 0. \quad \mathbf{2. a)} \quad S = \sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin 180^\circ + (-\sin 1^\circ) +$$

$$(-\sin 2^\circ) + \dots + (-\sin 180^\circ) = 0. \quad \mathbf{b)} \quad P = \cos 1^\circ \cdot \cos 2^\circ \cdot \dots \cdot \cos 2011^\circ = 0, \text{ pentru c\u0103 } \cos 90^\circ = 0. \quad \mathbf{3. a)}$$

$$\lg 1^\circ \cdot \lg 2^\circ \cdot \dots \cdot \lg 89^\circ = \lg 1^\circ \cdot \lg 2^\circ \cdot \dots \cdot \lg 44^\circ \cdot \lg 45^\circ \cdot \lg 44^\circ \cdot \lg 43^\circ \cdot \dots \cdot \lg 1^\circ = 1.$$

$$\mathbf{b)} \quad \cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 179^\circ = \cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 89^\circ + \cos 90^\circ - \cos 89^\circ - \cos 88^\circ - \dots - \cos 1^\circ = 0$$

$$\mathbf{4.} \quad \frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ} = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cos 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 10^\circ = 2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ \Leftrightarrow$$

$$\sin(30^\circ + 10^\circ) = \sin 40^\circ \text{ egalitate adev\u0103rat\u0103.} \quad \mathbf{5. a)} \quad \frac{\sin a + \cos a}{\sin a} = 1 + \frac{1}{\tan a} = \frac{3}{2}. \quad \mathbf{b)}$$

$$\frac{2 \sin^2 a + 1}{\cos^2 a} = \frac{3 \sin^2 a + \cos^2 a}{\cos^2 a} = 1 + 3 \tan^2 a = 13 \quad \mathbf{6.} \quad a = \tan(78^\circ - 18^\circ) = \sqrt{3}, \quad b = \sin(108^\circ - 48^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\mathbf{7.} \quad \sin 40^\circ \cdot \sin 140^\circ = \sin^2 40^\circ = \cos^2 50^\circ = (-\cos 130^\circ)^2 = \cos^2 130^\circ. \quad \mathbf{8. a)} \quad \sin 75^\circ \cos 15^\circ =$$

$$\frac{1}{2} (\sin 90^\circ + \sin 60^\circ) = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}. \quad \mathbf{b)} \quad \cos \frac{23\pi}{12} \cdot \sin \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{23\pi}{12} + \frac{\pi}{12} \right) + \sin \left(\frac{23\pi}{12} - \frac{\pi}{12} \right) \right] = \frac{1}{4}.$$

$$\mathbf{c)} \quad \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \quad \mathbf{9.} \quad \sin 1 > \sin \frac{\pi}{4} = \sin \frac{3\pi}{4} > \sin 3. \quad \sin 2 - \sin 1 = 2 \sin \frac{1}{2} \cos \frac{3}{2} > 0,$$

$$\text{pentru c\u0103 } \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right). \text{ Finalizare num\u0103rul c\u00e2utat este egal cu } \sin 2. \quad \mathbf{10.} \quad 1 \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow \sin 1 > \cos 1.$$

$$\mathbf{11. a)} \quad \cos^2 a = 1 - \sin^2 a = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos a = -\frac{4}{5} \Rightarrow \sin 2a = 2 \sin a \cos a = -\frac{24}{25}. \quad \mathbf{b)} \quad \tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = -\frac{3}{4}.$$

$$\mathbf{12.} \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x = \frac{1}{9} \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{3}. \quad \mathbf{13.} \quad \tan x + \cot x = 2 \Rightarrow \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = 2 \Rightarrow$$

$$1 = 2 \sin x \cos x \Rightarrow \sin 2x = 1. \quad \mathbf{14.} \text{ Doar numerele } 0 \text{ \u015fi } \frac{\pi}{2} \text{ din mul\u021bimea } A \text{ verific\u0103 ecua\u021bia, deci}$$

$$\text{probabilitatea cerut\u0103 este } \frac{2}{5}. \quad \mathbf{15.} \quad \frac{\sin x - \cos x}{\sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right)} = \frac{\sin x - \cos x}{\frac{1}{\sqrt{2}} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x} = -\sqrt{2}. \quad \mathbf{16.} \text{ Prin ridicare la}$$

$$\text{p\u0103trat ob\u021binem } \sin^2 a + \cos^2 a + 2 \sin a \cos a = \frac{1}{9} \Rightarrow \sin 2a = -\frac{8}{9}. \quad \mathbf{17.} \text{ Ridic\u0103m la p\u0103trat fiecare egalitate}$$

$$\text{\u015fi le adun\u0103m, deci } \sin^2 a + \cos^2 b + 2 \sin a \cos b + \cos^2 a + \sin^2 b + 2 \cos a \sin b = \frac{5}{4} \Rightarrow$$

$$2 \sin(a + b) = \frac{-3}{4} \Rightarrow \sin(a + b) = -\frac{3}{8}. \quad \mathbf{18.} \quad 1 = \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b} \Rightarrow \tan b - \tan a + \tan b \cdot \tan a = -1.$$

$$\mathbf{19.} \quad \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}. \quad \mathbf{20.} \quad \sin 2x = \frac{1}{2} (\sin x + \sin 3x) = \sin 2x \cos x \Rightarrow \sin 2x = 0 \text{ sau } \cos x = 1$$

$$\Rightarrow x \in \left\{0, \frac{\pi}{2}\right\}. \quad \mathbf{21.} \text{ Din formula lui Heron } S_{ABC} = 12 = 9r \Rightarrow r = \frac{4}{3}. \quad \mathbf{22. a)} \quad S_{ABC} = \frac{6 \cdot 4 \cdot \sin \frac{2\pi}{3}}{2} = 6\sqrt{3}.$$

$$\mathbf{b)} \quad BC^2 = 36 + 16 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 76 \Rightarrow P_{ABC} = 10 + \sqrt{76}. \quad \mathbf{c)} \quad \frac{BC}{\sin A} = 2R \Rightarrow R = \frac{\sqrt{76}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\frac{76}{3}}.$$

$$\mathbf{23.} \sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C \Leftrightarrow \frac{a^2}{4R^2} + \frac{b^2}{4R^2} = \frac{c^2}{4R^2} \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow \text{triunghiul } ABC \text{ este dreptunghic}$$

cu ipotenuza c . $\mathbf{24.} \quad \cos^2 A + \cos^2 B = 2\cos^2 C \Rightarrow (1 - \sin^2 A) + (1 - \sin^2 B) = 2(1 - \sin^2 C) \Rightarrow \sin^2 A + \sin^2 B = 2\sin^2 C \Leftrightarrow \frac{a^2}{4R^2} + \frac{b^2}{4R^2} = 2 \cdot \frac{c^2}{4R^2} \Rightarrow a^2 + b^2 = 2c^2.$

$$\mathbf{25.} \cos C = \cos\left(\pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}\right)\right) = -\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}. \quad \mathbf{26.} \quad BC = 2R \sin A = 6.$$

$$\mathbf{27.} \quad \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{3}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3}. \quad \mathbf{28.} \quad \mathbf{a)} \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}.$$

$$\overline{AB} \cdot \overline{AC} = c \cdot b \cdot \cos A = 8. \quad \mathbf{b)} \quad \sin A = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \Rightarrow R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{3}{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{9}{2\sqrt{5}}.$$

$$\mathbf{29.} \quad a + c = 2b \Rightarrow 2R \sin A + 2R \sin C = 4R \sin B \Rightarrow \sin A + \sin C = 2 \sin B. \quad \mathbf{30.} \quad a^2 \sin 2B = \frac{abc}{R} \Rightarrow$$

$$2a^2 \sin B \cos B = 4 \frac{ac \sin B}{2} \Rightarrow a \cos B = c \Rightarrow \cos B = \frac{c}{a} \Rightarrow \text{triunghiul } ABC \text{ este dreptunghic.} \quad \mathbf{31.} \text{ Fie } O$$

centrul dreptunghiului. $AC = 10 \Rightarrow AO = 5. \quad S_{ABCD} = 48 \Rightarrow S_{AOB} = 12 = \frac{BO \cdot AO \cdot \sin O}{2} =$

$$= \frac{25 \cdot \sin O}{2} \Rightarrow \sin O = \frac{24}{25}. \quad \mathbf{32.} \quad AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B} = \sqrt{76}. \text{ Aria } S_{ADC} = \frac{AD \cdot DC \cdot \sin D}{2} =$$

$$6\sqrt{3} = \frac{AC \cdot h}{2} \Rightarrow h = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{76}}. \quad \mathbf{33.} \text{ Aria } S_{ABC} = 6\sqrt{6} = \frac{7 \cdot h_{\min}}{2} \Rightarrow h_{\min} = \frac{12\sqrt{6}}{7}. \quad \mathbf{34.} \text{ Fie } a \text{ cea mai mică}$$

catetă, deci laturile triunghiului sunt $a, a+1$ și $a+2$.

$$(a+2)^2 = a^2 + (a+1)^2 \Rightarrow a^2 - 2a - 3 = 0 \Rightarrow a = 3. \text{ Deci triunghiul are laturile } 3, 4 \text{ și } 5. \quad \mathbf{35.} \text{ Prin}$$

ridicare la pătrat avem $1 + 2 \sin B \cos B = 1 + 2 \sin C \cos C \Rightarrow \sin 2B = \sin 2C \Rightarrow$

$$2 \sin \frac{2B-2C}{2} \cos \frac{2B+2C}{2} = 0 \Rightarrow B = C \text{ sau } B + C = \frac{\pi}{2}. \text{ Dar triunghiul } ABC \text{ este ascuțitunghic rezultă}$$

că $B = C$. $\mathbf{36.} \quad \operatorname{tg} C = \operatorname{tg}(\pi - A - B) = -\frac{\operatorname{tg} A + \operatorname{tg} B}{1 - \operatorname{tg} A \operatorname{tg} B} = 1 \Rightarrow C = \frac{\pi}{4}. \quad \mathbf{37.} \text{ Triunghiul este dreptunghic cu aria}$

$$S = 6 = p \cdot r \Rightarrow r = 1, \text{ iar } R = \frac{5}{2}. \quad \mathbf{38.} \text{ Fie } A \text{ unghiul obtuz. } \cos A = \frac{a^2 + (a+1)^2 - (a+2)^2}{2a(a+1)} <$$

$$< 0 \Rightarrow a^2 - 2a - 3 < 0 \Rightarrow a \in (-1, 3) \cap \mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}. \text{ Singura soluție este } a = 2. \quad \mathbf{39.} \mathbf{a)} \quad \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}; \mathbf{b)}$$

$$-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}; \mathbf{c)} \quad \frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{4}\right); \mathbf{d)} \quad \frac{\pi}{3} + \operatorname{arccctg}(\sqrt{2}) + \pi - \operatorname{arccctg}(\sqrt{2}) = \frac{4\pi}{3}; \mathbf{e)} \quad \frac{\pi}{3} - \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right). \quad \mathbf{40.} \mathbf{a)}$$

$$\sin\left(2 \arcsin \frac{3}{5}\right) = 2 \sin\left(\arcsin \frac{3}{5}\right) \cos\left(\arcsin \frac{3}{5}\right) = 2 \cdot \frac{3}{5} \sqrt{1 - \frac{9}{25}};$$

$$\mathbf{b)} \quad \cos\left(2 \arcsin \frac{1}{3}\right) = 1 - 2 \sin^2\left(\arcsin \frac{1}{3}\right) = \frac{7}{9}; \quad \mathbf{c)} \quad \sin\left(\frac{\pi}{3} - \arcsin \frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{9}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}; \quad \mathbf{d)}$$

$$-\cos\left(\arcsin \frac{1}{3}\right) = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}}; \quad \mathbf{e)} \quad \operatorname{tg}(2 \operatorname{arctg} 3) = \frac{2 \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} 3)}{1 - \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} 3)} = \frac{6}{-8}. \quad \mathbf{41.} \mathbf{a)} \quad x \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}; \quad \mathbf{b)}$$

$$x \in \left\{\pm \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}; \quad \mathbf{c)} \text{ Dacă notăm } a = \sin x \text{ și } b = \cos x \text{ obținem sistemul } \begin{cases} a + b = 1 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases} \text{ cu}$$

soluțiile $(1, 0)$ și $(0, 1)$, deci $x \in \left\{0, \frac{\pi}{2}\right\}; \quad \mathbf{d)} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}; \quad \mathbf{e)} \quad 2 \sin x \cos x = \cos x \Rightarrow$

$$\cos x = 0 \text{ sau } \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x \in \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\};$$

$$\mathbf{f)} \quad x \in \left\{\frac{\pi}{4}, \pi + \frac{\pi}{4}, 2\pi + \frac{\pi}{4}, 3\pi + \frac{\pi}{4}\right\}; \quad \mathbf{g)} \quad 2x \in \left\{-2\pi + \frac{5\pi}{4}, -2\pi + \frac{7\pi}{4}\right\} \subset [-2\pi, 0] \Rightarrow$$

$$x \in \left\{-\pi + \frac{5\pi}{8}, -\pi + \frac{7\pi}{8}\right\}. \quad \mathbf{42.} \mathbf{a)} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right), \text{ deci mulțimea}$$

soluțiilor este \mathbb{R} . $\mathbf{b)} \quad x = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad \mathbf{c)} \quad \operatorname{tg} x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x \in \left\{-\frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}. \quad \mathbf{d)} \text{ Dacă notăm}$

$$a = \sin x \in [-1, 1], \text{ obținem ecuația } a = 2 - a^2 \Rightarrow a_1 = 1, a_2 = -2, \text{ în final } x \in \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\mathbf{e)} \quad \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \text{ deci } x = \frac{1}{2}.$$

Partea 2. ALGEBRĂ (clasele XI-XII)

Tema 2.1 Permutări. Matrice. Determinanți

1. a) $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$; b) $\sigma^6 = e$. 2. a) $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 4)$; $\varepsilon(\sigma) = 1$. b) $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. 3. a) $k = 4$. b) $4 \mid 2012 \Rightarrow \sigma^{2012} = e$.

c) $x = \sigma^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

4. a) $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 4 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. b) $m(\sigma) = m(\sigma^{-1}) = 7$. c) x^4 este pară, $\forall x \in S_6$, σ e impară $\Rightarrow x^4 \neq \sigma$, $\forall x \in S_6$. 5. a) $x = a^{-1}b$. b) $ab = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow k = 5$. c) Cel mai mic număr $p \in \mathbb{N}^*$ cu

$b^p = e$ este 6. Dacă $k = 6c + r$, $0 \leq r \leq 5$, atunci $\sigma^k = \sigma^{6c} \cdot \sigma^r = \sigma^r$. Ca urmare, $\sigma^k = e \Leftrightarrow \sigma^r = e \Leftrightarrow r = 0 \Leftrightarrow k = 6c \Leftrightarrow 6 \mid k$. 6. a) Da. b) Prin calcul, $a^4 = b^4 = e$. c) $xb^3 = a^3x \Leftrightarrow axb^3 = a^4x \Leftrightarrow axb^3 = x \Leftrightarrow axb^4 = xb \Leftrightarrow ax = xb$. O soluție este c. 7. a) $m(\sigma) = 4$. b) $|A| = 5$. c) σ este pară $\Rightarrow \sigma^n$ e pară, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. 8. a), b) Calcul direct. 9. $AB = \begin{pmatrix} a+3 & b+12 \\ a+4 & b+16 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} a+b & 3a+4b \\ 5 & 19 \end{pmatrix}$. Rezultă $a = 1$,

$b = 3 \Rightarrow A = B$. 10. $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, deci $AB = (BA)'$. 11. $X^2 = -I_2$, $X^3 = -X$,

$X^4 = I_2 \Rightarrow X + X^2 + X^3 + X^4 = O_2 \Rightarrow X + X^2 + \dots + X^{100} = O_2$. 12. $X^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, deci

$X + X^2 + \dots + X^{10} = \begin{pmatrix} 10 & 55 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$. 13. $AB = \begin{pmatrix} 2+5a & 10 \\ a & 2 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ a & 5a+2 \end{pmatrix}$, deci $a = 0$. 14. a)

$A^3 = O_3$. b) $(I_3 - A)(I_3 + A + A^2) = I_3 - A^3 = I_3 - O_3 = I_3$. 15. a) Se obține $AB = (6)$ și

$BA = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. b) $(BA)^n = B \underbrace{(AB)(AB) \dots (AB)}_{n-1} A = 6^{n-1} BA$. 16. Fie $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$.

a) $\text{tr}(\alpha A) = \sum_{i=1}^n \alpha a_{ii} = \alpha \sum_{i=1}^n a_{ii} = \alpha \text{tr}(A)$. b) $\text{tr}(A+B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.

17. Calcul direct. 18. Inducție. $P(2) : A^2 = \text{tr}(A)A$, adevărat din exercițiul anterior;

$P(n) \Rightarrow P(n+1) : A^{n+1} = A^n \cdot A = (\text{tr}(A))^{n-1} A^2 = (\text{tr}(A))^n A$. 19. $\det(A^{2012}) = 0 \Rightarrow \det(A)^{2012} = 0 \Rightarrow \det(A) = 0 \Rightarrow A^{2012} = \text{tr}(A)^{2011} A \Rightarrow \text{tr}(A)^{2012} = 0 \Rightarrow \text{tr}(A) = 0 \Rightarrow A^2 = \text{tr}(A)A = O_2$. 20. Inducție după n .

21. $A = 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{3} \\ -\sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = 2^n \begin{pmatrix} \cos \frac{n\pi}{3} & \sin \frac{n\pi}{3} \\ -\sin \frac{n\pi}{3} & \cos \frac{n\pi}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow A^{2013} = -2^{2013} I_2$.

22. Fie $B = A - I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow B^2 = 2B \Rightarrow B^k = 2^{k-1} \cdot B$. Apoi, $A = I_2 + B \Rightarrow A^n = (I_2 + B)^n =$

$$I_2 + \sum_{k=1}^n C_n^k B^k = I_2 + \sum_{k=1}^n C_n^k 2^{k-1} B = I_2 + \frac{1}{2} B \sum_{k=1}^n C_n^k 2^k = I_2 + \frac{1}{2} B [(1+2)^n - 1] = I_2 + B \cdot \frac{3^n - 1}{2}.$$

23. $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M^3 = O_3 \Rightarrow M^n = O_3, n \geq 3$. 24. $A = I_3 + M$, unde este matricea de la

exercițiul anterior. Rezultă că $A^n = (I_3 + M)^n = I_3 + C_n^1 M + C_n^2 M^2 = \begin{pmatrix} 1 & -n & n(n+3)/2 \\ 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

25. Fie X o soluție. Rezultă $\det(X^2) = 49 \Rightarrow \det(X)^2 = 49 \Rightarrow \det(X) = \pm 7$. Distingem cazurile

i) $\det(X) = 7 \Rightarrow X^2 - \text{tr}(X)X + 7I_2 = O_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} =$

$\text{tr}(X) \cdot X \Rightarrow \text{tr}(X) \cdot X = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}(\text{tr}(X)X) = 16 \Rightarrow \text{tr}^2(X) = 16 \Rightarrow \text{tr}(X) = \pm 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow \pm 4X = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow X_{1,2} = \pm \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

ii) $\det(X) = -7 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = \text{tr}(X) \cdot X \Rightarrow \text{tr}(X) \cdot X = \begin{pmatrix} -6 & 12 \\ -4 & -6 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}^2(X) = -12$.

Cum $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, nu avem soluții.

26. Fie X o soluție $\Rightarrow X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = X^3 = X^2 X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X$. Fie $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Din egalitatea

anterioară rezultă $a = d$, $b = c \Rightarrow X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \Rightarrow X^3 = \begin{pmatrix} \frac{(a+b)^3 + (a-b)^3}{2} & \frac{(a+b)^3 - (a-b)^3}{3} \\ \frac{(a+b)^3 - (a-b)^3}{3} & \frac{(a+b)^3 + (a-b)^3}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow (a+b)^3 + (a-b)^3 = 2$ și $(a+b)^3 - (a-b)^3 = 4 \Rightarrow (a+b)^3 = 3$ și $(a-b)^3 = -1 \Rightarrow a+b = \sqrt[3]{3}$, $a-b = -1 \Rightarrow a = \frac{\sqrt[3]{3}-1}{2}$, $b = \frac{\sqrt[3]{3}+1}{2}$. 27. Fie X o soluție $\Rightarrow \det(X^3) = 0 \Rightarrow \det(X)^3 = 0 \Rightarrow$

$\det(X) = 0 \Rightarrow X^3 = \text{tr}^2(X)X \Rightarrow \text{tr}^2(X)X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}(\text{tr}^2(X)X) = 1 \Rightarrow \text{tr}^3(X) = 1 \Rightarrow$

$\text{tr}(X) = 1 \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$. 28. a) $A^2 = 3A \Rightarrow a = 3$. b) $A - A' = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

$(A - A')^2 = -I_2 \Rightarrow (A - A')^{2008} = I_2$. 29. Din teorema lui Cayley avem

$A^2 - 5A - 2I_2 = O_2 \Rightarrow A^2 - 5A - I_2 = I_2$. Determinantul este egal cu 1. 30. a) Da. b) Vom demonstra

prin inducție. Cazul $n=1$ este evident. Cum $A^2 - 3A + 2I_2 = O_2$ și $B^2 - 3B + 2I_2 = O_2$, prin scădere

obținem $A^2 - B^2 = 3(A - B) = (2^2 - 1)(A - B)$, deci cazul $n=2$ este adevărat. Presupunem că

afirmația este adevărată pentru $n-1$ și n . Din $A^{n+1} - 3A^n + 2A^{n-1} = O_2$ și $B^{n+1} - 3B^n + 2B^{n-1} = O_2$, rezultă

succesiv

$A^{n+1} - B^{n+1} = 3(A^n - B^n) - 2(A^{n-1} - B^{n-1}) =$

$$(3(2^n - 1) - 2(2^{n-1} - 1))(A - B) = (2^{n+1} - 1)(A - B).$$

31.

a)

deoarece

$$AA' = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(AA') = 81. \quad b) \text{ Calcul direct. } 32. \quad a)$$

$$\det(A'A) = \det A' \det A = (\det A)^2 \geq 0. \quad b) \text{ Prin calcul obținem } A \cdot A' = A' \cdot A \Rightarrow ac + bd = ab + cd, \text{ de}$$

$$\text{unde } \Leftrightarrow (a-d)(b-c) = 0 \quad 33. \quad a) \det(A) = -4. \quad b) A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ și } A^2 - A = 2I_3. \quad 34. \quad a)$$

$$\det(A) = 2. \quad b) A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ și } A^2 - A = 2I_3. \quad 35. \quad a) \text{ Calcul direct. } b) \text{ Folosind binomul lui}$$

$$\text{Newton rezultă } (A+B)^n = A^n + B^n. \quad 36. \quad a) A^4 = -4I_2. \quad b) \text{ Fie } B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}. \text{ Din } BE_1 = E_1B \text{ și}$$

$$BE_2 = E_2B \text{ rezultă } b=c=0 \text{ și } d=a, \text{ deci } B=aI_2. \quad 37. \quad a) \text{ Se arată prin calcul direct. } b) \text{ Se}$$

$$\text{demonstrează prin inducție. } c) A = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow A^{2008} = \begin{pmatrix} \cos 1004\pi & -\sin 1004\pi \\ \sin 1004\pi & \cos 1004\pi \end{pmatrix} = I_2. \quad 38.$$

$$\Delta_{22} = \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 16. \quad 39. \quad i((1+i)^2 - (1-i)^2) = 4i^2 = -4. \quad 40. \quad \begin{vmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -18. \quad 41.$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & x & x \\ x & x-3 & x \\ x & x & x-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-3 & x & x \\ x & x-3 & x \\ 3x-3 & 3x-3 & 3x-3 \end{vmatrix} = (3x-3) \begin{vmatrix} x-3 & x & x \\ x & x-3 & x \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3(x-1) \begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 27(x-1). \text{ Rezultă } x=1.$$

$$42. \quad a) V_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (c-b)(c-a)(b-a).$$

$$43. \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^3 & b^3-a^3 & c^3-a^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b^2+ba+a^2 & c^2+ca+a^2 \end{vmatrix} =$$

$$(c-b)(c-a)(b-a)(a+b+c). \quad \Delta_2 = (c-b)(c-a)(b-a)(ab+bc+ca).$$

$$44. \quad b) B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3+2a+3 & b^3+2b+3 & c^3+2c+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= A + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a & b & c \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = A. \quad c) \text{ Fie punctele } X(a, f(a)), Y(b, f(b)), Z(c, f(c)). \text{ Cum}$$

$$6) p^3 - p, \forall p \in \mathbb{Z}, B = \begin{vmatrix} a & b & c \\ f(a) & f(b) & f(c) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^3-a & b^3-b & c^3-c \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 6p_1 & 6p_2 & 6p_3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ p_1 & p_2 & p_3 \end{vmatrix} = 6k, k \in \mathbb{Z}. \text{ Cum } S_{xyz} = \frac{1}{2} |B| \Rightarrow S_{xyz} = 3|k|.$$

$$45. \quad a) \Delta = \begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ deci punctele sunt coliniare. } b) AC: \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 6 & 1 \\ -1 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -2x - y + 6 = 0. \quad 46.$$

$$a) AB: \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -x + y - 1 = 0. \quad b) \Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 1, \text{ aria este egală cu } \frac{1}{2}.$$

$$47. \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & a & 1 \end{vmatrix} = 2 + a; \quad S_{ABC} = \frac{1}{2} |\Delta| = 1 \Leftrightarrow |\Delta| = 2 \Leftrightarrow |a+2| = 2 \Leftrightarrow a+2 = \pm 2 \Leftrightarrow a = 0 \text{ sau } a$$

$$= -4. \quad 48. \quad \Delta = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ a & a+3 & 1 \end{vmatrix} = 3a + 7. \quad a) \text{ Punctele sunt coliniare } \Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{7}{3}. \text{ Cum } -\frac{7}{3} \notin \mathbb{Z},$$

$$\text{rezultă cerința. } b) \text{ Din } \frac{3a+7}{2} = 1, a \in \mathbb{Z} \text{ obținem } a = -3. \quad 49. \quad a) \Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad b) \text{ Prin calcul}$$

$$\text{sau observând că punctul } D \text{ este mijlocul segmentului } BC. \quad 50. \quad a) \text{ Cu notația } \sum x_k = x_1 + x_2 + x_3,$$

$$\text{prin calcul avem } \det(AA') = \begin{vmatrix} \sum a_i^2 & \sum a_i b_i \\ \sum a_i b_i & \sum b_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{i \neq j \in \{1,2,3\}} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq 0. \quad b) \text{ Din } \det(AA') = 0$$

$$\text{rezultă } a_i b_j = a_j b_i, i, j \in \{1,2,3\}, \text{ deci vectorii } \overrightarrow{OP_k} = a_k \vec{i} + b_k \vec{j}, k = 1,2,3 \text{ sunt coliniari. Concluzia}$$

Tema 2.2 Sisteme de ecuații liniare

$$1. A \text{ este inversabilă } \Leftrightarrow \det(A) \neq 0. \text{ Cum } \det(A) = -a + 3, \text{ avem } A \text{ inversabilă } \Leftrightarrow a \in \mathbb{R} - \{3\}.$$

$$2. \det(A) = 29 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inversabilă. } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*; \quad A^* = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{21} \\ \delta_{12} & \delta_{22} \end{pmatrix}; \quad \delta_{11} = 7; \quad \delta_{21} = -4 \Rightarrow$$

$$A^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}. \quad 3. \det(A) = -5 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inversabilă. } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*;$$

$$A^* = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{21} & \delta_{31} \\ \delta_{12} & \delta_{22} & \delta_{32} \\ \delta_{13} & \delta_{23} & \delta_{33} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \delta_{11} = 1; & \delta_{21} = -2; & \delta_{31} = 3 \\ \delta_{12} = -3; & \delta_{22} = 1; & \delta_{32} = -4 \\ \delta_{13} = 0; & \delta_{23} = 0; & \delta_{33} = -5 \end{matrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$4. \Rightarrow A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \Rightarrow \det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}, \text{ dar } \det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1 \Rightarrow \det(A) = \pm 1.$$

„ \Leftarrow ” dacă $\det(A) = \pm 1$, cum $A^{-1} = (\det(A))^{-1}A^* \Rightarrow A^{-1} = \pm A^*$. Pentru că $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \Rightarrow A^* \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, deci $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. **5.** $\det(A) = -1 \neq 0 \Rightarrow A$ inversabilă.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^*; A^* = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{21} & \delta_{31} \\ \delta_{12} & \delta_{22} & \delta_{32} \\ \delta_{13} & \delta_{23} & \delta_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} \delta_{11}=0; \delta_{21}=0; \delta_{31}=1 \\ \delta_{12}=1; \delta_{22}=0; \delta_{32}=0 \\ \delta_{13}=0; \delta_{23}=1; \delta_{33}=0 \end{matrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Alternativ,}$$

observăm că $A^3 = I_3$, deci $A^{-1} = A^2$. **6.** $\det(A) = m^2 + 5 > 0$, deci matricea este inversabilă.

$$\mathbf{7. a)} A^2 = \begin{pmatrix} 17 & 16 & 16 \\ 16 & 17 & 16 \\ 16 & 16 & 17 \end{pmatrix}, aA + bI_3 = \begin{pmatrix} 3a+b & 2a & 2a \\ 2a & 3a+b & 2a \\ 2a & 2a & 3a+b \end{pmatrix}. \text{ Pentru ca } A^2 = aA + bI_3 \text{ este necesar}$$

ca $\begin{cases} 3a+b=17 \\ 2a=16 \end{cases}$, de unde obținem $a=8 \Rightarrow b=-7$. **b)** $\det(A) = 7 \neq 0 \Rightarrow A$ inversabilă.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^* = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}. \text{ Alternativ, } A^2 - 8A = -7I_3, \text{ deci } A^{-1} = -\frac{1}{7}(A - 8I_3).$$

$$\mathbf{8. a)} \det(A) = 1 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inversabilă. } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{9. a)} \text{ Notăm:}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ și } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}. \text{ Observăm că } \det(A) = -1 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inversabilă} \Rightarrow \exists A^{-1}. \text{ Cum } A \cdot X = B,$$

rezultă (înmulțind această egalitate la stânga cu A^{-1}) că $X = A^{-1} \cdot B$. $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A^*$.

$$A^* = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{21} \\ \delta_{12} & \delta_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} \delta_{11}=5; \delta_{21}=-2 \\ \delta_{12}=-3; \delta_{22}=1 \end{matrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \text{ deci } X = \begin{pmatrix} -1 & 11 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}. \mathbf{b)} \text{ Notăm: } A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ și}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Cum } \det(A) = 1 \neq 0 \Rightarrow A \text{ inversabilă} \Rightarrow \exists A^{-1}. \text{ Cum } X \cdot A = B, \text{ rezultă (înmulțind}$$

această egalitate la dreapta cu A^{-1}) că $X = BA^{-1}$. Avem $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, deci $X = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -4 & 15 \end{pmatrix}$.

10. Deoarece $A^* = \det(A)A^{-1}$, ipoteza $A^{-1} = A^*$ impune $\det(A) = 1 \Leftrightarrow -m-3=1 \Leftrightarrow m=-4$. **11.** Cum $\det(A) = 1$, avem $A^{-1} = A^*$. Atunci $AA^* = A^*A = I_3$. Din definiție rezultă că inversa adjunței este matricea A . **12. a)** $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 13 & 1 \\ 2 & 9 & 0 \end{pmatrix}. \mathbf{b)}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 4 \\ -5 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}. \mathbf{13.} \text{ Notăm cu } A \text{ matricea sistemului,}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \\ 5 & -2 & 7 \end{pmatrix}. \text{ Avem } \det(A) = \Delta = -131 \neq 0, \text{ deci sistemul dat este Cramer. Avem soluție unică,}$$

pe care o determinăm cu ajutorul formulelor lui Cramer: $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$. Cum $\Delta_x = -131$, $\Delta_y = -131$, $\Delta_z = 0$, rezultă $x=1, y=1, z=0$. **14.** Notăm cu A matricea sistemului.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}. \text{ Avem } \det(A) = \Delta = 12 \neq 0, \text{ deci sistemul dat este Cramer. Soluția este dată de}$$

formulele $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$. Cum $\Delta_x = -60$, $\Delta_y = 60$, $\Delta_z = 36$, rezultă $x=-5, y=5, z=3$.

15. $(x, y, z) = (1, 1, 2)$. **16.** $(x, y, z) = (-1, 2, 0)$. **17.** $(x, y, z) = (2, 1, 2)$. **18.** $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. **19.**

Cum $\det(A) = 0$ și \exists un minor: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 2$. **20.** Rangul lui A este 2, pentru că

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 24 \neq 0, \text{ iar bordații lui } \Delta_p \text{ sunt nuli: } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0 \text{ și } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0. \mathbf{21.} \text{ Considerăm}$$

$$\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -8 \neq 0. \text{ Bordații lui } \Delta_p \text{ sunt: } \Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & a \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 8a - 32 \text{ și } \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & b \end{vmatrix} = 32 - 8b.$$

Pentru ca $\text{rang}(A) = 2$, trebuie ca $\Delta_1 = 0, \Delta_2 = 0 \Rightarrow a = 4, b = 4$. **22.** $\text{rang}(A) = 2$, deoarece

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \text{ și orice minor de ordin 3 este nul, având două coloane egale. } \mathbf{23.} \det(A) = -m + 2.$$

Este necesar ca $m = 2$. Este și suficient, deoarece $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$. **24.** Rangul matricei este cel puțin

$$2, \text{ deoarece } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0. \text{ Cum } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \text{ și } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & a \end{vmatrix} = -a + 44, \text{ rangul este 2 dacă}$$

$$a = 44 \text{ și 3 în caz contrar. } \mathbf{25.} \text{ Avem } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & a \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 5a - 15,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & b \end{vmatrix} = -5b + 20, \text{ deci rangul este 2 dacă } a=3, b=4 \text{ și 3 în caz contrar, i.e. } a \neq 3 \text{ sau } b \neq 4.$$

$$\mathbf{26.} \text{ Cum } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -52 \neq 0, \text{ rangul este egal cu 3. } \mathbf{27. a)} \text{ rang}(A) = 1, \text{ deoarece liniile matricei } A$$

sunt proporționale. **b)** Pentru $K = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ și $L = (a \ b \ c)$ avem $A = KL$.

$$c) A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + 2ab + 3ac & ab + 2b^2 + 3bc & ac + 2bc + 3c^2 \\ 2a^2 + 4ab + 6ac & 2ab + 4b^2 + 6bc & 2ac + 4bc + 6c^2 \\ 3a^2 + 6ab + 9ac & 3ab + 6b^2 + 9bc & 3ac + 6bc + 9c^2 \end{pmatrix} = (a + 2b + 3c)A, \text{ deci } d = a + 2b + 3c.$$

$$\text{Alternativ, } A^2 = K(LK)L = K(a + 2b + 3c)L = (a + 2b + 3c)KL = (a + 2b + 3c)A.$$

$$28. a) A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = O_3. b) I_3 + A + A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Cum } \det(I_3 + A + A') = 0 \text{ și toți minorii}$$

$$\text{de ordin 2 sunt nuli, rezultă că } \text{rang}(I_3 + A + A') = 1. c) I_3 + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \det(I_3 + A) = 1;$$

$$(I_3 + A)^{-1} = \frac{1}{\det(I_3 + A)} \cdot (I_3 + A)^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. 29. a) A^* = \begin{pmatrix} -6 & 2 & 2 \\ 6 & -2 & -2 \\ 6 & -2 & -2 \end{pmatrix}; \text{ cum } \det(A^*) = 0 \text{ și}$$

toți minorii de ordin 2 sunt nuli, rezultă $\text{rang}(A^*) = 1$.

$$b) \text{ Dacă } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C}), \text{ ecuația este echivalentă cu sistemul } \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 2y = 1 \\ x + 4y - 3z = 5 \end{cases}; \text{ considerând } A -$$

$$\text{matricea sistemului, } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix} \text{ avem că } \det(A) = 0 \text{ și cum } \exists \text{ un minor } \Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \Rightarrow$$

$\text{rang}(A) = 2$. De asemenea, $\text{rang}(\bar{A}) = 2$, deci sistemul este compatibil nedeterminat.

$$30. a) \det(A) = \begin{vmatrix} a & a+1 & a+2 \\ b & b+1 & b+2 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \begin{matrix} c_2 - c_1 \\ c_3 - a c_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & -a^2 + a + 2 \\ b & 1 & -ab + b + 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -ab + b + 2 + a^2 - a - 2 = a(a - 1) -$$

$$b(a - 1) = (a - 1)(a - b). b) \text{ Cum minorul } \begin{vmatrix} b & b+1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) \geq 2, \forall a, b \in \mathbb{R}. 31. a) AB = O_4; BA = O_4. \text{ Atunci } AB + BA = O_4. b) \text{ Cum } \det(A) = 0 \text{ și toți minorii de ordin 2 și 3 sunt nuli} \Rightarrow$$

$$\text{rang}(A) = 1. \text{ Raționând similar, rezultă } \text{rang}(B) = 1. A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \det(A + B) = 0, \text{ deci}$$

$$\text{rang}(A + B) \leq 3. \text{ Observăm că } \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \text{ deci } \text{rang}(A + B) \geq 2. \text{ Cum toți minorii de ordin 3}$$

$$\text{sunt nuli, rezultă că } \text{rang}(A + B) = 2. \text{ Deci } \text{rang}(A + B) = \text{rang}(A) + \text{rang}(B). c) (A + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^{n-k} B^k. \text{ Cum } AB = BA = O_4, \text{ atunci } (A + B)^n = A^n + B^n, \forall n \in \mathbb{N}^*. 32.$$

$$\text{Determinantul matricei extinse a sistemului este } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 6 \\ 3 & -4 & 0 \end{vmatrix} = 43 \neq 0, \text{ deci } \text{rang}(\bar{A}) = 3 > \text{rang}(A).$$

■ Conform teoremei lui Kronecker, sistemul este incompatibil. 33. Determinantul matricei A a

$$\text{sistemului este } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ a & 3 & 2 \\ a+1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0. \text{ Concluzia rezultă din teorema lui Cramer. 34. Determinantul}$$

$$\text{matricei } A \text{ a sistemului este } \begin{vmatrix} m & 1 & m \\ 1 & 1 & m \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = m^2 - 3m + 2. \text{ Sistemul este compatibil determinat pentru}$$

$$m \in \mathbb{R} - \{1, 2\}. \text{ Pentru } m = 1, \text{ sistemul este incompatibil, deoarece primele două ecuații sunt } x + y + z = 1 \text{ și } x + y + z = 3. \text{ Pentru } m = 2, \text{ sistemul este incompatibil, deoarece}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 12 \end{vmatrix} = 23 \neq 0, \text{ deci } \text{rang}(\bar{A}) = 3 > \text{rang}(A). \text{ În concluzie } m \in \{1, 2\}. 35. \text{ Determinantul}$$

$$\text{matricei } A \text{ a sistemului este } \begin{vmatrix} 3 & -4 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & m^2 \end{vmatrix} = -m^2 - 37 \neq 0, \forall m \in \mathbb{R}. \text{ Concluzia rezultă din teorema lui}$$

$$\text{Cramer. 36. Determinantul matricei } A \text{ a sistemului este } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \end{vmatrix} = a + 1. \text{ În plus, avem } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

$$\text{Este necesar ca rangul } \text{rang}(A) = 2, \text{ deci } a = -1. \text{ Sistemul este compatibil pentru}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & b+1 \\ 2 & 1 & b \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -b - 2 = 0 \Leftrightarrow b = -2. \text{ Așadar, } a = -1 \text{ și } b = -2. 37. \text{ Determinantul matricei } A \text{ a}$$

$$\text{sistemului este } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0. \text{ Rangul matricei } A \text{ este 2, deoarece } \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0. \text{ Sistemul este}$$

$$\text{compatibil, deoarece minorul caracteristic } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} \text{ este nul. 38. Determinantul matricei } A \text{ a}$$

$$\text{sistemului este } \begin{vmatrix} 2a & 1 & 1 \\ 1 & 2a & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -4(2a^2 + a - 1). \text{ Cum sistemul este omogen, rezultă } a \in \left\{-1, \frac{1}{2}\right\}. 39.$$

$$a) \text{ Înlocuind } x_0 = 2, y_0 = 2, z_0 = 1 \text{ în ecuațiile sistemului, obținem } n = 2 \text{ și } m = 3. b) \text{ Sistemul admite}$$

$$\text{soluție unică dacă determinantul matricei } A \text{ a sistemului este nenul; } \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ n & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 - n.$$

Rezultă că $n \in \mathbb{R} - \{3\}$. c) Dacă $n \in \mathbb{R} - \{3\}$, sistemul este compatibil determinat. Pentru $n = 3$ rezultă că rangul matricei sistemului este 2. Pentru ca sistemul să fie compatibil, rangul matricei extinse trebuie să fie 2. Obținem $m = 1$.

40. a) Fie A matricea sistemului. Avem $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & m & 2 \\ 1 & 2m-1 & 3 \\ 1 & m & m-3 \end{vmatrix} = (m-1)(m-5)$, deci sistemul este compatibil determinat dacă și numai dacă $m \in \mathbb{R} - \{1, 5\}$.

b) Pentru $m = 1$, sistemul devine: $\begin{cases} x+y+2z=1 \\ x+y+3z=1 \\ x+y-2z=1 \end{cases}$, atunci $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ și $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$.

Considerăm un minor $\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, deci $\text{rang}(A) = 2$. Pentru a determina $\text{rang}(\bar{A})$, calculăm

$\Delta_c = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$, deci $\text{rang}(\bar{A}) = 2$. Rezultă că sistemul este compatibil nedeterminat. Pentru $m =$

5, sistemul devine $\begin{cases} x+5y+2z=1 \\ x+9y+3z=1 \\ x+5y+2z=4 \end{cases}$. Din prima și ultima ecuație, rezultă că $1 = 4$, fals. În acest caz

sistemul este incompatibil. În concluzie, sistemul este compatibil nedeterminat pentru $m = 1$.

41. a) Înlocuind în sistem $z_0 = t_0 = 0$, obținem: $\begin{cases} 2x-3y=-1 \\ x+9y=3 \\ 5x-6y=p \end{cases}$. Sistemul $\begin{cases} 2x-3y=-1 \\ x+9y=3 \end{cases}$ are soluția

$x=0, y=\frac{1}{3}$, de unde $p=-2$. b) $\Delta_p = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 21 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) \geq 2$. Pentru ca sistemul să fie

compatibil nedeterminat trebuie ca $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 9 & m \\ 5 & -6 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -5 \\ 1 & 9 & 1 \\ 5 & -6 & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 9 & 3 \\ 5 & -6 & p \end{vmatrix} = 0$, adică

$6-3m=21(n+12)=21(p+2)=0$, deci $m=2, n=-12, p=-2$. 42. a) Fie A este matricea

sistemului. Avem $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -m \\ m & 1 & m \\ m & 3 & 3 \end{vmatrix} = 3(1-m^2)$. b) Pentru $m \neq \pm 1$, sistemul este compatibil,

conform teoremei lui Cramer. Dacă $m=1$, avem minorul $\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ și

$\Delta_c = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0$. Rezultă că sistemul este compatibil. Dacă $m=-1$, $\Delta_p = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$ și

$\Delta_c = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$, deci sistemul este incompatibil. În concluzie, sistemul este incompatibil

pentru $m=-1$. 43. a) Fie A matricea sistemului, atunci $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & m & m \end{vmatrix} = (m-1)^2$. b) Dacă

$m \neq 1$, $\text{rang}(A) = 3$. Dacă $m = 1$, $\text{rang}(A) = 1$. c) Dacă $m = 1$, iar $\text{rang}(\bar{A}) = 2$, deci sistemul este incompatibil. Dacă $m \neq 1$, sistemul este compatibil. Deci $m = 1$. 44. a) Înlocuind în sistem soluția $(1, 1, 1)$, obținem $a = 2, b = 0$. b) Pentru ca sistemul să fie compatibil nedeterminat, trebuie ca $\text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A}) < 3$ (unde A este matricea sistemului).

$\det(A) = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -a+4$; luând $\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ și $\Delta_c = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 6 \\ -1 & -2 & b \end{vmatrix} = b+2$, avem

$a=4$ și $b=-2$. c) Pentru $b=-2$, avem sistemul $\begin{cases} ax+y+z=4 \\ x+2y+3z=6 \\ 3x-y-2z=-2 \end{cases}$ care este compatibil pentru orice

$a \in \mathbb{Z}$ și pentru care $(0, 6, -2)$ este soluția cu toate componentele întregi.

45. a) Fie A matricea sistemului, atunci $\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a^2+1 > 0, \forall a \in \mathbb{R}$, deci $\det(A) \neq 0$,

ceea ce înseamnă că sistemul este Cramer, deci compatibil determinat.

b) Soluția sistemului se obține folosind formulele lui Cramer $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$, cum

$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & a \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = a, \Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a^2$, atunci $x = \frac{1}{a^2+1}, y = \frac{a}{a^2+1}, z = \frac{a^2}{a^2+1}$.

Avem: $y^2 = \frac{a^2}{(a^2+1)^2} = \frac{1}{a^2+1} \cdot \frac{a^2}{a^2+1} = x \cdot z$, deci x, y, z sunt în progresie geometrică.

46. a) Fie A matricea sistemului. Avem $\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 7 & -1 & a \end{vmatrix} = -5a+20$. Pentru ca sistemul să fie

compatibil determinat, trebuie ca $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow -5a+20 \neq 0 \Leftrightarrow a \in \mathbb{R} - \{4\}$. b) Dacă $\Delta \neq 0$, sistemul este compatibil. Dacă $\Delta = 0$, deci $a = 4$, un minor principal este $\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$. Sistemul este

incompatibil dacă și numai dacă $\Delta_c = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 7 & -1 & b \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow b \neq 4$. 47. a) Fie A matricea sistemului și Δ

$= \det(A)$. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & p & p^2 \\ 1 & q & q^2 \\ 1 & r & r^2 \end{vmatrix} \stackrel{L_2-L_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & p & p^2 \\ 0 & q-p & q^2-p^2 \\ 0 & r-p & r^2-p^2 \end{vmatrix} \stackrel{L_3-L_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & p & p^2 \\ 0 & q-p & q^2-p^2 \\ 0 & r-p & r^2-p^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} q-p & q^2-p^2 \\ r-p & r^2-p^2 \end{vmatrix} = (p-q)(q-r)(r-p)$.

b) Dacă $p, q, r \in \mathbb{C}$ sunt distincte, fiind soluții ale ecuației $t^3 - at^2 + bt - c = 0$, se obține:

$\begin{cases} c - pb + p^2a = p^3 \\ c - qb + q^2a = q^3 \\ c - rb + r^2a = r^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = c \\ y = -b \\ z = a \end{cases}$ este soluție a sistemului. Deoarece $\Delta \neq 0$, ea este unică. c)

Cum $(-1, 1, 1)$ este soluția sistemului, atunci $p^3 - p^2 - p + 1 = 0, q^3 - q^2 - q + 1 = 0$ și $r^3 - r^2 - r + 1 = 0$.

$= 0$, adică p, q, r verifică ecuația $r - r - r + 1 = 0 \Leftrightarrow (r-1)^3(r+1) = 0$ cu rădăcinile $r_1 = r_2 = 1$ și $r_3 = -1$. Deci, oricum le-am alege, două dintre numerele p, q, r vor fi egale cu 1.

48. a) Fie A matricea sistemului și $\Delta = \det(A)$. Atunci $\Delta = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 14m - 4$.

b) Sistemul fiind omogen, el are soluții nenule dacă $\Delta = 0 \Leftrightarrow 14m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{2}{7}$.

49. a) Fie A matricea sistemului și $\Delta = \det(A)$. Atunci $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & m \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -5m$. b) Sistemul fiind

omogen, el are soluții nenule dacă $\Delta = 0 \Leftrightarrow -5m = 0 \Leftrightarrow m = 0$. c) Dacă $m = 0$, sistemul devine

$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 3x - y = 0 \\ -x + 2y + z = 0 \end{cases}, \text{ deci orice soluție nenulă a sistemului este de forma: } x = \lambda, y = 3\lambda, z = -5\lambda. \text{ Atunci:}$$

$$\frac{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}{z_0^2 - y_0^2 - x_0^2} = \frac{35\lambda^2}{15\lambda^2} = \frac{7}{3}.$$

50. a) Fie A matricea sistemului și $\Delta = \det(A)$. Atunci

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix} \stackrel{L_2-L_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 0 & b-a & a-b \\ 0 & c-a & a-c \end{vmatrix} \stackrel{L_3-L_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 0 & b-a & a-b \\ 0 & c-a & a-c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & a-b \\ c-a & a-c \end{vmatrix} = 0.$$

b) Sistemul fiind omogen, el are soluții nenule dacă $\Delta = 0$, ceea ce am demonstrat la punctul anterior. c) Rangul matricei sistemului este egal cu 2; z este necunoscuta secundară, $z = \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$; rezultă $y = \lambda, x = -(a+b+c)\lambda$. Cum $(1, 1, 1)$ este soluția sistemului, avem că $a+b+c = -1$, deci soluțiile sistemului sunt $(\lambda, \lambda, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}$.

Tema 2.3 Structuri algebrice

1. a) Fie $x, y \in \mathbb{Z} \cap [5, \infty)$. Atunci $x \circ y \geq 5 + 5 - 5 = 5 \Rightarrow x \circ y \in \mathbb{Z} \cap [5, \infty)$. b) Fie $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Avem $(x \circ y) \circ z = (x + y - 5) \circ z = x + y + z - 10 = x \circ (y \circ z)$. 2. a) Fie $x, y, z \in \mathbb{R}$. Avem $(x \circ y) \circ z = \sqrt[3]{(x \circ y)^5 + z^5 - 1} = \sqrt[3]{x^5 + y^5 + z^5 - 2} = x \circ (y \circ z)$. b) Cum $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \sqrt[3]{x^5 + e^5 - 1} = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e^5 = 1 \Leftrightarrow e = 1 \in \mathbb{R}$, rezultă că 1 este elementul neutru. 3. a) Calcul direct. b) Trebuie demonstrat că oricare ar fi $x, y \in (-1, \infty)$ rezultă că $x * y \in (-1, \infty)$. Avem $x > -1, y > -1 \Rightarrow x + 1 > 0, y + 1 > 0$, deci $(x+1)(y+1) > 0$, obținem $xy + x + y + 1 > 0 \Rightarrow 3xy + 3x + 3y + 3 > 0$, deci $3xy + 3x + 3y + 2 > -1$. 4. a) Trebuie demonstrat că oricare ar fi $x, y \in (3, \infty)$, rezultă $x * y \in (3, \infty)$. Fie $x > 3, y > 3 \Rightarrow (x-3)(y-3) > 0$, deci $x * y = 2(x-3)(y-3) + 3 > 3$. b) Fie $x, y, z \in \mathbb{R}$. Avem $(x * y) * z = 2(x * y - 3)(z - 3) + 3 = 2(x-3)(y-3)(z-3) + 3 = x * (y * z)$, deci „ $*$ ” este asociativă. c) Căutăm $e \in \mathbb{R}$ astfel încât $x * e = e * x = x, \forall x \in \mathbb{R}$, adică $(2e-7)(x-3) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Obținem $e = 7/2$. 5. a) Avem $x \circ y = \frac{1}{2}(x+2)(y+2) - 2$. Fie $x, y \in \mathbb{Q}, x, y \geq -2$. Cum $x+2 \geq 0, y+2 \geq 0 \Rightarrow x \circ y \geq -2$. b) Cum $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \frac{1}{2}(x+2)(e+2) - 2 = x, \forall x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow (x+2)(e+2) = 2(x+2), \forall x \in \mathbb{Q} \Rightarrow e = 0$

rezultă că

$x \circ x' = x' \circ x = 0 \Leftrightarrow (x+2)(x'+2) = 4$. Dacă $x \neq -2 \Rightarrow x' = \frac{4}{x+2} - 2 \in \mathbb{Q}$, deci toate elementele din $\mathbb{Q} - \{-2\}$ sunt simetrizabile. Dacă $x = -2$, ecuația $0(x'+2) = 4$ nu are soluții, deci -2 nu este simetrizabil. 6. a) Fie $x, y, z \in \mathbb{R}$. Avem $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z), \forall x, y, z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (xy - 6x - 6y + a) \circ z = x \circ (yz - 6y - 6z + a), \forall x, y, z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a-42)(z-x) = 0, \forall x, y, z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a = 42$. b) Deoarece $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow xe - 6x - 6e + a = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x(e-7) + 6e + a = 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e = 7$ și $a - 6e = 0 \Leftrightarrow a = 42$. 7. a) Avem $x \circ y = (x+5)(y+5) + a - 25$. Avem $x \circ y \neq -5, \forall x, y \in \mathbb{Z} - \{-5\} \Leftrightarrow (x+5)(y+5) \neq 20 - a, \forall x, y \in \mathbb{Z} - \{-5\} \Leftrightarrow a = 20$. b) Deoarece $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow xe + 5x + 5e + a = x, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x(e+4) + 5e + a = 0, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow e = -4$ și $a = 20$. 8. a) Fie $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Avem $x \circ y = 5(x+6/5)(y+6/5) - 6/5$, deci $(x \circ y) \circ z = 25(x+6/5)(y+6/5)(z+6/5) - 6/5 = x \circ (y \circ z), \forall x, y, z \in \mathbb{Z}$. b) Legea are element neutru dacă există $e \in \mathbb{Z}$ astfel încât $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in \mathbb{Z}$, ceea ce revine la $x(5e+5) + 6e + a = 0, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow e = -1, a = 6$. De aici rezultă că pentru $a \in \mathbb{Z} - \{6\}$ legea nu are element neutru. 9. a) Legea are element neutru dacă există $e \in (0, 2)$ astfel încât $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in (0, 2) \Leftrightarrow (e-1)x^2 + (2-2e)x = 0, \forall x \in (0, 2) \Leftrightarrow e = 1 \in (0, 2)$. b) $x \in (0, 2)$ este simetrizabil dacă și numai dacă există $x' \in (0, 2)$ cu $x \circ x' = x' \circ x = 1 \Leftrightarrow xx' = 2 - x - x' + xx' \Leftrightarrow x' = 2 - x \in (0, 2)$, deci toate elementele din $(0, 2)$ sunt simetrizabile. 10. a) Avem $x \circ y = x^{\log_{27} y}$. Legea are element neutru dacă există $e \in (0, \infty)$ astfel încât $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in (0, \infty) \Leftrightarrow x^{\log_{27} e} = e^{\log_{27} x} = x, \forall x \in (0, \infty) \Leftrightarrow e = 27 \in (0, \infty)$. b) $x \in (0, \infty)$ este simetrizabil dacă și numai dacă există $x' \in (0, \infty)$ cu $x \circ x' = x' \circ x = 27 \Leftrightarrow (x')^{\log_{27} x} = 27$. Dacă $x \neq 1$, atunci $x' = 27^{\log_{27} x} > 0$. Dacă $x = 1$, ecuația $(x')^0 = 27$ nu are soluții, deci mulțimea elementelor simetrizabile este $(0, \infty) - \{1\}$. 11. a) Cum $x \circ 2 = 2 \circ x = x, \forall x \in \mathbb{Z}$ rezultă cerința. b) $x \in \mathbb{Z}$ este simetrizabil dacă și numai dacă există $x' \in \mathbb{Z}$ cu $x \circ x' = x' \circ x = 2 \Leftrightarrow x' = \frac{7x-16}{3x-7} \Rightarrow 3x' = 7 + \frac{1}{3x-7}$. Atunci $3x' \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 3x-7 \in \{-1, 1\} \Leftrightarrow x = 2$, deci singurul element simetrizabil este 2. 12. a) Dacă $A, B \in G \Rightarrow AA' = BB' = I_2 \Rightarrow (AB)(AB)' = ABB'A' = AI_2A' = AA' = I_2 \Rightarrow AB \in G$, deci G este parte stabilă a lui $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ în raport cu înmulțirea matricelor. b) Cum am demonstrat a), rămâne să verificăm în continuare axiomele grupului: G_1 Operația „ \circ ” este asociativă. G_2 Operația „ \circ ” are elementul neutru $I_2 \in G$. G_3 Orice element din G este simetrizabil față de „ \circ ”. Dacă $A \in G$ este simetrizabil $\exists A^{-1} \in G_1$ astfel încât $A A^{-1} = A^{-1} A = I_2$. Avem $A \in G \Rightarrow A \cdot A' = I_2 \Rightarrow A^{-1} = A'$ în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Verificăm $A' \in G$. Rezultă din $A'(A')' = A'A = I_2$. Așadar orice element din G este simetrizabil față de „ \circ ”. 13. a) Cum $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ și $\sigma^4 = e$, deci G conține 4 elemente. Avem: $G = \{e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\}$ (e fiind permutarea identică).

	e	σ	σ^2	σ^3
e	e	σ	σ^2	σ^3
σ	σ	σ^2	σ^3	e
σ^2	σ^2	σ^3	e	σ
σ^3	σ^3	e	σ	σ^2

c) Cum operația „ \cdot ” este compunerea permutărilor, verificăm în continuare axiomele grupului. G_1 : Operația „ \cdot ” este asociativă, ceea ce este evident. G_2 : Operația „ \cdot ” are element neutru care este e . G_3 : Orice element din G este simetrizabil față de „ \cdot ”, ceea ce rezultă din tabla înmulțirii permutărilor pe G .

14. a) Trebuie demonstrat că oricare ar fi $A, B \in M$ rezultă că $AB \in G$. Fie $A = \begin{pmatrix} a_1 & 3b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}$, $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$

și $B = \begin{pmatrix} a_2 & 3b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix}$, $a_2, b_2 \in \mathbb{Z}$. Cum $AB = \begin{pmatrix} a_1a_2 + 3b_1b_2 & 3(a_1b_2 + a_2b_1) \\ a_1b_2 + a_2b_1 & a_1a_2 + 3b_1b_2 \end{pmatrix}$ și $a_1a_2 + 3b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1$

$\in \mathbb{Z}$, rezultă că M este parte stabilă a lui $M_2(\mathbb{Z})$ în raport cu înmulțirea matricelor. b) Fie $a \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \equiv 0, 1$ sau $2 \pmod{3}$. Pe rând, $a^2 + 1 \equiv 0^2 + 1 \equiv 1 \pmod{3}$ sau $a^2 + 1 \equiv 1^2 + 1 \equiv 2 \pmod{3}$ sau $a^2 + 1 \equiv 2^2 + 1 \equiv 2 \pmod{3}$ deci $a^2 + 1 \not\equiv 0 \pmod{3}$. c) Presupunem prin absurd că $\det(A) = -1 \Leftrightarrow a^2 - 3b^2 = -1 \Leftrightarrow a^2 + 1 = 3b^2$, fals din b). d) Dacă $A \in M$ și $A^{-1} \in M \Rightarrow \det(A) \in \mathbb{Z}$, $\det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}$. Cum $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det I_2 = 1 \Rightarrow \det(A), \det(A^{-1}) \in \{-1, 1\}$. Din c) rezultă că $\det(A) = 1$.

15. Pentru orice $x, y, z \in \mathbb{R}$ avem $(x * (y * z)) = x + y + z + xy + xz + yz + xyz = (x * y) * z$, deci „ $*$ ” este asociativă. b) Se arată prin inducție că $x_1 * x_2 * \dots * x_n = (x_1 + 1)(x_2 + 1) \dots (x_n + 1) - 1$, de unde

$$1 * \frac{1}{2} * \dots * \frac{1}{2008} = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \dots \cdot \frac{2009}{2008} - 1 = 2008. \quad 16. a) \text{ Cum } (x \circ y) \circ z = \frac{xy}{x+y} \circ z = \frac{xyz}{xy+xz+yz} \text{ și}$$

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)^{-1} = \frac{xyz}{xy+xz+yz}, \text{ rezultă că } (x \circ y) \circ z = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)^{-1}, \text{ oricare ar fi } x, y, z \in (0, \infty). \quad b)$$

$$\text{Pentru orice } x, y, z \in (0, \infty), \text{ avem } (x \circ y) \circ z = \frac{xyz}{xy+xz+yz}, \text{ iar } x \circ (y \circ z) = x \circ \frac{yz}{y+z} = \frac{xyz}{xy+xz+yz},$$

$$\text{adică „}\circ\text{” este asociativă. c) Folosind faptul că „}\circ\text{” este asociativă și aplicând a) avem}$$

$$\frac{1}{2} \circ \frac{1}{3} \circ \frac{1}{4} \circ \dots \circ \frac{1}{100} = \left(\frac{1}{2} \circ \frac{1}{3} \circ \frac{1}{4}\right) \circ \frac{1}{5} \circ \frac{1}{6} \circ \dots \circ \frac{1}{100} = (2+3+4)^{-1} \circ \frac{1}{5} \circ \frac{1}{6} \circ \dots \circ \frac{1}{100} =$$

$$\left(\frac{1}{2+3+4} \circ \frac{1}{5} \circ \frac{1}{6}\right) \circ \frac{1}{7} \circ \frac{1}{8} \circ \dots \circ \frac{1}{100} = (2+3+4+5+6)^{-1} \circ \frac{1}{7} \circ \frac{1}{8} \circ \dots \circ \frac{1}{100} =$$

$$\left(\frac{1}{2+3+4+5+6} \circ \frac{1}{7} \circ \frac{1}{8}\right) \circ \dots \circ \frac{1}{100} = (2+3+4+\dots+100)^{-1} = \left(\frac{102 \cdot 99}{2}\right)^{-1} = \frac{1}{5049}. \quad \text{Alternativ,}$$

$$\text{demonstrăm prin inducție } x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n = \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)^{-1}. \text{ Pentru } x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{1}{3}, \dots, x_n = \frac{1}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \circ \frac{1}{3} \circ \dots \circ \frac{1}{100} = (2+3+\dots+100)^{-1} = \frac{1}{5049}.$$

17. a) Trebuie demonstrat că oricare ar fi $f_{a_1b_1}, f_{a_2b_2} \in G$, rezultă $f_{a_1b_1} \circ f_{a_2b_2} \in G$. Cum $f_{a_1b_1} \circ f_{a_2b_2} = f_{a_1a_2, a_1b_2+b_1} \in G$ (deoarece $a_1a_2 \neq 0$ pentru $a_1 \neq 0$ și $a_2 \neq 0$), obținem ceea ce trebuie arătat. b) Cum am demonstrat a) rămâne să verificăm în continuare axiomele grupului:

1°. Compunerea funcțiilor este operație asociativă. 2°. $\exists f_{1,0} \in G, f_{1,0}(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$ astfel încât $f_{1,0} \circ$

$f_{a,b} = f_{a,b} \circ f_{1,0} = f_{a,b}, \forall f_{a,b} \in G$, deci $f_{1,0}$ este element neutru. 3°. $\forall f_{a,b} \in G, \exists f_{\frac{1}{a}, \frac{1}{b}}$ astfel încât

$f_{a,b} \circ f_{\frac{1}{a}, \frac{1}{b}} = f_{\frac{1}{a}, \frac{1}{b}} \circ f_{a,b} = f_{1,0}$, deci orice element este simetrizabil. 18. a) Din $x * y = 1$ rezultă că

$x^{\log_3 y} = 1$, de unde logaritmand în baza 3 avem $\log_3 y \cdot \log_3 x = 0$, deci $x = 1$ sau $y = 1$. b) Vom

verifica axiomele grupului: G_0 : Trebuie demonstrat că $\forall x, y \in H \Rightarrow x * y \in H$. Avem $x * y = x^{\log_3 y}$ și cum $x \in H \Rightarrow x * y > 0$; presupunem prin absurd $x * y = 1 \Rightarrow x^{\log_3 y} = 1 \Rightarrow x = 1$ sau $y = 1$, absurd, deoarece $x, y \in H$. Deci $x * y \in H$.

G_1 : Operația „ $*$ ” este asociativă. Pentru orice $x, y, z \in H$ avem $(x * y) * z =$

$$(x^{\log_3 y}) * z = x^{\log_3 y \cdot \log_3 z}, \text{ iar } x * (y * z) = x * y^{\log_3 z} = x^{\log_3 z \cdot \log_3 y}, \text{ adică „}\ast\text{” este asociativă.}$$

G_2 : Operația „ $*$ ” are element neutru. Căutăm $e \in H$ astfel încât $x * e = e * x = x, \forall x \in H$, adică $x^{\log_3 e} = x, \forall x \in H$, deci $\log_3 e = 1 \Rightarrow e = 3 \in H$ este element neutru.

G_3 : Orice element din H este simetrizabil față de „ $*$ ”. $x \in H$ este simetrizabil dacă și numai dacă $\exists x'$

$$\in H \text{ astfel încât } x * x' = x' * x = 3. \text{ Avem } x^{\log_3 x'} = 3 \Rightarrow \log_3 x' \cdot \log_3 x = 1 \Rightarrow x' = 3^{\frac{1}{\log_3 x}}; \text{ cum}$$

$$3^{\frac{1}{\log_3 x}} \in (0, \infty) \setminus \{1\} \text{ rezultă că orice element din } H \text{ este simetrizabil.}$$

În concluzie, H este grup în raport cu operația „ $*$ ”.

$$19. a) \text{ Notăm } U(a) = \begin{pmatrix} 1 & \ln a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}. U(a)U(b) = \begin{pmatrix} 1 & \ln a + \ln b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & ab \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \ln(ab) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & ab \end{pmatrix} = U(ab).$$

Cum $ab > 0$, rezultă cerința. b) Înmulțirea matricelor este asociativă. Elementul neutru este

$$I_3 = U(1) \in G, \text{ iar } U(a)^{-1} = U\left(\frac{1}{a}\right) \in G, \frac{1}{a} > 0. \text{ În concluzie, } (G, \cdot) \text{ este grup.}$$

20. a) Calcul direct. b) Vom verifica axiomele grupului: G_0 : Trebuie demonstrat că oricare ar fi $A(x), A(y) \in G$, rezultă că $A(x) \cdot A(y) \in G$. Arătând deja punctul a), avem $A(x) \cdot A(y) = A(x+y)$ și cum $x, y \in \mathbb{R}$, deci $x+y \in \mathbb{R} \Rightarrow A(x) \cdot A(y) \in G$; G_1 : Înmulțirea matricelor este asociativă; G_2 : Existența elementului neutru, observăm că $I_2 = A(0) \in G$, deci elementul neutru este chiar I_2 ; G_3 : Orice element din G este simetrizabil față de înmulțirea matricelor. Dacă $A(x) \in G$ este simetrizabil, $\exists A(x')$ $\in G$ astfel încât $A(x) \cdot A(x') = A(x') \cdot A(x) = I_2$.

$$\text{Avem } A(x) \cdot A(x') = I_2 \Rightarrow A(x+x') = I_2 \Rightarrow x+x' = 0 \Rightarrow x' = -x, \text{ deci } A(x') = \begin{pmatrix} 1-2x & -4x \\ x & 1+2x \end{pmatrix} \text{ și cum}$$

$$x' \in \mathbb{R}, \text{ obținem } A(x') \in G \text{ și orice element din } G \text{ este simetrizabil. c) Observăm că } \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = A(1).$$

$$\text{Atunci } \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^n = (A(1))^n = A(n). \quad 21. a) \text{ Observând că } x * y = (x-5)(y-5) + 5, \text{ din}$$

$$x * e = e * x = x, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ avem } (x-5)(e-5) + 5 = x, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ adică } (x-5)(e-6) = 0, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ deci}$$

$$e = 6. b) \text{ Din } x * \alpha = \alpha * x = \alpha, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ avem } (x-5)(\alpha-5) + 5 = \alpha, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ adică } (x-6)(\alpha-5) =$$

$$0, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ deci } \alpha = 5. c) \text{ Trebuie demonstrat că oricare ar fi } x, y \in G, \text{ rezultă că } x * y \in G. \text{ Avem } x >$$

$$0, y > 5 \Rightarrow x-5 > 0, y-5 = 0 \text{ deci } (x-5)(y-5) > 0. \text{ Obținem } xy - 5x - 5y + 25 > 0 \Rightarrow xy - 5x - 5y + 30 > 5, \text{ deci } G \text{ este parte stabilă a lui } \mathbb{R} \text{ în raport cu legea „}\ast\text{”. d) Cum am demonstrat c), rămâne să}$$

$$\text{verificăm în continuare axiomele grupului abelian: } G_1: \text{ Operația „}\ast\text{” este asociativă. Pentru orice } x, y, z \in G, \text{ avem } (x * y) * z = (x-5)(y-5)(z-5) + 5 = x * (y * z), \text{ deci „}\ast\text{” este asociativă. } G_2: \text{ Elementul}$$

neutru al operației „ \ast ” este 6. G_3 : Orice element din G este simetrizabil față de „ \ast ”. Fie $x \in G$. Căutăm $x' \in G$ astfel încât $x \ast x' = x' \ast x = 6$. Avem $(x-5)(x'-5) + 5 = 6 \Leftrightarrow x' = 5 + \frac{1}{x-5} \in (5, \infty)$. G_4 : Operația „ \ast ” este comutativă. Pentru $x, y \in G$ arbitrare, avem $x \ast y = (x-5)(y-5) + 5 = y \ast x$, deci operația „ \ast ” este comutativă. În concluzie, (G, \ast) este grup abelian. $e) 1 \ast 2 \ast 3 \ast \dots \ast 2012 = (1 \ast 2 \ast 3 \ast 4) \ast 5 \ast (6 \ast 7 \ast \dots \ast 2012) = 5$, deoarece $x \ast 5 = 5 \ast x = 5, \forall x \in \mathbb{R}$. $f)$ Inducție după n . **22. a)** $(x \ast y) \ast z = x \ast (y \ast z) \Leftrightarrow (a-5)(z-x) = 0, \forall x, y, z \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow a = 5$. **b)** Cum $e \circ x = x \circ e = x, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x(6e+5) + 6e + a = 0, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow a = 5, e = -\frac{5}{6} \notin \mathbb{Z}$, deci legea nu are element neutru. **c)** $((-1) \ast 2) \ast ((-1) \ast 2013) = a \Leftrightarrow (a-6)^2 + 2(a-6) = 0 \Leftrightarrow a \in \{4, 6\}$. **d)** Avem $x \ast y = 6(x+1)(y+1) - 1$. Prin inducție rezultă că $x_1 \ast x_2 \ast \dots \ast x_n = 6^{n-1}(x_1+1)(x_2+1)\dots(x_n+1) - 1$. Obținem $1 \ast 2 \ast 3 \ast \dots \ast 2013 = 6^{2012} \cdot 2014! - 1$. **e)** Avem $x \ast p = p, \forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 6(x+1)(p+1) - 1 = p + 1 \Leftrightarrow p = -1$. **f)** Avem $x \ast x \ast x = 287 \Leftrightarrow 36(x+1)^3 - 1 = 287 \Leftrightarrow x = 1$. **23. a)** $(1 \ast 2) \ast 3 = 1 \ast (2 \ast 3) \Leftrightarrow a = -3$. **b)** Dacă legea este asociativă, rezultă din punctul anterior că $a = -3$. Pentru $a = -3$ avem $x \ast y = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(y - \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2} \Rightarrow (x \ast y) \ast z = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(y - \frac{3}{2}\right)\left(z - \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2} = x \ast (y \ast z), \forall x, y, z \in \mathbb{R}$. **c)** Legea are element neutru $\Leftrightarrow \exists e \in \mathbb{R}, x \ast e = e \ast x = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x(-2e+2) + 3e + a = 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e = 1, a = -3$. **d)** Dacă $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$ este parte stabilă, atunci $\frac{3}{2} \ast \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2}$, de unde $a \leq -3$. Reciproc, dacă $a \leq -3$, atunci pentru $x, y \leq \frac{3}{2}$ rezultă $x \ast y = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(y - \frac{3}{2}\right) + a + \frac{9}{2} \leq a + \frac{9}{2} \leq \frac{3}{2}$. În concluzie, $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$ este parte stabilă dacă și numai dacă $a \leq -3$. **e)** Fie $G = \left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$. Avem $x \ast y = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(y - \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2}$. Ca la punctul anterior, rezultă că G este parte stabilă. Legea este asociativă și are element neutru. Fie $x \in G$. Cum $x \circ x' = x' \circ x = 1 \Leftrightarrow \left(x + \frac{3}{2}\right)\left(x' + \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x' = \frac{3}{2} - \frac{1}{2(2x+3)} < \frac{3}{2}$, deci toate elementele sunt simetrizabile. **f)** Prin inducție se arată că $x_1 \ast x_2 \ast \dots \ast x_n = (-2)^{n-1} \prod_{i=1,2,\dots,n} \left(x_i - \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2}$, deci $1 \ast 2 \ast 3 \ast \dots \ast 2013 = \frac{3-1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 4023}{2}$. **24. a)** $1 \ast 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{9+a} = 0 \Leftrightarrow a = -9$. **b)** Avem $(x \ast y) \ast z = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + z^3 + 2a} = x \ast (y \ast z), \forall x, y, z \in \mathbb{R}$. **c)** Legea are element neutru $\Leftrightarrow \exists e \in \mathbb{R}, x \ast e = e \ast x = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \sqrt[3]{x^3 + e^3} = a = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e = -\sqrt[3]{a}$. **d)** Legea este asociativă și are element neutru. Fie $x \in \mathbb{R}$. Atunci $x \circ x' = x' \circ x = e \Leftrightarrow \sqrt[3]{x^3 + x'^3 + 2} = -\sqrt[3]{2} \Leftrightarrow x' = -\sqrt[3]{4+x^3} \in \mathbb{R}$, deci toate elementele sunt simetrizabile. **e)** Prin inducție după n se demonstrează că $x_1 \ast x_2 \ast \dots \ast x_n = \sqrt[3]{\sum_{k=1}^n x_k^3 + (n-1)a}$, deci $(-1) \ast 0 \ast 1 \ast 2 \ast 3 \ast 4 = \sqrt[3]{114}$. **f)** Avem $x \ast x \ast x \ast x \ast x = \sqrt[3]{5x^3 + 16} \Rightarrow 5x^3 + 16 = 1 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{3}$.

25. a) $f(x) \ast f(y) = f(x) + f(y) + 7 = x + y - 7 = f(x+y), \forall x, y \in \mathbb{R}$, deci f este morfism. Cum f este funcție de grad 1, rezultă că f este bijectivă, deci izomorfism. **b)** $1 \ast 2 \ast 3 \ast \dots \ast 10 = f(8) \ast f(9) \ast f(10) \ast \dots \ast f(17) = f(8+9+\dots+17) = f(125) = 118$. **26. a)** $f(x) \ast f(y) = f(x+y), \forall x, y \in \mathbb{R} \Leftrightarrow ax+b+ay+b+3 = a(x+y)+b, \forall x, y \in \mathbb{R} \Leftrightarrow b = -3$, deci f este morfism dacă și numai dacă $a \in \mathbb{R}$ și $b = -3$. **b)** Alegem $a = 1, f(x) = x - 3$. Deoarece f este funcție de grad 1, rezultă că f este bijectivă, deci izomorfism. Atunci $x_1 \circ x_2 \circ \dots \circ x_n = f(x_1) \circ f(x_2) \circ \dots \circ f(x_n) = f(x_1 + x_2 + \dots + x_n + 3n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n + 3(n-1)$. **27. a)** $f(x \circ y) = f(x+y-1) = e^{x-1}e^{y-1} = f(x)f(y)$, deci f este morfism. Cum f este bijectivă, rezultă că funcția f este izomorfism. **b)** $x \circ x \circ x \circ x = 5 \Leftrightarrow f(x \circ x \circ x \circ x) = f(5) \Leftrightarrow f(x)^4 = f(5) \Leftrightarrow e^{4x-4} = e^4 \Leftrightarrow x = 2$. **28. a)** Avem $x \circ y = (x+1)(y+1) - 1$. Pentru $x, y \in \mathbb{R}^*$ rezultă că $f(x) \circ f(y) = (f(x)+1)(f(y)+1) - 1 = xy - 1 = f(xy)$, deci f este morfism. Cum f este bijectivă, rezultă că f este izomorfism. **b)** $x \circ x \circ x \circ x \circ x = (x+1)^5 - 1 \Rightarrow (x+1)^5 = 2 \Rightarrow x = \sqrt[5]{2} - 1$. **29. a)** Legea „ \circ ” are elementul neutru $e = 3$, iar legea „ \ast ” are elementul neutru $p = 2$. **b)** Dacă f este morfism, atunci $f(e) = p \Rightarrow a = -1$. Pentru $a = -1$ se verifică ușor că f este morfism. **30. a)** Trebuie să demonstrăm că $f(x+y) = f(x)f(y)$, adică $7^{x+y} = 7^x 7^y$, ceea ce este adevărat, deci f morfism de grupuri. **b)** Pentru ca $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}^*$ să fie izomorfism, știind că f morfism (din a), este necesar ca f să fie bijectivă. Cum pentru $y = -1$, nu există $x \in \mathbb{Z}$ astfel încât $7^x = y \Rightarrow f$ nu este surjectivă, deci f nu este bijectivă, ceea ce înseamnă că f nu este izomorfism. **31. a)** Trebuie demonstrat că $\forall x, y \in G \Rightarrow x \ast y \in F$. Avem $x > 4, y > 4$, deci $x-4 > 0, y-4 > 0$; obținem $(x-4)(y-4) > 0$, de unde rezultă $xy - 4x - 4y + 16 > 0$, deci $xy - 4x - 4y + 20 > 4$, adică $x \ast y \in (4, \infty)$. **b)** Cum am demonstrat a), rămâne să verificăm în continuare axiomele grupului: G_1 : Operația „ \ast ” este asociativă. Observând că $x \ast y = (x-4)(y-4) + 4$, avem pentru $\forall x, y, z \in G, (x \ast y) \ast z = [(x-4)(y-4) + 4] \ast z = (x-4)(y-4)(z-4) + 4$, iar $x \ast (y \ast z) = x \ast [(y-4)(z-4) + 4] = (x-4)(y-4)(z-4) + 4$, deci $(x \ast y) \ast z = x \ast (y \ast z)$, adică „ \ast ” este asociativă. G_2 : Căutăm $e \in G$ astfel încât $x \ast e = e \ast x = x, \forall x \in G$, adică $(x-4)(e-4) + 4 = x, \forall x \in G$, adică $(x-4)(e-5) = 0, \forall x \in G$, deci $e = 5 \in G$ este elementul neutru. G_3 : Orice element din G este simetrizabil față de „ \ast ”. Dacă $x \in G$ este simetrizabil, $\exists x' \in G$, astfel încât $x \ast x' = x' \ast x = 5$, adică $(x-4)(x'-4) + 4 = 5$, deci $x'-4 = \frac{1}{x-4}$, de unde rezultă $x' = 4 + \frac{1}{x-4}$. Cum $x' \in (4, +\infty) \Rightarrow$ orice element din G este simetrizabil față de G . **c)** $f: (0, \infty) \rightarrow (4, \infty), f(x) = x+4$ este morfism de la grupul $((0, \infty), \cdot)$ la grupul (G, \ast) , deoarece $f(x \cdot y) = f(x) \ast f(y)$ (pentru că $f(xy) = xy+4$ iar $f(x) \ast f(y) = (x+4) \ast (y+4) = xy+4$, deci $f(xy) = f(x) \ast f(y)$) și de asemenea, f bijectivă de unde rezultă f izomorfism. **32. a)** Prin calcul se verifică ușor că $f(xy) = f(x) \ast f(y), \forall x, y \in (0, \infty)$, deci f este morfism. Inversa funcției f este $g: (-2, 2) \rightarrow (0, \infty), g(x) = \frac{2+x}{2-x}$, deci f este izomorfism. **b)** Fie $u \in (0, \infty)$ cu $f(u) = x$. Atunci $x \ast x \ast x = 1 \Leftrightarrow f(u) \ast f(u) \ast f(u) = f(3) \Leftrightarrow f(u^3) = f(3) \Leftrightarrow u = \sqrt[3]{3}$, deci $x = f(\sqrt[3]{3})$.

$$33. a) A(x)A(y) = \begin{pmatrix} 1 & x+y & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^{x+y} \end{pmatrix} = A(x+y), x+y \in \mathbb{R}.$$

b) Înmulțirea matricelor pătrate de ordinul 3 este asociativă. $I_3 = A(0) \in G$ este elementul neutru. Fie $A(x) \in G$. Cum $A(x)A(-x) = A(x-x) = A(0) \Rightarrow$ orice element din G este simetrizabil. În concluzie, (G, \cdot) este grup. c) Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow G, f(x) = A(x)$ este morfism de la grupul $(\mathbb{R}, +)$ la grupul (G, \cdot) , deoarece $f(x+y) = A(x+y) = A(x)A(y)$. De asemenea, f injectivă pentru că dacă $f(x) = f(y) \Rightarrow A(x) = A(y) \Rightarrow x = y$ și f surjectivă pentru că orice element din G este de forma $A(x) = f(x)$, deci aparține imaginii lui f . Am obținut f bijectivă, deci f izomorfism.

34. a) Calcul direct. b) Cum am demonstrat a), rămâne să verificăm în continuare axiomele grupului: G_1 : Înmulțirea matricelor este asociativă. G_2 : Existența elementului neutru; observăm că $I_2 = A(0) \in G$, deci elementul neutru este chiar I_2 . G_3 : Orice element din G este simetrizabil față de înmulțirea matricelor pătrate de ordinul 2. $A(x) \in G$ este simetrizabil, $\exists A(x') \in G$ astfel încât $A(x) \cdot A(x') = A(x') \cdot A(x) = I_2$. Avem $A(x)A(x') = A(2xx' + x + x') = A(0) \Rightarrow 2xx' + x + x' = 0 \Rightarrow x' = \frac{-x}{2x+1}$ (dacă,

prin absurd, $x' = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{-x}{2x+1} = -\frac{1}{2} \Rightarrow 0 = 1$, fals, deci $x' \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$. Am obținut $A(x') \in G$, deci orice element din G este simetrizabil. În concluzie, (G, \cdot) este grup. c) Deoarece $f(x)f(y) =$

$$= A\left(\frac{xy-1}{2}\right)A\left(\frac{y-1}{2}\right) = A\left(2 \cdot \frac{(x-1)(y-1)}{4} + \frac{x-1}{2} + \frac{y-1}{2}\right) = A\left(\frac{xy-1}{2}\right) = f(xy), f \text{ este morfism de}$$

grupuri. Funcția f este injectivă pentru că $f(x) = f(y) \Leftrightarrow A\left(\frac{x-1}{2}\right) = A\left(\frac{y-1}{2}\right) \Leftrightarrow x = y$ și este surjectivă pentru că orice element din G este de forma $A(x) = f(2x+1)$, deci aparține imaginii lui f .

35. Dacă $A, B \in G, \det(AB) = \det A \det B = 1$, deci $AB \in G$. Dacă $A \in G$, atunci și $A^{-1} \in G$, deoarece $AA^{-1} = I_2, \det(AA^{-1}) = \det I_2 = 1, \det A \det(A^{-1}) = 1$ și cum $\det A = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = 1$.

36. a) Fie $x, y \in U_n$. Cum $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n} = 1 \Rightarrow \frac{x}{y} \in U_n$, rezultă concluzia. b) Fie $x \in H$. Atunci

$1 = x^{\text{ord } H} = x^n \Rightarrow H \subset U_n$. Deoarece mulțimile au același cardinal, rezultă cerința. 37. a) H este parte stabilă a lui S_3 în raport cu compunerea permutărilor, deoarece $\forall \sigma^h, \sigma^l \in H \Rightarrow \sigma^h \cdot \sigma^l = \sigma^{h+l} \in H$.

De asemenea, $(\sigma^k)^{-1} = \sigma^{-k} \in H$ ($\sigma^0 = e$), deci H este subgrup al grupului (S_3, \cdot) . b) Din calcul rezultă că ordinul lui σ este 6. 38. a) $\varepsilon^{42} = \cos 30\pi + i \sin 30\pi \Rightarrow \varepsilon^{42} = 1$. b)

$$1 = \left(\cos \frac{5\pi}{7} + i \sin \frac{5\pi}{7}\right)^k = \cos \frac{5k\pi}{7} + i \sin \frac{5k\pi}{7} \Leftrightarrow \frac{5k}{7} \in 2\mathbb{Z} \Leftrightarrow 14 | k, \text{ deci ordinul elementului } \varepsilon \text{ în}$$

grupul U_{42} este 14. c) H este subgrupul generat de ε . 39. Avem $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ (x \circ z) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (a-1)x = 0, \forall x, y, z \in \mathbb{R}, \text{ deci } a = 1. 40. a) \text{ Observăm că } x \circ y = (x+2)(y+2) - 2. \text{ Avem}$$

$$x \circ y = -2 \Leftrightarrow (x+2)(y+2) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \text{ sau } y = -2. b) \text{ Pentru a determina elementele inversabile}$$

$$\text{ale inelului, trebuie mai întâi să determinăm elementul neutru față de operația „\circ”, căutăm } e \in \mathbb{Z} \text{ astfel încât } x \circ e = e \circ x, \forall x \in \mathbb{Z}, \text{ adică } (x+2)(e+2) - 2 = x, \forall x \in \mathbb{Z}, \text{ deci } (x+2)(e+1) = 0, \forall x \in \mathbb{Z},$$

$$\text{de unde } e = -1 \in \mathbb{Z} \text{ este element neutru față de „\circ”. Apoi, } x \in U(\mathbb{Z}) \Leftrightarrow \exists x' \in \mathbb{Z} \text{ astfel încât}$$

$$x \circ x' = x' \circ x = -1 \Leftrightarrow (x+2)(x'+2) = 1 \Leftrightarrow x+2 \in \{-1, 1\} \Leftrightarrow x \in \{-3, -1\} \Leftrightarrow U(\mathbb{Z}) = \{-3, -1\}.$$

c) Funcția $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x-2$ este morfism de inele deoarece avem:

$$1^0. f(x+y) = x+y-2 = x-2+y-2+2 = f(x) + f(y).$$

$$2^0. f(xy) = xy-2 = f(x) \circ f(y), \forall x, y \in \mathbb{Z}.$$

Funcția $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x-2$ este inversabilă, având inversa $f^{-1}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f^{-1}(y) = y+2$. Prin

urmare, f este izomorfism de la inelul $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ la inelul $(\mathbb{Z}, *, \circ)$. 41. Avem $x * y = e^{\log_2 x \log_2 y}$,

$$x * (y * z) = e^{\log_2 x \log_2 (y * z)} = (x * y) * z, \text{ deci legea este asociativă. Cum } x * 2 = 2 * x = e^{\log_2 x} = x, \text{ deci}$$

$$2 \text{ este element neutru. Fie } x \in (0, \infty) - \{1\}. \text{ Cum } x * 2^{\log_2 x} = 2, \text{ rezultă că } x \text{ este inversabil. Deoarece}$$

$$x * (yz) = x^{\log_2 yz} = x^{\log_2 y + \log_2 z} = x^{\log_2 y} x^{\log_2 z} = (x * y) * (x * z), \text{ rezultă cerința. 42. a) Căutăm } e \in \mathbb{Q}$$

$$\text{astfel încât } x \perp e = e \perp x = x, \forall x \in \mathbb{Q}, \text{ adică } x + e - 5 = x, \forall x \in \mathbb{Q}, \text{ deci } e = 5 \in \mathbb{Q} \text{ este elementul}$$

$$\text{neutru al legii „\perp”. b) Determinăm pentru început elementul neutru } e_1 \text{ al operației „\perp”, căutăm}$$

$$e_1 \in \mathbb{Q} \text{ astfel încât } x \perp e_1 = e_1 \perp x = x, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ adică } x + e_1 - 5 = x, \forall x \in \mathbb{Q}, \text{ deci } e_1 = 5 \in \mathbb{Q} \text{ este}$$

$$\text{elementul neutru pentru „\perp”. Apoi, determinăm elementul neutru } e_2 \text{ al operației „\top”. Căutăm}$$

$$e_2 \in \mathbb{Q} \text{ astfel încât } x \top e_2 = e_2 \top x = x, \forall x \in \mathbb{Q}, \text{ adică } (x-5)(e_2-5) + 5 = x, \forall x \in \mathbb{Q}, \text{ deci}$$

$$(x-5)(e_2-6) = 0, \forall x \in \mathbb{Q}, \text{ de unde rezultă } e_2 = 6 \in \mathbb{Q} \text{ este elementul neutru al operației „\top” (am}$$

$$\text{observat faptul că } x \top y = (x-5)(y-5) + 5). \text{ Pentru a demonstra că } (\mathbb{Q}, \perp, \top) \text{ este corp, trebuie ca}$$

$$\text{orice element din } \mathbb{Q} - \{5\} \text{ să fie inversabil. Dacă } x \in \mathbb{Q} - \{5\}, \exists x' \in \mathbb{Q} - \{5\} \text{ astfel încât}$$

$$x \top x' = x' \top x = 6, \text{ adică } (x-5)(x'-5) + 5 = 6, \text{ deci } x' = \frac{5x-24}{x-5}. \text{ Mai trebuie verificat că}$$

$$x' \in \mathbb{Q} - \{5\}. \text{ Cum } x' \in \mathbb{Q}, \text{ rămâne să arătăm că } x' \neq 5 \Leftrightarrow \frac{5x-24}{x-5} \neq 5 \Leftrightarrow 5x-24 \neq 5x-25, \text{ ceea ce}$$

$$\text{este evident. Deci } (\mathbb{Q}, \perp, \top) \text{ este corp. c) Funcția } f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = x+5 \text{ este morfism de corpuri,}$$

$$\text{deoarece } \forall x, y \in \mathbb{Q}, \text{ avem: } 1^0. f(x+y) = x+y+5 = x+5+y+5-5 = f(x) \perp f(y)$$

$$2^0. f(xy) = xy+5 = f(x) \top f(y). \text{ Funcția } f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = x+5 \text{ este și bijecție, deoarece}$$

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists! x = y-5 \in \mathbb{Q} \text{ astfel încât } f(x) = y. \text{ Așadar } f \text{ este izomorfism de corpuri. d) Se}$$

$$\text{demonstrează prin inducție după } n, \text{ că } x_1 \top x_2 \top \dots \top x_n = (x_1-5)(x_2-5) \dots (x_n-5), \text{ cu } n \in \mathbb{N}^* \text{ și}$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Q}.$$

$$43. \text{ Demonstrăm că } \hat{a} \in \mathbb{Z}_n \text{ este element inversabil al inelului } (\mathbb{Z}_n, +, \cdot) \text{ dacă și numai dacă este}$$

$$\text{relativ prim cu } n.$$

$$\Rightarrow \text{presupunem că } \hat{a} \text{ este inversabilă în inelul } \mathbb{Z}_n. \text{ Atunci } \exists \hat{b} \in \mathbb{Z}_n \text{ astfel încât } \hat{a}\hat{b} = \hat{1}. \text{ Cum}$$

$$\hat{a}\hat{b} = \hat{1} \text{ rezultă că } n | ab-1 \text{ (am folosit faptul că } \hat{x} = \hat{y} \Leftrightarrow x \pmod n = y \pmod n) \Leftrightarrow$$

$$n | x-y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod n). \text{ Există deci } k \in \mathbb{Z} \text{ astfel încât } ab-1 = nk. \text{ Așadar}$$

$$a \cdot b + n(-k) = 1 \Rightarrow (a, n) = 1.$$

$$\Leftarrow \text{Reciproc, dacă } (a, n) = 1, \exists h, k \in \mathbb{Z} \text{ astfel încât } ah + nk = 1. \text{ Cum}$$

$$\hat{1} = \widehat{ah + nk} = \widehat{ah} + \widehat{nk} = \widehat{ah} + \hat{0} = \widehat{ah}, \text{ rezultă că } \hat{a} \text{ este element inversabil al inelului } \mathbb{Z}_n \text{ și}$$

$$(\hat{a})^{-1} = \hat{h}. \text{ Deci elementele inversabile ale inelului } (\mathbb{Z}_{10}, +, \cdot) \text{ sunt } \hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{9}.$$

$$44. a) \text{ Demonstrăm că } A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_{12}) \text{ este inversabilă dacă și numai dacă } \det A \in \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}. \text{ Fie}$$

$A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_{12})$ inversabilă și fie B inversa ei; atunci $\det(A)\det(B) = \det(AB) = \hat{1}$, deci $\det(A) \in \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}$. Reciproc, fie $\det(A) \in \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}$. Din $AA^* = \det(A)I_2$, cum $\det A$ este element inversabil în \mathbb{Z}_{12} , rezultă $A(\det(A)^{-1}A^*) = I_2$, deci $\det(A)^{-1}A^*$ este inversa matricei A . b) Se demonstrează prin calcul că $A^{-1} = A$.

45. a) $a, b, c \in \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}\}$, deci fiecare poate lua câte 4 valori. Atunci numărul elementelor mulțimii G este $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$. **b)** Fie $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$; $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 & ab+bc \\ 0 & c^2 \end{pmatrix}$; $X^2 = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}$, rezultă $a^2 = \hat{1}, c^2 = \hat{0}$ și $b(a+c) = \hat{0}, a^2 = \hat{1}$ pentru $a \in \{\hat{1}, \hat{3}\}, c^2 = \hat{0}$ pentru $c \in \{\hat{0}, \hat{2}\}$. Dacă $a = \hat{1}, c = \hat{0}$, atunci $b = \hat{0}$. Dacă $a = \hat{1}, c = \hat{2}$, atunci $b = \hat{0}$. Dacă $a = \hat{3}, c = \hat{0}$, atunci $b = \hat{0}$. Dacă $a = \hat{3}, c = \hat{2}$, atunci $b = \hat{0}$. În concluzie, avem 4 soluții.

46. a) Fie $X_1 = \begin{pmatrix} a_1 & \hat{2}b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} a_2 & \hat{2}b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix}$; $X_1X_2 = \begin{pmatrix} a_1a_2 + \hat{2}b_1b_2 & \hat{2}(a_1b_2 + a_2b_1) \\ a_1b_2 + a_2b_1 & a_1a_2 + \hat{2}b_1b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \hat{2}b \\ b & a \end{pmatrix}$. Dacă

$X_1X_2 = O_2 \Rightarrow \det(X_1)\det(X_2) = \hat{0} \Rightarrow \det(X_1) = \hat{0}$ sau $\det(X_2) = \hat{0}$. Fie $\det(X_1) = \hat{0}$. Atunci $a_1^2 + b_1^2 = \hat{0}$, de unde $a_1 = b_1 = \hat{0}$, deci $X_1 = O_2$, fals. Rezultă că H este parte stabilă a lui G în raport cu înmulțirea. Deoarece $X_1^{-1} = (\det(X_1))^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & \hat{2}(-b_1) \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix} \neq O_2$, rezultă că H este subgrup. **b)** Fie

$X = \begin{pmatrix} a & \hat{2}b \\ b & a \end{pmatrix}$; $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 + \hat{2}b^2 & ab \\ \hat{2}ab & a^2 + \hat{2}b^2 \end{pmatrix}$. Dacă $X^2 = I_2$ rezultă $a^2 + \hat{2}b^2 = \hat{1}$ și $ab = \hat{0}$. Pentru

$a = \hat{0}$ nu există $b \in \mathbb{Z}_3$ astfel încât $a^2 + \hat{2}b^2 = \hat{1}$. Pentru $b = \hat{0}$, obținem $a = \hat{1}$ sau $a = \hat{2}$. Soluțiile ecuației sunt $\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$ și $\begin{pmatrix} \hat{2} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{2} \end{pmatrix}$. **47. a)** Cum în \mathbb{Z}_7 , $\hat{0}^2 = \hat{0}$, $\hat{1}^2 = \hat{1}$, $\hat{2}^2 = \hat{4}$, $\hat{3}^2 = \hat{2}$, $\hat{4}^2 = \hat{2}$,

$\hat{5}^2 = \hat{4}$ și $\hat{6}^2 = \hat{1}$, atunci $x^2 \in \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{4}\} = H$. **b)** $x^{2000} = (x^{1000})^2$, adică $\{x^{2000} | x \in \mathbb{Z}_7\} \subset H$.

Incluziunea inversă provine din $\hat{0}^{2000} = \hat{0}, \hat{1}^{2000} = \hat{1}; \hat{2}^{2000} = \hat{2}^{3 \cdot 666 + 2} = \hat{4}; \hat{3}^{2000} = \hat{3}^{6 \cdot 333 + 2} = \hat{2}$. **48. a)** $a, b \in \mathbb{Z}_5 = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}\}$. Adică fiecare poate lua 5 valori. Atunci mulțimea M va avea $5 \cdot 5 = 25$ elemente.

b) Fie $A = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \in M, B = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \in M$. Obținem $A \cdot B = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{a} + \hat{a} & \hat{b} + \hat{b} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$.

c) Cum M este o submulțime finită a grupului matricelor inversabile din $\mathcal{M}_3(\mathbb{Z}_5)$, și M este parte stabilă față de înmulțire, rezultă cerința.

49. a) $\hat{3}x^2 = -\hat{4}$, adică $x^2 = \hat{1}$, de unde $(x - \hat{1})(x + \hat{1}) = 0$ și cum $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ este corp, nu are divizori ai lui zero, deci $x = \hat{1}$ sau $x = \hat{6}$. **b)** Cum $(\hat{3})^6 = \hat{1}$ și $(\hat{3})^k \neq \hat{1}, k = 1, 2, 3, 4, 5$, $\text{ord}(\hat{3}) = 6$. **c)** Presupunem că există un morfism $f: (\mathbb{Z}_6, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$, deci $f(x+y) = f(x) \cdot f(y), \forall x, y \in \mathbb{Z}_6$.

Cum $\hat{0}$ este element neutru în $(\mathbb{Z}_6, +)$ și $\hat{1}$ element neutru în (\mathbb{Z}_7^*, \cdot) , rezultă că $f(\hat{0}) = \hat{1}$. Avem $f(\hat{0}) = f(\hat{2} + \hat{2} + \hat{2}) = f(\hat{2}) \cdot f(\hat{2}) \cdot f(\hat{2}) = \hat{3} \cdot \hat{3} \cdot \hat{3} = \hat{6} \neq \hat{1}$. **50. a)** Fie $X, Y \in H, X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$ și $Y = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$. Atunci $XY = \begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 + x_2 \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$. Cum $x_1, y_1 \in \{-\hat{1}, \hat{1}\}$, rezultă $x_1y_1 \in \{-\hat{1}, \hat{1}\}$. Deci $XY \in H$. Folosind proprietățile înmulțirii în \mathbb{Z}_5 , se arată că H este grup în raport cu înmulțirea matricelor. **b)** Fie $X = \begin{pmatrix} m & n \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$. $\text{ord } X = 2$ dacă și numai dacă $X^2 = I_2, X \neq I_2$. Obținem $\begin{pmatrix} m^2 & mn+n \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$, de unde rezultă $m^2 = \hat{1}$ și $n(m+\hat{1}) = \hat{0}$. Din $m^2 = \hat{1}$ obținem $m_1 = \hat{1}$ și $m_2 = -\hat{1}$. Dacă $m = \hat{1}$, atunci $n = \hat{0}$ și $X = I_2$, care nu convine. Rămâne $m = \hat{4}$ și $n \in \mathbb{Z}_5$, deci H are 5 elemente de ordin 2.

Tema 2.4 Polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ

1. $a \neq \pm 1 \Rightarrow \text{grad}(f) = 4$; $a = 1 \Rightarrow \text{grad}(f) = 1$; $a = -1 \Rightarrow \text{grad}(f) = 2$. **2.** $c = 3X^2 + X + 6$, $1. a \neq \pm 1 \Rightarrow \text{grad}(f) = 4$; $a = 1 \Rightarrow \text{grad}(f) = 1$; $a = -1 \Rightarrow \text{grad}(f) = 2$. **2.** $c = 3X^2 + X + 6$, $r = -2X + 9$. **3. a)** $f(1) = 3^{20} + 1$; **b)** $a_0 + a_{40} = 4$. **4.** $r = f(1) = 1$. **5.** Se impune $f(-1) = f(2) \Leftrightarrow -a$

$= 2a + 15 \Leftrightarrow a = -5$. **6. a)** $c = X^4 - X^3 + 5X^2 - 5X + 3, r = 2$. **b)** $c = X^4 + 2X^3 + 8X^2 + 16X + 30, r = 65$. **7.** $f = (X^2 - 1)c + aX + b$. $\begin{matrix} f(1) = a+b \\ f(-1) = -a+b \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} a+b=3 \\ -a+b=9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=6 \\ a=-3 \end{cases} \Rightarrow r = -3X + 6$.

8. $r = f(-1) = 0 \Leftrightarrow a + 8 = 0 \Leftrightarrow a = -8$. **9.** $f = X^4 + X^3 + 2X^2 + X^2 + X + 2 + (a-1)X + (b-2) = (X^2 + X + 2)(X^2 + 1) + (a-1)X + b - 2$. $X^2 + X + 2 | f \Leftrightarrow a = 1$ și $b = 2$.

10. $f = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1), g = (X^2 + X + 1)(X + 1). d = X^2 + X + 1$ și $m = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)(X + 1)$. **11. a)** $x_1 + x_2 + x_3 = 3$. **b)** $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{x_1x_2x_3} = -\frac{3}{7}$. **12. a)**

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = 25 + 4 = 29$. **b)** $\frac{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}{x_1x_2x_3} = \frac{2}{3}$. **c)** Avem

$x_i^2 = -5x_i^2 + 2x_i - 3, i \in \{1, 2, 3\}$. Fie $S_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k$. Prin însumare rezultă că $S_3 = -5S_2 + 2S_1 - 9 = -164$. **13. a)** $f = (X - x_1)(X - x_2)(X - x_3)(X - x_4) \Rightarrow$

$(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3)(1 - x_4) = f(1) = 2$. **b)** $\frac{(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3)(1 - x_4)}{x_1x_2x_3x_4} = f(1) = 2$. **14. a)** Avem

$x_i^3 = x_i^2 - 3x_i + 5, i \in \{1, 2, 3\}$. Prin însumare rezultă $S_3 = S_2 - 3S_1 + 15$. Analog, deoarece $x_i^4 = x_i^3 - 3x_i^2 + 5x_i, i \in \{1, 2, 3\}$, prin însumare rezultă $S_4 = S_3 - 3S_2 + 5S_1$. Cum $S_1 = 1$ și $S_2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = -5 \Rightarrow S_3 = -5 - 3 + 15 = 7$ și $S_4 = 7 + 15 + 5 = 27$. **b)** $\sum x_i^2x_j = (x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) - 3x_1x_2x_3 = -12$.

- 15. a)** $f(-x) = (x^2 - x + 1)^{40} + (x^2 + x + 1)^4 = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Polinomul $g = f(X) - f(-X)$ are o infinitate de rădăcini, deci $g = 0$. Rezultă că $f(X) = f(-X) \Rightarrow a_{2k+1} = 0 \Rightarrow a_{15} = 0$.
- b)** $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{80} = f(1) = 3^{40} + 1$. **c)** $a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{80} = \frac{f(1) + f(-1)}{2} = f(1) = 3^{40} + 1$.
- 16. a)** $x_1 + x_2 + x_3 = -a \Rightarrow a = 0$; $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = b \Rightarrow b = -3$, $x_1x_2x_3 = -c \Rightarrow c = 2$. **b)** $x_1 = \sqrt{2} \Rightarrow x_2 = -\sqrt{2} \Rightarrow x_3 = -a \in \mathbb{Q}$. **c)** Presupunem că f are o rădăcină k întreagă. Notăm g câtul împărțirii polinomului f la $X - k$. Atunci $f(0)f(1) = (-k)(1-k)g(0)g(1) \Rightarrow k(k-1)$ impar, fals.
- 17. a)** $f = X(X^2 + 12X + 20) = X(X+10)(X+2) \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -10, x_3 = -2$.
- b)** $(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2 = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = 32a^2 - 120$.
- 18. a)** $x_{1,2} = \pm 1, x_{3,4} = \pm 2$; **b)** $h = 4X^4 - 5X^2 + 1$. **19. a)** $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \frac{x_1x_2x_3 + \dots}{x_1x_2x_3x_4} = a$.
- b)** $r = (a+8)X - 7$. **c)** $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \frac{-2}{9} < 0$. **20. a)** $f(3) - f(1) = 80a + 2b = 2(40a + b)$. **b)** $f(x) - f(y) = a(x^4 - y^4) + b(x - y)$. Cum $x - y \mid x^4 - y^4$ rezultă concluzia. **21. a)** $f(1) = f(-1) = 0 \Rightarrow a = -4, b = 12$. **b)** $x_1 = \alpha - r, x_2 = \alpha, x_3 = \alpha + r$ și $x_1 + x_2 + x_3 = 3\alpha \Rightarrow 3\alpha = 3 \Rightarrow \alpha = 1, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 2r^2 + 3 \Rightarrow 2r^2 + 3 = 11 \Rightarrow 2r^2 = 8 \Rightarrow r^2 = 4 \Rightarrow r = \pm 2 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 3 \Rightarrow a = -4, b = 12$. **22. a)** $\hat{f}(\hat{0}) = \hat{f}(\hat{1}) = \hat{1} \neq \hat{0} \Rightarrow \hat{f}$ nu are rădăcini în \mathbb{Z}_2 . Cum $\text{grad}(\hat{f}) = 3 \Rightarrow \hat{f}$ este ireductibil în $\mathbb{Z}_2[X]$. **b)** Dacă $f = g \cdot h$ cu $g, h \in \mathbb{Z}[X]$ și $\text{grad } g, h \geq 1 \Rightarrow g$ și h are coeficienții dominanți 1 și deci $\text{grad } \hat{g}, \hat{h} \geq 1$. Rezultă $\hat{f} = \hat{g} \cdot \hat{h}$ în $\mathbb{Z}_2[X]$, fals. **23. a)** $f(\hat{0}) + f(\hat{1}) + f(\hat{2}) = \hat{3}a + \hat{1} = \hat{1} \Rightarrow a = \hat{0}$. **b)** $x_1 = \hat{2}$. **c)** f e ireductibil $\Leftrightarrow f$ nu are rădăcini în $\mathbb{Z}_3 \Leftrightarrow a = \hat{1}$. **24. a)** $g = (X-1)(X-2)$. **b)** $f(2) = 1 \neq 0 \Rightarrow X-2$ nu divide polinomul f , deci g nu divide polinomul f . **c)** $f = gc + aX + b, c \in \mathbb{R}[X]$. Din $f(1) = a+b$ și $f(2) = 2a+b$ rezultă că $a+b=1, 2a+b=1 \Rightarrow a=0, b=1 \Rightarrow r=1$. **25. a)** $f(0) = n \Rightarrow n=0; f(1) = 1+m \Rightarrow m=-1$. **b)** $S_2 = -2m = 2 \Rightarrow m=-1$. **c)** $f = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$. **26. a)** $g = (X-1)(X^2 + X + 2)$; $f(1) = 0 \Rightarrow a+b = -2 \Rightarrow b = -2 - a$. Din împărțirea lui f la $X^2 + X + 2$ se obține $a = -3, b = 1$. **b)** $f = (X-1)(X-3)(X^2 + X + 2)$. **27. a)** $f = X(X^2 - 1) - 9(X^2 - 1) = (X^2 - 1)(X - 9) \Rightarrow r = 0$ și $c = X - 9$. **b)** Rădăcinile sunt $\pm 1, \pm 3$, care verifică relația. **c)** $f(3^x) = 0 \Leftrightarrow 3^x = \pm 1, 3^x = 9 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$. **28. a)** $(1-x_1^2)(1-x_2^2)(1-x_3^2)(1-x_4^2) = \prod (1-x_i)(1+x_i) = f(1)f(-1) = (a+2)^2$. **b)** $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = s_1^2 - 2s_2 = 4 - 2a \Rightarrow 4 - 2a = 8 \Rightarrow a = -2$. **29. a)** $x_1 = x_2 = 1, x_3 = -2$. **b)** $S_1 = 0, S_2 = 6, S_3 = -3m$ și $S_4 = 3S_2 - mS_1 = 18$. **c)** $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6 \Rightarrow |x_1| = |x_2| = 1$ și $|x_3| = 2$. Cum $x_1 + x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 1$ și $x_3 = -2 \Rightarrow m = 2$ sau $x_1 = x_2 = -1, x_3 = 2 \Rightarrow m = -2$. **30.** Rădăcinile raționale ale lui f pot fi numai numerele ± 1 și $\pm \frac{1}{2}$. Calculând $f(1), f(-1), f(\frac{1}{2}), f(-\frac{1}{2})$, obținem $a \in \{-5, 1\}$. **31. a)** Un cmmdc este $X^2 - 1$ și un cmmmc este $(X^2 + 1)g$. **b)** Mulțimea $U_4 \cap U_6 = U_2$ are 2 elemente, deci $U_4 \cup U_6$ are 8 elemente. **32. a)** Fie $\varepsilon \in \mathbb{C}$ o rădăcină a lui g și r restul împărțirii lui f la g . Atunci $r(\varepsilon) = f(\varepsilon) = 3\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 6$. Fie $h = 3X^2 + 2X + 6$. Cum $(r-h)(\varepsilon) = 0, g$ are trei

- rădăcini distincte și $\text{grad}(r-h) \leq 2$, rezultă că $r=h$. **b)** Fie $\varepsilon \in \mathbb{C}$ o rădăcină a lui h și r restul împărțirii lui f la h . Avem $r(\varepsilon) = f(\varepsilon) = 3\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 6 = 3(-\varepsilon - 1) + 2\varepsilon + 6 = -\varepsilon + 3$. Fie $p = -X + 3$. Cu argumentele de mai sus rezultă că $r=p$. **c)** Fie $\varepsilon \in \mathbb{C}$ o rădăcină a lui t . Avem $\varepsilon^5 = 1$ și $r(\varepsilon) = f(\varepsilon) = \varepsilon^4 + 3\varepsilon^2 + \varepsilon + 6$. Cu argumentele de mai sus rezultă că $r = X^4 + 3X^2 + X + 6$. **33.** Fie r restul împărțirii lui f la g . Atunci $r = aX + b$ și $f = (X+1)^2c + aX + b, c \in \mathbb{R}[X]$. Obținem $f(-1) = -a + b, f'(-1) = a$. Pe de altă parte, $f(-1) = -20, f'(-1) = 7 \Rightarrow a = 7, b = -13, r = 7X - 13$. **34.** Fie $r = aX^2 + bX + c$ restul împărțirii lui f la g . Obținem $f(0) = c, f(1) = a + b + c, f'(1) = 2a + b$. Pe de altă parte, $f(0) = 0, f(1) = 2^{20}, f'(1) = 80 \cdot 2^{19}$, de unde $r = 39 \cdot 2^{20}X^2 - 38 \cdot 2^{20}X$. **35.** Fie $r = aX + b$ restul împărțirii lui f la g . Atunci $f = (X-1)^2c + aX + b, c \in \mathbb{R}[X]$, deci $a + b = f(1) = -20, a = f'(1) = 1$. Rezultă $f = (X-1)^2c + X - 21$, deci $f(-1) = 4c(-1) - 22$. Cum $f(-1) = -22$, obținem $c(-1) = 0$. **36. a)** Un polinom cu proprietatea din enunț este $X^4 - X^3 + 3X^2 - 5X + 1$. **b)** Primele două relații ale lui Viète aplicate lui g implică $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{1}{x_4^2} = -5 < 0$, deci nu toate rădăcinile sunt reale. **37. a)** Avem $x_i^4 - 2x_i^3 + x_i^2 + x_i - 1 = 0$, deci $x_i^3 - 2x_i^2 + x_i + 1 - \frac{1}{x_i} = 0, i = 1, 2, 3, 4$. Prin însumare obținem $S_3 - 2S_2 + S_1 + 4 - \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}\right) = 0$. Cum $S_1 = 2, S_2 = 2$ și $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \frac{S_3}{S_4} = 1$, rezultă $S_3 = -1$. **b)** Avem $S_4 - 2S_3 + S_2 + S_1 - 4 = 0$, deci $S_4 = -2 < 0$, de unde rezultă concluzia. **38. a)** Suma cerută este egală cu $S_2 + 2S_1 + 4 = 4a^2 - 6b - 4a + 4$. **b)** Pentru $a = b = 2$, suma anterioară este egală cu 0, deci toate rădăcinile sunt egale cu -1 . De aici $c = 4, d = 1$. **39. a)** Cum gradul lui f este 3, rezultă că polinomul are o rădăcină reală a . Dacă $a \leq 0$, rezultă $f(a) < 0$, fals. Deci $a > 0$. **b)** Din punctul anterior rezultă că f are rădăcinile $x_1, x_2, x_3 > 0$. Cum $x_1 + x_2 + x_3 = p = 3$ și $x_1x_2x_3 = r = 1$, rezultă că $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = \sqrt[3]{x_1x_2x_3}$, deci $x_1 = x_2 = x_3 = 1$. Obținem $q = 3$. **40.** Presupunem că f are toate rădăcinile reale. Atunci f' , deci și f'' au toate rădăcinile reale. Cum $f'' = 12X^2 + 6aX + 2a$, avem $\Delta = 3a(3a - 8) \geq 0$, deci $a \in (-\infty, 0] \cup \left[\frac{8}{3}, \infty\right)$, fals. **41.** Pentru $x \in \mathbb{R}$, avem $f(x) = x^2(x+2)^2 + (x-3)^2 + a - 9 > 0$. Deci f nu are nicio rădăcină reală. **42.** Cum $f = (X+1)(X^2 + (a-1)X + 1)$ rezultă că $f(-1) = 0$, iar celelalte două rădăcini ale lui f sunt rădăcinile lui $X^2 + (a-1)X + 1$. Cum $\Delta = (a-1)^2 - 4, f$ are toate rădăcinile reale dacă și numai dacă $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$. **43.** Folosim șirul lui Rolle pentru funcția derivabilă $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3 - 12x + m$. Avem ± 2 rădăcini pentru g' , f are toate rădăcinile reale dacă și numai dacă $g(-2) \geq 0$ și $g(2) \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-16, 16]$. **44.** Fie $x \in \mathbb{C}^*$. Avem $f(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2\left(x - \frac{1}{x}\right) + a + 2 = 0 \Leftrightarrow t^2 + 2t + a + 2 = 0$, unde $t = x - \frac{1}{x}$. Dacă $x \in \mathbb{R}$, atunci $t \in \mathbb{R}$,

deci $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 4 - 4(a+2) \geq 0 \Leftrightarrow a \leq -1$. Dacă $a \leq -1$, atunci ecuația $t^2 + 2t + a + 2 = 0$ are rădăcinile t_1, t_2 reale. Cum rădăcinile din \mathbb{C} ale lui f sunt soluțiile ecuațiilor $x^2 - t_i x - 1 = 0, i = 1, 2$, cu $\Delta = t_i^2 + 4 > 0$, rezultă că f are toate rădăcinile reale. În concluzie, $a \leq -1$. **45. a)** Avem $a_1 = f'(0)$. Cum $f' = 30(X^2 + X + 2)^{29}(2X + 1) + 30(X^2 - X + 3)^{29}(2X - 1)$, rezultă că $a_1 = 30(2^{29} - 3^{29})$. **b)** Cum $x^2 + x + 2 > 0$ și $x^2 - x + 3 > 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$, rezultă că $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f nu are nicio rădăcină reală. **46.** Cum gradul lui f este 3, rezultă că polinomul este ireductibil peste \mathbb{Q} dacă și numai dacă nu are rădăcini raționale. Vom determina valorile întregi ale lui a pentru care f are rădăcini raționale. Dacă $f\left(\frac{p}{q}\right) = 0, p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$, atunci $p, q | 1$, deci $\frac{p}{q} = \pm 1$. Cum $f(1) = a + 3, f(-1) = 1 - a$, rezultă că f are rădăcini raționale dacă și numai dacă $a = -3$ sau $a = 1$. În concluzie, valorile întregi ale lui a pentru care f este ireductibil peste \mathbb{Q} sunt $a \in \mathbb{Z} - \{-3, 1\}$. **47.** Dacă $a = \hat{0}$, atunci $f(\hat{0}) = \hat{0}$. Dacă $a = \hat{1}$, atunci $f(\hat{2}) = \hat{0}$. Dacă $a = \hat{2}$, atunci $f(\hat{1}) = \hat{0}$. Rezultă cerința. **48.** Avem $f(\hat{0}) = a, f(\hat{1}) = a + \hat{3}, f(\hat{2}) = f(\hat{3}) = f(\hat{4}) = a + \hat{4}$. Deci f are rădăcini în \mathbb{Z}_5 dacă și numai dacă $a \in \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}\}$. Cum gradul lui f este 3, rezultă că polinomul este ireductibil peste \mathbb{Z}_5 dacă și numai dacă nu are rădăcini în \mathbb{Z}_5 , i.e. $a \in \{\hat{3}, \hat{4}\}$. **49. a)** Cum $x^5 = x, \forall x \in \mathbb{Z}_5$, rezultă că $f(x) = x^4 + \hat{4}x^4 + \hat{3} = \hat{3} \neq \hat{0}$, de unde rezultă concluzia. **b)** $f = (X^4 + \hat{1})(X^4 + \hat{3})$. **50. a)** $f = (X^2 + \hat{1})(X^2 + X + \hat{2})$. **b)** Cum $x^3 = x, \forall x \in \mathbb{Z}_3$, avem $f(x) = x^4 + x^3 + x + \hat{2} = x^3 + x^2 + x + \hat{2} = g(x), \forall x \in \mathbb{Z}_3$, unde $g = X^3 + X^2 + X + \hat{2}$. Cum gradul lui g este 3 și g nu are rădăcini în \mathbb{Z}_3 , rezultă că g este ireductibil peste \mathbb{Z}_3 .

Partea 3. ANALIZĂ MATEMATICĂ (clasele XI-XII)

Tema 3.1 Limite de șiruri. Limite de funcții. Funcții continue. Funcții derivabile

1. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\ln(x^2 + 1)}{x}\right) = +\infty$, întrucât $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0$ (cu regula lui L'Hospital). **b)** $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f este crescătoare. **c)** $f''(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2}$;

punctele de inflexiune sunt -1 și 1 .

2. a) Avem $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = -1$ (cu L'Hospital!) și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + x) = 0$, deci $y = x$ este asimptotă oblică la graficul funcției f spre $-\infty$. Cum $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$.

b) $f'(x) = -\frac{1}{e^x + 1} < 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f este strict descrescătoare. **c)** Deoarece f are proprietatea lui Darboux (fiind continuă), este descrescătoare și $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, rezultă $\text{Im } f = \mathbb{R}$.

3. a) Avem $f(x) = (x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6)$ și $f'(x) = 2(2x - 5)(x^2 - 5x + 5)$. Ecuația $f'(x) = 0$ are rădăcinile reale $x_1 = \frac{5}{2}$ și $x_{2,3} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$. Alternativ, afirmația rezultă aplicând teorema lui Rolle funcției f pe intervalele $[1, 2], [2, 3], [3, 4]$. **b)** Calcul direct. **c)** $\min f(x) = -1$ (vezi tabelul de variație).

x	$-\infty$	$\frac{5-\sqrt{5}}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5+\sqrt{5}}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	---	0	++	0	++
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	-1	\nearrow	$+\infty$

4. a) $f'(x) = \frac{2x+1}{x+1} - 2x \cdot \ln \frac{x+1}{x}, \forall x > 0$. **b)** $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x+1} - 2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right) = 2 - 2 \ln e = 0$.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{y \downarrow 0} f\left(\frac{1}{y}\right) = \lim_{y \downarrow 0} \frac{y - \ln(1+y)}{y^2} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{y \downarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{y+1}}{2y} = \lim_{y \downarrow 0} \frac{1}{2(y+1)} = \frac{1}{2}$ (cu L'Hospital!).

5. a) $f'(x) = e^x - 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Funcția f este strict descrescătoare pe $(-\infty, 0]$ și strict crescătoare pe $[0, +\infty)$. Singurul punct de extrem al funcției este $x = 0$ (punct de minim). **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$ (se aplică regula lui L'Hospital). **c)** Din **a)** rezultă că $f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow e^x \geq x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

6. a) $f'(x) = \frac{1-x^2}{x^2+1}, x \in \mathbb{R}$. **b)** $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+f(x))^x = e$. **c)** Din tabelul de variație rezultă $\text{Im } f = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		--- 0 +++	0 ---	
$f(x)$	0 ↘	$-\frac{1}{2}$ ↗	$\frac{1}{2}$ ↘	0

7. a) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 = -\frac{1}{\sqrt{x^2+1} \cdot (x+\sqrt{x^2+1})} < 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f este strict descrescătoare. **b)**

$f''(x) = \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f este convexă. **c)** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} = 0$, deci

dreapta $y = 0$ (axa Ox) este asimptotă orizontală spre $+\infty$. Apoi, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{y^2+1}+y}{-y} = -2$ și $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+1} + x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} (\sqrt{y^2+1} - y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{y^2+1} + y} = 0$, deci dreapta de ecuație $y = 2x$ este asimptotă oblică spre $-\infty$.

8. a) Funcția f este continuă pe \mathbb{R} , derivabilă pe $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ și $f'(x) = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^2}}$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Deoarece $\lim_{x \rightarrow -1} f'(x) = -\infty$ și $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = +\infty$, conform unei consecințe a teoremei lui Lagrange, f are derivată, dar nu este derivabilă în punctele $x = \pm 1$ și $f'(-1) = -\infty$, $f'(1) = +\infty$. **b)** Unicul punct de extrem local al funcției f este $x = 0$. **c)** $f''(x) = -\frac{2(x^2+3)}{9(x^2-1)^3\sqrt[3]{(x^2-1)^2}}$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Singurele puncte de inflexiune ale funcției sunt $x = -1$ și $x = 1$ (vezi punctul **a**).

9. a) $f'(x) = -\frac{1}{x(x+1)}$ și $f''(x) = \frac{2x+1}{x^2(x+1)^2} > 0$, $\forall x > 0$, deci f este convexă. **b)** Putem scrie

$f(x) = \ln(x+1) - \ln x$, de unde obținem că $a_n = \ln(n+1) - \ln(2n+1) = \ln\left(\frac{n+1}{2n+1}\right) \rightarrow \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

c) Avem $f''(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}$, de unde rezultă că $b_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2} \rightarrow 1$.

10. a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, deci $x = 0$ este asimptotă verticală la dreapta, iar $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$. **b)** $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, $\forall x > 0$. Singurul punct de extrem al funcției f este

$x = e$. **c)** $f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$, $\forall x > 0$. Obținem că f are un singur punct de inflexiune, anume $x = e\sqrt{e}$.

11. a) Se arată prin inducție matematică. **b)** $\lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, deci $y = 0$ este asimptotă orizontală la graficul funcției spre $-\infty$. Graficul lui f nu are asimptote verticală și nici asimptotă spre $+\infty$.

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_1(a) + f_2(a) + \dots + f_n(a)}{f_n(a)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(p + p^2 + p^3 + \dots + p^n)e^{pa}}{p^n e^{pa}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(p^n - 1)}{(p - 1)p^n} = \frac{p}{p - 1}$.

12. a) $x = 0$ este asimptotă verticală la stânga, $y = -x - 1$ este asimptotă oblică spre $-\infty$, iar $y = x + 1$ este asimptotă oblică spre $+\infty$. **b)** Funcția f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ și derivabilă pe $\mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$. Se arată că $\lim_{x \rightarrow -2} f'(x) = -\sqrt{e}$ și $\lim_{x \rightarrow -2} f'(x) = \sqrt{e}$, de unde, conform unei consecințe a teoremei lui Lagrange, rezultă că f are derivate laterale în $x = -2$ și $f'_s(-2) = -\sqrt{e}$, $f'_d(-2) = \sqrt{e}$, adică f

nu este derivabilă în $x = -2$. **c)** $f''(x) = \frac{3x-2}{x^4}$, dacă $x < -2$ și $f''(x) = -\frac{3x-2}{x^4}$, pentru $x > -2$, $x \neq 0$. Funcția f'' se anulează doar în $x_0 = \frac{2}{3}$, care este unicul punct de inflexiune al funcției f , întrucât

f'' își schimbă semnul de o parte și de alta a acestui punct (faceți tabelul de semn!).

13. a) $f(1-0) = f(1) = f(1+0) = 1$, deci f este continuă în $x = 1$. Cum f este continuă pe $(0, 1) \cup (1, \infty)$ (operații cu funcții continue), rezultă că f este continuă pe $(0, \infty)$. **b)** Funcția este derivabilă pe $(0, 1) \cup (1, \infty)$, iar $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$, dacă $x \in (0, 1)$ și $f'(x) = \frac{x-1-\ln x}{x(x-1)^2}$, dacă $x > 1$.

Cum $\lim_{x \uparrow 1} f'(x) = 2$ și $\lim_{x \downarrow 1} f'(x) = \frac{1}{2}$, rezultă că $f'_s(1) = 2$, $f'_d(1) = \frac{1}{2}$, deci f nu e derivabilă în $x = 1$.

c) $\lim_{x \uparrow 1} (f(x))^{x-1} = \lim_{x \uparrow 1} e^{\frac{\ln f(x)}{x-1}} = e^2$, deoarece $\lim_{x \uparrow 1} \frac{\ln f(x)}{x-1} = \lim_{x \uparrow 1} \frac{\ln(x + \ln x)}{x-1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \uparrow 1} \frac{1 + \frac{1}{x}}{x + \ln x} = 2$.

14. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{2}$, deci dreapta de ecuație $y = \frac{1}{2}$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$. **b)** Deoarece

$0 < f(x) < \frac{1}{2}$, $\forall x > 0$, rezultă $0 < a_n < \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $\forall n \geq 1$, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. **c)** Avem $g''(x) = \frac{6(1-2x^2)}{(2x^2+3)^3}$;

studiind semnul lui g'' , obținem că punctele de inflexiune ale funcției g sunt $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ și $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

15. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+|x|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1-x} = -1$. **b)** $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+|x|} = 1$.

c) Funcția f este continuă pe \mathbb{R} și derivabilă pe \mathbb{R}^* , întrucât $f|_{(-\infty, 0)}$ și $f|_{(0, \infty)}$ sunt funcții elementare. Din punctul **a)** rezultă că f este derivabilă pe \mathbb{R} și este strict crescătoare. Cum $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, rezultă că $\text{Im } f = (-1, 1)$.

16. a) $\lim_{x \downarrow -1} f(x) = -\infty$ și $\lim_{x \uparrow 1} f(x) = +\infty$, deci dreapta de ecuație $x = -1$ este asimptotă verticală la dreapta, iar dreapta $x = 1$ este asimptotă verticală la stânga. **b)** $f''(x) = \frac{4x}{(1-x^2)^2}$, $\forall x \in (-1, 1)$.

Singurul punct de inflexiune al graficului funcției f este $x = 0$. **c)** Pentru orice $x > 1$ avem $x^\alpha f\left(\frac{1}{x}\right) = x^\alpha \cdot \ln \frac{x+1}{x-1} = x^{\alpha-1} \cdot \ln \left(\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{2}} \right)^{\frac{2x}{x-1}}$ și cum $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{2}} \right)^{\frac{2x}{x-1}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x-1}} = e^2$, rezultă că limita cerută este egală cu 0 dacă $\alpha < 1$, cu 2 dacă $\alpha = 1$, respectiv cu $+\infty$ dacă $\alpha > 1$.

17. a) Deoarece $f(x) = e^{\ln f(x)}$ și $\lim_{x \downarrow 0} \ln f(x) = \lim_{x \downarrow 0} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+y)}{y} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1}{y+1} = 0$, rezultă că $\lim_{x \downarrow 0} f(x) = e^0 = 1$. **b)** $y = e$ este asimptotă orizontală la graficul funcției spre $+\infty$.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x(1 - \ln f(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right) = \lim_{y \downarrow 0} \frac{y - \ln(1+y)}{y^2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{y \downarrow 0} \frac{1}{2(y+1)} = \frac{1}{2}$.

18. a) $f'(x) = -\frac{x}{x+1}$, $\forall x > -1$. Funcția f este strict crescătoare pe $(-1, 0]$ și strict descrescătoare pe $[0, \infty)$. **b)** Din **a)** rezultă $f(x) \leq f(0) = 0$, $\forall x > -1$, adică $\ln(1+x) \leq x$, $\forall x > -1$. **c)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

19. a) Funcția f este continuă pe \mathbb{R} , derivabilă pe \mathbb{R}^* . Avem $f'(x) = \frac{-3x+1}{2\sqrt{-x}}$, dacă $x < 0$ și $f'(x) = \frac{3x-1}{2\sqrt{x}}$, dacă $x > 0$. Deoarece $\lim_{x \uparrow 0} f'(x) = +\infty$ și $\lim_{x \downarrow 0} f'(x) = -\infty$, conform unei consecințe a teoremei lui Lagrange, rezultă că $f'_s(0) = +\infty$ și $f'_d(0) = -\infty$, deci f nu este derivabilă în $x = 0$.

b) Singurul punct de extrem local al funcției f este $x = \frac{1}{3}$. **c)** $f''(x) = -\frac{3x+1}{4x\sqrt{-x}}$, dacă $x < 0$ și $f''(x) = \frac{3x+1}{4x\sqrt{x}}$, dacă $x > 0$. Singurul punct de inflexiune al funcției f este $x = -\frac{1}{3}$.

20. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{\sqrt[3]{(x^3+3x+4)^2} + x\sqrt[3]{x^3+3x+4} + x^2} = 0$, deci dreapta

de ecuație $y = x$ este asimptotă oblică spre $+\infty$. b) $f'(x) = \frac{x^2+1}{\sqrt[3]{(x^3+3x+4)^2}} = \frac{x^2+1}{f^2(x)}$, $\forall x > 0$.

c) $f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x^3+3x+4}}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{(x+1)(x^2-x+4)}}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{\frac{x^2-x+4}{(x+1)^2}} = \infty$.

21. a) f este continuă pe \mathbb{R}^* (operații cu funcții continue!) și $f(0-0) = f(0) = f(0+0) = 1$, deci f

este continuă pe \mathbb{R} . b) Avem $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ \sqrt{1-x}, & x \in [0, 1] \\ \sqrt{x-1}, & x > 1 \end{cases}$ și $f'(x) = \begin{cases} 2^x \ln 2, & x < 0 \\ -\frac{1}{2\sqrt{1-x}}, & x \in (0, 1) \\ \frac{1}{2\sqrt{x-1}}, & x > 1 \end{cases}$.

Folosind o consecință a teoremei lui Lagrange, deducem că $f_s'(0) = \ln 2$, $f_d'(0) = -\frac{1}{2}$, $f_s'(1) = -\infty$

și $f_d'(1) = +\infty$, deci $x = 0$ este punct unghiular, iar $x = 1$ este punct de întoarcere al graficului lui f .

c) Ecuația tangentei este $y - f(5) = f'(5)(x - 5) \Leftrightarrow x - 4y + 3 = 0$.

22. a) $y - f(0) = f'(0) \cdot x \Leftrightarrow y = -x + 1$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{\sqrt[3]{(x^3+3x^2+1)^2} + x\sqrt[3]{x^3+3x^2+1} + x^2} = 1$,

deci dreapta de ecuație $y = 1$ este asimptotă (orizontală) la graficul funcției f spre $+\infty$. c) Conform cu

a), limita de calculat este nedeterminare de tip $[1^\infty]$. Cum $(f(n))^n = \left[\left(1 + (f(n)-1) \right)^{\frac{1}{f(n)-1}} \right]^{n(f(n)-1)}$

și $\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(n)-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sqrt[3]{n^3+3n^2+1} - (n+1) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n^2}{\sqrt[3]{(n^3+3n^2+1)^2} + n\sqrt[3]{n^3+3n^2+1} + n^2} = -1$,

rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n))^n = e^{-1}$.

23. a) $f(x) = \frac{a-1}{x^2} + \frac{1-\cos x}{x^2}$, $\forall x < 0$. Rezultă că $f(0-0) = \frac{1}{2}$ dacă $a = 1$, $f(0-0) = -\infty$, dacă

$a < 1$ și $f(0-0) = +\infty$, dacă $a > 1$. b) Funcția f este continuă pe \mathbb{R}^* . Pentru ca f să fie continuă în

origine, din a) rezultă $a = 1$. Cum $f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0} (x + be^x) = b = f(0)$, rezultă că f este continuă în

origine dacă și numai dacă $a = 1$ și $b = \frac{1}{2}$. c) $f_s'(0) = 0$ și $f_d'(0) = \frac{3}{2} \Rightarrow f$ nu este derivabilă în 1.

24. a) $f(x) \leq x+1$, $\forall x < 0$, și $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
b) Deoarece $\lim_{x \uparrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \uparrow 0} \left(1 - \frac{1 - \cos x}{x} \right) = 1$ și $\lim_{x \downarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \downarrow 0} \left(x + \frac{e^x - 1}{x} \right) = 1$, rezultă

că f este derivabilă în $x = 0$ și $f'(0) = 1$.
c) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(\sqrt[n]{2}) - f(1)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(\sqrt[n]{2}) - f(1)}{\frac{1}{2^n} - 1} \cdot \frac{1}{n} \right) = f'(1) \ln 2 = \ln 2$.

25. a) Cu regula lui L'Hospital, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} = 0 \Rightarrow y = 0$ este asimptotă orizontală la

graficul lui f spre $+\infty$. b) $f'(x) = \frac{x}{x+1} - \frac{\ln(x+1)}{x^2}$, $\forall x \in (0, \infty)$. Funcția $u: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$u(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$ este derivabilă și $u'(x) = -\frac{x}{(x+1)^2} < 0$, $\forall x \in (0, \infty)$. Rezultă că u este strict

descrescătoare și atunci $u(x) < u(0+0) = 0$ pentru orice $x > 0$, deci $f'(x) < 0$, $\forall x \in (0, \infty)$. Prin

urmare, f este strict descrescătoare. c) Avem $f(0+0) = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Cum f are proprietatea

lui Darboux și este strict descrescătoare, rezultă că $f((0, \infty)) = (0, 1)$, deci f este mărginită.

26. a) $f(\mathbb{R}) = (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup (1, \infty)$, care nu este interval, deci f nu are proprietatea lui Darboux.

Soluție alternativă: cum $f(0-0) = -1$ și $f(0+0) = 1$, rezultă că f are în origine o discontinuitate de

prima speță, deci f nu are proprietatea lui Darboux.

b) $\lim_{x \uparrow 0} \left(f\left(\frac{1}{x^2}\right) - f\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \lim_{x \uparrow 0} \left(\frac{1}{x^2} + 1 - \left(\frac{1}{x} - 1 \right) \right) = \lim_{x \uparrow 0} \left(2 + \frac{1-x}{x^2} \right) = +\infty$.

c) $\lim_{x \uparrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \uparrow 0} \left(1 - \frac{1}{x} \right) = \infty$ și $\lim_{x \downarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \downarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \infty$, deci f are derivată în

$x = 0$ și $f'(0) = \infty$.

27. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{xe^x} \right) = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = 0 \Rightarrow y = x$ este asimptotă la

graficul lui f spre $-\infty$. b) $f'(x) = 1 + e^x > 0$, $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ este strict crescătoare $\Rightarrow f$ este injectivă.

Cum f are proprietatea lui Darboux și $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, rezultă că $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă.

c) Folosind teorema de derivare a funcției inverse obținem: $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$.

28. a) $|f(x)| = x^2 \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq x^2$, $\forall x \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. b) Funcția f este derivabilă pe \mathbb{R}^* și

$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$. Deoarece $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ (cu criteriul

majorării), rezultă că f este derivabilă în origine și $f'(0) = 0$. Așadar, f este derivabilă pe \mathbb{R} .

c) Fie V o vecinătate a lui 0. Este suficient să arătăm că există $a, b, c \in V$, $a < b < c$ cu

$f(a) < f(b) > f(c)$. Fie șirurile $u_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} - 2n\pi}$ și $v_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}$, $n \geq 1$. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$,

există un rang $N \geq 1$ astfel încât $u_n, v_n \in V$ pentru $n \geq N$. Luând $a = u_N$, $b = 0$ și $c = v_N$, rezultă că

f nu este monotonă pe V .

29. a) Din faptul că $|\arctg x| < \frac{\pi}{2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, rezultă că $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. Pentru a doua limită avem:

$\lim_{x \rightarrow \infty} xg(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctg \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\arctg y}{y} = 1$. b) $f'(x) + g'(x) = \frac{1}{x^2+1} + \left(-\frac{1}{x^2+1} \right) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$.

c) Conform unei consecințe a teoremei lui Lagrange, rezultă că $f + g$ este constantă pe fiecare din

intervalele $(-\infty, 0)$ și $(0, \infty)$, deci există $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\arctg x + \arctg \frac{1}{x} = \begin{cases} C_1, & x \in (-\infty, 0) \\ C_2, & x \in (0, +\infty) \end{cases}$.

Pentru $x = -1$ și $x = 1$ obținem $C_1 = -\frac{\pi}{2}$ și $C_2 = \frac{\pi}{2}$, deci $\arctg x + \arctg \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \cdot \operatorname{sgn}(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$.

30. a) $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$. b) Funcția $u: (0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x) = x \cos x - \sin x$ este derivabilă și $u'(x) = -x \sin x < 0$, $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, deci u este strict descrescătoare. Ca urmare,

$u(x) < u(0+0) = 0$, $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, de unde rezultă că $f'(x) < 0$, $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, deci f este strict descrescătoare. c) Deoarece f are proprietatea lui Darboux (fiind continuă), este descrescătoare, $f(0+0) = 1$ și $f(\frac{\pi}{2}-0) = \frac{2}{\pi}$, rezultă că $f\left(\left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right) = \left(\frac{2}{\pi}, 1\right)$.

31. a) $f'(x) = \frac{1-x}{x}$, $\forall x \in (0, \infty)$. Tabelul de variație al funcției este:

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	+++++	0	-----
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow -1$	$\searrow -\infty$

Funcția f este strict crescătoare pe $(0, 1]$ și strict descrescătoare pe $[1, \infty)$.

b) Condiția este echivalentă cu $a \geq \max_{x>0} f(x)$. Valoarea maximă a funcției este $f(1) = -1$; rezultă că $a \in [-1, \infty)$. c) Folosind șirul lui Rolle pentru funcția $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - m$, din tabelul

x	0	1	∞
$g(x)$	$-\infty$	$-m-1$	$-\infty$

obținem că ecuația $f(x) = m$ nu are soluții pentru $m \in (-1, \infty)$, are o singură soluție pentru $m = -1$ (pe 1) și două soluții pentru $m \in (-\infty, -1)$.

32. a) $f'(x) = \frac{x}{x+1}$, $\forall x > -1 \Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe $(-1, 0]$ și este strict crescătoare pe $[0, \infty)$. b) Tabelul de variație al funcției f este:

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	-----	0	+++++
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$

Cum f este continuă, obținem că $f(((-1, \infty))) = [0, \infty)$. c) Deoarece $f(x) > 0$ pentru orice $x > 0$, prin inducție obținem $a_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Șirul $(a_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător întrucât $a_{n+1} - a_n = -\ln(1 + a_n) < 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Fiind descrescător și mărginit inferior de 0, șirul este convergent. Dacă $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, trecând la limita în relația de recurență rezultă $a = a - \ln(1 + a)$, de unde $a = 0$.

33. a) f este derivabilă pe \mathbb{R} și $f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} - \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-x+1}} \right) > 0$, deci f este strict crescătoare.

b) Întrucât f are proprietatea lui Darboux și $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{|x| \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right)} = \pm 1$, rezultă că $f(\mathbb{R}) = (-1, 1)$, deci f este surjectivă. c) Din b) rezultă că $x_n \in (-1, 1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Cum $x_1 < x_0$ și f este strict crescătoare, prin inducție se obține că $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător. Fiind monoton și mărginit, șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent.

34. a) $f'(x) = \ln x + 1$, $\forall x > 0 \Rightarrow f''(x) = \frac{1}{x} > 0$, $\forall x > 0$, deci f este convexă. b) Existența punctului c_n rezultă din teorema lui Lagrange aplicată funcției f pe intervalul $[n, n+1]$, $n \in \mathbb{N}^*$, iar unicitatea este asigurată de faptul că f' este strict crescătoare pe $(0, \infty)$. c) Avem $f(n+1) - f(n) = f'(c_n)$, de unde $c_n = \frac{n+1}{e} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. De aici rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$.

35. a) Pentru șirurile $a_n = (2n\pi)^2 \rightarrow \infty$ și $b_n = \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)^2 \rightarrow \infty$ avem $f(a_n) = 1 \rightarrow 1$ și $f(b_n) = 0 \rightarrow 0$, de unde rezultă că f nu are limita la $+\infty$. b) Pentru orice $x > 0$ avem $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{1 - \cos \sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2}$, de unde rezultă că $f'_d(0) = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = -\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y^2} = -\frac{1}{2}$.

c) Avem: $f(n+1) - f(n) = -2 \sin \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2} \sin \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2}$, de unde rezultă că:

$$|f(n+1) - f(n)| \leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2} \right| = 2 \left| \sin \frac{1}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \right| \rightarrow 0, \text{ deci } \lim_{n \rightarrow \infty} (f(n+1) - f(n)) = 0.$$

Soluție alternativă: Conform teoremei lui Lagrange, pentru orice $n \geq 1$, există $c_n \in (n, n+1)$ astfel încât $f(n+1) - f(n) = f'(c_n) = -\frac{\sin \sqrt{c_n}}{2\sqrt{c_n}}$. Întrucât $c_n \rightarrow \infty$, obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n+1) - f(n)) = 0$.

36. a) $f'(x) = \frac{\sqrt{x} \cdot (2 - \ln x)}{2x^2}$, $\forall x > 0$. b) $f'(x) > 0$, $\forall x \in (0, e^2)$ și $f'(x) \leq 0$, $\forall x \in [e^2, \infty)$, deci f este strict crescătoare pe $(0, e^2]$ și strict descrescătoare pe $[e^2, \infty)$. c) Deoarece $\ln 3^{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \ln 3$ și $\ln 3^{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \ln 3$ și, conform cu b), $f(3) < f(5) \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} < \frac{\ln 5}{\sqrt{5}}$, rezultă $\sqrt{5} \ln 3 < \sqrt{3} \ln 5 \Leftrightarrow 3^{\sqrt{5}} < 5^{\sqrt{3}}$.

$$37. a) x^\alpha f(x) = \frac{2x^\alpha}{\sqrt[3]{(x+2)^2} + \sqrt[3]{x(x+2)} + \sqrt[3]{x^2}} = \frac{2}{\left(\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}\right)^2 + \sqrt[3]{1+\frac{2}{x}} + 1} \cdot x^{\alpha-\frac{2}{3}}, \text{ pentru orice } x > 0.$$

Pentru $\alpha < \frac{2}{3}$ rezultă $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha f(x) = 0$, pentru $\alpha > \frac{2}{3}$ obținem $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha f(x) = +\infty$, iar dacă $\alpha = \frac{2}{3}$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha f(x) = \frac{2}{3}. b) f'(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{(x+2)^2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right), \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}; \text{ de unde obținem că } x = -1 \text{ este}$$

singurul punct de extrem al fracției f . c) Inegalitatea se scrie: $\sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{5} < \sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3} \Leftrightarrow f(5) < f(3)$. Folosim apoi faptul că $f'(x) < 0$, $\forall x > 0$, adică f este strict descrescătoare pe $(0, \infty)$.

38. a) $f'(x) = (x^2 + 2x)e^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$, deci punctele de extrem local ale funcției f sunt 0 și -2.

b) Egalitatea se probează prin inducție sau cu formula lui Leibniz.

$$c) \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n f^{(k)}(0) = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k-1)k = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(n+1)}{3} = \frac{n^2-1}{3n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n f^{(k)}(0) = \frac{1}{3}.$$

39. a) $f''(x) = -\lambda^2 \sin \lambda x$, $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x_k = \frac{k\pi}{\lambda}$, $k \in \mathbb{Z}$ sunt punctele de inflexiune ale funcției.

b) Inducție după n . c) sau $f^{(n)}(0) = \lambda^n \sin \frac{n\pi}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |f^{(n)}(0)| \leq |\lambda|^n \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(0) = 0$.

40. a) $f(n) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\} \Rightarrow \sum_{k=0}^n f(k) = 1 - \frac{1}{n+2} \rightarrow 1$. Se obține

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n f(k) \right)^n = \frac{1}{e}$. b) $f'(x) = -\frac{2x+3}{(x^2+3x+2)^2}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\} \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$ este singurul punct de extrem local al funcției f (maxim local).

c) $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+2)^{n+1}}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, de unde rezultă că

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} f^{(k)}(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2^{k+1}} - \frac{1}{3^{k+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}} \right) \right) = \frac{1}{2}$.

41. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x(f(x)-1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$. b) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$ și $f''(x) = \frac{(2x+1)e^{\frac{1}{x}}}{x^4}$.

Singurul punct de inflexiune al funcției f este $x_0 = -\frac{1}{2}$. c) Ecuația este echivalentă cu $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} - m = 0$.

Funcția $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} - m$ este derivabilă și $g'(x) = -\frac{(2x+1)e^{\frac{1}{x}}}{x^4}, \forall x \in \mathbb{R}^*$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$g'(x)$		0		
$g(x)$	$-m$	$4e^{-2} - m$	$-m$	$+\infty$

Cu șirul lui Rolle, deducem că ecuația are exact trei soluții reale dacă și numai dacă $m \in (0, 4e^{-2})$.

42. a) $f'(x) = \frac{x-1}{x} \cdot e^x, \forall x \in \mathbb{R}^*$. b) Funcția $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = f(x) - m$ este derivabilă și

$g'(x) = f'(x) = \frac{x-1}{x} \cdot e^x, \forall x \in \mathbb{R}^*$. Cu ajutorul șirului lui Rolle deducem că ecuația are exact două soluții reale dacă și numai dacă $m \in (e, \infty)$ (vezi tabelul de mai jos!)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		1	0	
$g(x)$	$-\infty$	$-m$	$e - m$	$+\infty$

c) $f(x) > 0, \forall x > 0 \Rightarrow a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ (inducție) $\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = e^{\frac{1}{a_n}} > 1, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (a_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător. Deci $(a_n)_{n \geq 0}$ are limită. Dacă $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, atunci $0 < a_n \leq +\infty$. Dacă am avea $l \in (0, \infty)$,

prin trecere la limită în relația de recurență ar rezulta că $l = ke^{\frac{1}{l}} = 1$, ceea ce nu este posibil. Deci

$l = +\infty$. Prin urmare, $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_n) - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{a_n}} - 1}{\frac{1}{a_n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

43. a) Deoarece $\{x\} = x, \forall x \in (0, 1)$, rezultă că $\lim_{x \uparrow 1} f(x) = \lim_{x \uparrow 1} x(1-x) = 0$. b) Explicitând funcția f ,

obținem $f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \in [0, 1) \\ (x-1)(2-x), & x \in [1, 2] \\ (x-2)(3-x), & x \in [2, 3] \end{cases}$. Se arată ușor că f este continuă pe $[0, 3]$. c) Cu definiția,

sau folosind corolarul teoremei lui Lagrange, se obține că f nu este derivabilă în $x = 1$ și $x = 2$.

44. a) Funcția f este derivabilă pe $[-1, 1]$ și $f'(x) = e^x(\sin x + \cos x), \forall x \in [-1, 1]$. Și funcția f' este derivabilă pe $[-1, 1]$, deci f este de două ori derivabilă. Cum $f(0) = 0, f'(0) = 1$, rezultă că $f \in \mathcal{M}$.

b) Rezultă din $(1+f(x))^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+f(x))}{x}}$ și $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+f(x))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1+f(x)} = \frac{f'(0)}{1+f(0)} = f'(0)$ (cu

regula lui L'Hospital). c) Avem $\frac{f''(x) - x^n}{x^{n+1}} = \frac{f(x) - x}{x^{n+1}} \cdot \sum_{k=1}^n f^{(n-k)}(x) \cdot x^{k-1} = \frac{f(x) - x}{x^2} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\frac{f(x)}{x} \right)^{n-k}$.

Întrucât $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 1}{2x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2}$ (cu regula lui L'Hospital) și

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = f'(0) = 1$, obținem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - x^n}{x^{n+1}} = \frac{nf''(0)}{2}$.

45. a) Dacă $x \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, atunci $|f(x)| = |x|$. Dacă $x \in [-1, 1] \setminus \mathbb{Q}$, atunci $|f(x)| = |x|^3 \leq |x|$, întrucât $|x| \cdot (1 - |x|^2) \geq 0, \forall x \in [-1, 1]$. b) Deoarece $0 \leq |f(x)| \leq |x|$, prin trecere la limită rezultă că

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, deci f este continuă în $x = 0$. c) Fie $g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x}, x \neq 0$.

Considerăm șirurile de termen general $x_n = \frac{1}{n}$ și $y_n = \frac{\sqrt{2}}{n}$, ambele convergente la 0. Deoarece

$\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = 0$, folosind criteriul cu șiruri pentru limite de funcții, deducem că g nu are limită în $x = 0$, ceea ce este echivalent cu faptul că f nu are derivată în $x = 0$.

46. a) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, deci $y = 0$ este asimptotă orizontală. În plus, $\lim_{x \uparrow k} f(x) = -\infty, \lim_{x \downarrow k} f(x) = +\infty$,

adică dreapta $x = k$ este asimptotă verticală, $k = \overline{1, n}$. b) $f'(x) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{(x-k)^2} < 0$, deci f este strict

descrescătoare pe fiecare dintre intervalele $(-\infty, 1), (1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n), (n, +\infty)$. Întrucât $f((-\infty, 1)) = (-\infty, 0), f((k, k+1)) = \mathbb{R}$, pentru orice $k = \overline{1, n-1}$, și $f((n, +\infty)) = (0, +\infty)$, rezultă că ecuația $f(x) = a$ are n soluții dacă $a \neq 0$ și $n-1$ soluții dacă $a = 0$. c) Deoarece

$f''(x) = 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{(x-k)^3}$, rezultă că $f(k+0) = +\infty$ și $f(k+1-0) = -\infty$, pentru orice $k = \overline{1, n-1}$. Ca

urmare, $f''((k, k+1)) = \mathbb{R}$ și, cum f'' este funcție continuă, ecuația $f''(x) = 0$ are o soluție pe fiecare din intervalele $(k, k+1), k = \overline{1, n-1}$. Așadar f are $n-1$ puncte de inflexiune.

47. a) $f'(x) = -\frac{1}{x(x+1)} < 0, \forall x > 0 \Rightarrow f$ este strict descrescătoare, deci este injectivă. Cum f este descrescătoare, are proprietatea lui Darboux. Din $f(0+0) = +\infty$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, rezultă că

$\text{Im } f = (0, +\infty)$, deci f este surjectivă. b) $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(\ln 2))} = \frac{1}{f'(1)} = -2$.

c) $f(x) = \ln(x+1) - \ln x, \forall x > 0 \Rightarrow u_n = \frac{f(1) + f(2) + \dots + f(n)}{\ln(n^2 + 1)} = \frac{\ln(n+1)}{\ln(n^2 + 1)}, (\forall) n \geq 1$. Rezultă că

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x^2 + 1)} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x(x+1)} = \frac{1}{2}$.

48. a) $f(1+0) = -\infty \Rightarrow x = 1$ este asimptotă verticală la dreapta; $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \Rightarrow y = 0$ este

asimptotă orizontală la graficul lui f spre $+\infty$. **b)** $f'(x) = \frac{2}{x(x^2-1)} > 0, \forall x > 1$.

$$c) S_n := \sum_{k=2}^n f(k) = \ln \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \ln \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k}\right) = \ln \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2}\right) = \ln \frac{n+1}{2n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\ln 2.$$

49. a) $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}, x \neq 0$; Funcția f este strict descrescătoare pe intervalele $(-\infty, 0)$ și $(0, 1)$ și

este strict crescătoare pe $(1, \infty)$. **b)** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, deci f nu admite asimptotă la $+\infty$.

Cum $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$. Deoarece $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ și $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, dreapta $x = 0$ este asimptotă verticală. **c)** Pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, există $c_n \in (n, n+1)$

asa încât $f(n+1) - f(n) = f'(c_n) = \frac{(c_n-1)e^{c_n}}{c_n^2}$ (teorema lui Lagrange). Cum $n < c_n < n+1$, deducem

$$\frac{(n-1)e^n}{(n+1)^2} < \frac{(c_n-1)e^{c_n}}{c_n^2} < \frac{ne^{n+1}}{n^2}. \text{ Folosind criteriul cleștelui, rezultă că } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(f(n+1) - f(n)) = +\infty.$$

50. a) f este continuă pe \mathbb{R}^* (operații cu funcții elementare!). Cum $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = f(0)$, rezultă că f este continuă și în origine. Prin urmare, f este continuă pe \mathbb{R} .

b) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2}$. **c)** Funcția f este derivabilă pe \mathbb{R}

și $f'(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2}$, dacă $x \neq 0$. Aplicând teorema lui Lagrange pe intervalul $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$, rezultă

că există $c_n \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$ așa încât $f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)f'(c_n) = \frac{1}{n(n+1)}f'(c_n)$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} f'(c_n) = \frac{1}{2} \text{ pentru că } c_n \rightarrow 0 \text{ și } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \frac{1}{2}.$$

51. a) $f(x) = 0, \forall x > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. **b)** Pe mulțimea $A = \mathbb{R} \setminus \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$, care este

reuniunea de intervale deschise, funcția este nulă și, prin urmare, continuă și derivabilă. În punctele $\frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^*)$, f este discontinuă deoarece limitele laterale sunt nule, iar valoarea funcției este $\frac{1}{n}$.

Studiem continuitatea în punctul $x_0 = 0$. Pentru orice $x \in \mathbb{R}$ avem $|f(x)| \leq |x|$, de unde rezultă că $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, deci f este continuă în origine. Așadar, f este continuă pe mulțimea $A \cup \{0\}$.

c) Nefiind continuă cu punctele $\frac{1}{n}$, funcția f nu este derivabilă în aceste puncte. Arătăm că f nu este

derivabilă în $x_0 = 0$. Pentru aceasta considerăm șirurile $u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ și $v_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \rightarrow 0$. Cum

$$\frac{f(u_n) - f(0)}{u_n - 0} = \frac{\frac{1}{n} - 0}{\frac{1}{n} - 0} = 1 \rightarrow 1 \text{ și } \frac{f(v_n) - f(0)}{v_n - 0} = \frac{0 - 0}{\frac{\sqrt{2}}{n} - 0} = 0 \rightarrow 0, \text{ deducem că } f \text{ nu este derivabilă în}$$

origine. Deci f este derivabilă pe A .

52. a) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0 \Rightarrow y = 0$ (axa Ox) este asimptotă orizontală la graficul lui f spre $\pm\infty$.

b) $f''(x) = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ sunt punctele de inflexiune ale funcției f .

c) Prin inducție după n se arată că $f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2}$, unde $P_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție polinomială

de grad n cu coeficientul dominant $(-1)^n \cdot 2^n$. Prin urmare, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2} f^{(n)}(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{x^n} = (-1)^n \cdot 2^n$.

53. a) $f(1-0) = -\infty$ și $f(1+0) = +\infty \Rightarrow x = 1$ este asimptotă verticală la stânga și la dreapta.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = 1 \Rightarrow y = x + 1$ este asimptotă oblică la graficul lui f spre $\pm\infty$.

b) $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Tabelul de variație este:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	++	++++	0	----	++
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	0	\searrow	$+\infty$

Punctele de extrem local ale funcției f sunt 0 (punct de maxim local) și 2 (punct de minim local).

c) Funcția $u: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, u(x) = \frac{1}{x-1}$ este indefinit derivabilă și $u^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}, \forall x \neq 1$, pentru

orice $n \in \mathbb{N}^*$. Având în vedere că $f(x) = x + 1 + u(x)$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, obținem:

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} f^{(k)}(3) = 3 + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} u^{(k)}(3) = 3 + \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}} = 3 + \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} f^{(k)}(3) = 4.$$

54. a) $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}, \forall x > 0$. Valoarea minimă a funcției este 2 , și se atinge în punctul $x = 1$.

b) $f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0, \forall x > 0 \Rightarrow f$ este convexă. **c)** $f(x) > 0, \forall x > 0 \Rightarrow a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Deoarece

$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n} > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, rezultă șirul este strict crescător, deci are limită. Dacă $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, atunci

$0 < l \leq +\infty$. Nu putem avea $l \in \mathbb{R}_+^*$, pentru că ar rezulta $l = l + \frac{1}{l}$, adică $\frac{1}{l} = 0$, ceea ce nu este

posibil. Deci $l = +\infty$ și atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n^2}\right) = 1$.

55. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 3x^2 + 4x + 3}{x^3 + x + 1} = 1$. **b)** $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, de unde rezultă că f

este strict crescătoare, deci este injectivă. Cum f este continuă și $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, rezultă că

$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă. În consecință, f este bijectivă, deci este inversabilă. **c)** Pentru orice

$x > 1$ avem $f(\sqrt[3]{x}) = x + \sqrt[3]{x} + 1 > x$ și $f(\sqrt[3]{x} - 1) = x - (3(\sqrt[3]{x})^2 - 4\sqrt[3]{x} + 1) < x$. Cum f^{-1} este

crescătoare, rezultă $\sqrt[3]{x} - 1 < f^{-1}(x) < \sqrt[3]{x} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x}} < \frac{f'(x)}{\sqrt[3]{x}} < 1, \forall x > 1$, de unde $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(x)}{\sqrt[3]{x}} = 1$.

56. a) $f(x) - x = x \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = \frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}{x} \cdot \ln x, \forall x > 0$. Cum $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$, rezultă că

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1 \text{ și } \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \infty.$$

b) $f(x) = e^{\left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln x} \Rightarrow f'(x) = f(x) \cdot \left(\frac{(x+1) \ln x}{x} \right)' = f(x) \cdot \frac{x+1 - \ln x}{x^2} = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{x+1 - \ln x}{x}, \forall x > 0$.

c) Conform teoremei lui Lagrange aplicată funcției f pe intervalul $[x, x+1], x > 0$, există $c_x \in (x, x+1)$ astfel încât $f(x+1) - f(x) = f'(c_x)$. Calculăm $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$. Deoarece

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^0 = 1 \text{ și } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1 - \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) = 1, \text{ deducem că } \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1.$$

Întrucât $\lim_{x \rightarrow \infty} c_x = \infty$, rezultă că $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x+1) - f(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(c_x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$.

57. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x} = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = -\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y} = 0 \Rightarrow y = x$ este asimptotă oblică la graficul lui f spre $+\infty$.

b) Din teorema lui Lagrange aplicată funcției f pe intervalul $[x, x+1], x > 1$, rezultă existența unui punct $c_x \in (x, x+1)$ astfel încât $f(x+1) - f(x) = f'(c_x)$. Cum $f'(x) = \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ și $0 < \frac{1}{x} < 1$ pentru $x > 1$, rezultă că $0 < f'(x) \leq 1 + \frac{1}{x} < 2$ pentru orice $x > 1$, de unde se obține concluzia.

c) Aplicăm din nou teorema lui Lagrange funcției f pe intervalul $[n, n+1], n \geq 1$; există $d_n \in (n, n+1)$ astfel încât $f(n+1) - f(n) = f'(d_n)$. Cum $d_n \rightarrow \infty$, obținem că $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n+1) - f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(d_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$.

58. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow y = x + \frac{\pi}{2}$ este asimptotă oblică a graficului funcției f spre $+\infty$. Asemănător, dreapta $y = x - \frac{\pi}{2}$ este asimptotă oblică a graficului funcției f spre $-\infty$.

b) Funcția f este derivabilă, bijectivă și $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2 + 1} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Aplicând teorema de derivare a funcției inverse obținem: $(f^{-1})' \left(1 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{f' \left(f^{-1} \left(1 + \frac{\pi}{4} \right) \right)} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{3}$.

c) Având în vedere că $f(x) > 0$, oricare ar fi $x > 0$, prin inducție obținem $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Din $a_{n+1} - a_n = \arctg a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, rezultă că șirul $(a_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător, deci are limită. Fie $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, 0 < l \leq +\infty$. Dacă $l \in \mathbb{R}$, prin trecere la limita în relația de recurență obținem $l = l + \arctg l$, adică $l = 0$, contradicție. Deci $l = \infty$.

59. a) Din relația $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, prin inducție obținem $a_n \in (0, 1), \forall n \in \mathbb{N}^*$. **b)** Avem $a_{n+1} - a_n = -a_n^2 < 0, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow (a_n)_{n \geq 1}$ este strict descrescător. **c)** Fiind monoton și mărginit, șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este convergent. Fie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n (0 \leq a < 1)$. Trecând la limita în relația de recurență rezultă

$a = a - a^2$, deci $a = 0$. Cum $a_k^2 = a_k - a_{k+1}, \forall k \in \mathbb{N}$, obținem $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = a_1 - a_{n+1} \rightarrow a_1$.

60. a) f are proprietatea lui Darboux și $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \Rightarrow f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \Rightarrow f$ este surjectivă. Cum $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$, rezultă că f este strict crescătoare, deci este injectivă. Concluzia se obține din faptul că f este bijectivă. **b)** Cu teorema de continuitate a funcției inverse obținem $x_n = f^{-1} \left(\frac{n+1}{n} \right) \rightarrow f^{-1}(1) = 1$. **c)** Folosind teorema de derivabilitate a funcției inverse avem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(u_n - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{-1} \left(\frac{n+1}{n} \right) - f^{-1}(1)}{\frac{n+1}{n} - 1} = (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}.$$

61. a) Deoarece $f'(x) = 1 + e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, rezultă că f este strict crescătoare, deci este injectivă. Cum $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ și f are proprietatea lui Darboux, deducem că $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci funcția este surjectivă. Funcția f fiind bijectivă, oricare ar fi $n \geq 1$, există $x_n \in \mathbb{R}$ astfel încât $f(x_n) = \frac{n+1}{n}$.

b) Folosind continuitatea funcției inverse obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1} \left(\frac{n+1}{n} \right) = f^{-1}(1) = 0$. Pentru orice $n \geq 1$ avem $nx_n = \frac{f^{-1} \left(\frac{n+1}{n} \right) - f^{-1}(1)}{\frac{n+1}{n} - 1}$. Din teorema de derivare a funcției inverse rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

c) Propoziția se rescrie sub forma $e^x - (a-1)x - 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Considerând funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = e^x - (a-1)x - 1$, avem $g(x) \geq g(0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$, de unde, conform teoremei lui Fermat, rezultă că $g'(0) = 0$, adică $a = 2$. Pentru $a = 2$ obținem $e^x \geq x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$, propoziția adevărată.

62. a) $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$. Cum f are proprietatea lui Darboux, deducem că $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă. Apoi, $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ este crescătoare. Dacă ar exista $a < b$ astfel încât $f(a) = f(b)$, atunci $f(x) = f(a), \forall x \in [a, b]$, de unde $f'(x) = 0, \forall x \in [a, b]$, contradicție. Deci f este strict crescătoare. Concluzia se obține din faptul că f este bijectivă.

b) Din continuitatea funcției inverse, avem $x_n = f^{-1} \left(\frac{1}{n} \right) \rightarrow f^{-1}(0) = 0$. **c)** Cu teorema de derivare a funcției inverse, obținem: $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{-1} \left(\frac{1}{n} \right) - f^{-1}(0)}{\frac{1}{n} - 0} = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$.

63. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \ln(1+x) \right)^{\frac{1}{x}} = 1 + \ln e = 2$. **b)** Cum $f'(x) = 1 + \frac{1}{x+1} > 0, \forall x \geq 0$, rezultă că f este strict crescătoare, deci este injectivă. Întrucât f are proprietatea lui Darboux (fiind continuă), $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ și f este crescătoare, rezultă că $f([0, \infty)) = [0, \infty)$, deci funcția este surjectivă. **c)** Funcția f fiind bijectivă, rezultă că șirul $(a_n)_{n \geq 0}$ este bine definit. Demonstrăm prin inducție că $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Într-adevăr, din ipoteză avem $a_0 > 0$, iar dacă $a_n > 0$, atunci $a_{n+1} = f^{-1}(a_n) > f^{-1}(0) = 0$ (pentru că f^{-1} este strict crescătoare). Din faptul că $a_n - a_{n+1} = \ln(1 + a_{n+1}) > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, rezultă că $(a_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător. Fiind descrescător și

mărginit inferior de 0, șirul este convergent. Dacă $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ($0 \leq l < \infty$), trecând la limită în relația de recurență rezultă $l + \ln(1+l) = l$, de unde obținem $l = 0$. Din relația $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\ln(1+a_{n+1})}{a_{n+1}} = 1 + \ln(1+a_{n+1})^{\frac{1}{a_{n+1}}}$ deducem că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \ln e = 2$.

Soluție alternativă. Cum $a_n \rightarrow 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_{n+1})}{a_{n+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$

64. a) Imaginea funcției $x \rightarrow \log_2 x$, $x \in (0, \infty)$ este \mathbb{R} , de unde rezultă că $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}$.

b) Avem: $f(x) = k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in [2^k, 2^{k+1})$. Deoarece $f(2^k - 0) = k - 1$ și $f(2^k + 0) = k$, rezultă că f este discontinuă în fiecare punct al mulțimii $\{2^k | k \in \mathbb{Z}\}$. Din faptul că $f(x) = k, \forall x \in (2^k, 2^{k+1})$, rezultă că f este continuă pe $(2^k, 2^{k+1}), k \in \mathbb{Z}$. Prin urmare, mulțimea punctelor de continuitate ale funcției este $(0, \infty) \setminus \{2^k | k \in \mathbb{Z}\}$.

c) Avem: $\frac{1}{2^n} \leq 2^k \leq 1 \Leftrightarrow k \in [-n, 0] \cap \mathbb{Z}$. Punctele de discontinuitate ale funcției f din intervalul

$\left[\frac{1}{2^n}, 1\right]$ sunt: $\frac{1}{2^{n-1}}, \frac{1}{2^{n-2}}, \dots, 1$. Rezultă că $\tau_n = \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \rightarrow 2$.

65. a) Cum $n^\alpha (f(n+1) - f(n)) = \frac{2n^\alpha}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{2n^{\alpha-\frac{1}{2}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1}, \forall n \geq 1$, rezultă că limita cerută este

egală cu 0 dacă $\alpha < \frac{1}{2}$, cu 1 dacă $\alpha = \frac{1}{2}$ și cu $+\infty$ dacă $\alpha > \frac{1}{2}$. **b)** Funcția f îndeplinește condițiile din teorema lui Lagrange pe intervalul $[k, k+1], k \in \mathbb{N}^*$. Atunci există $c_k \in (k, k+1)$ astfel încât $f(k+1) - f(k) = f'(c_k) = \frac{1}{\sqrt{c_k}}$. Cum $c_k \in (k, k+1)$, rezultă $\frac{1}{\sqrt{k+1}} < \frac{1}{\sqrt{c_k}} < \frac{1}{\sqrt{k}}$, de unde obținem

$\frac{1}{\sqrt{k+1}} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{\sqrt{k}}$. **c)** $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} < 0, \forall n \geq 1$,

deci $(x_n)_{n \geq 1}$ e strict descrescător. Din **b)** rezultă și $f(n+1) - f(1) = \sum_{k=1}^n (f(k+1) - f(k)) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Prin urmare, $x_n > 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - 2 > -2, \forall n \geq 1$, deci șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este mărginit inferior de -2 .

66. a) Funcția f este derivabilă și $f'(x) = 3(x^2 + 1) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci f este strict crescătoare. Cum f este continuă și $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, rezultă că $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă. Funcția f fiind bijectivă, pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$ există un singur număr real $u(\lambda)$, astfel încât $f(u(\lambda)) = \lambda$. De aici rezultă că $u = f^{-1}$. **b)** Din teorema de derivare a funcției inverse rezultă că u este derivabilă pe \mathbb{R} și

$u'(\lambda) = \frac{1}{f'(u(\lambda))} = \frac{1}{3(u^2(\lambda) + 1)}, \forall \lambda \in \mathbb{R}$. **c)** $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u(\lambda)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u(\lambda) - u(0)}{\lambda - 0} = u'(0) = \frac{1}{3(u^2(0) + 1)} = \frac{1}{3}$.

67. a) Demonstrăm prin inducție. Conform ipotezei avem $a_1 \in (0, 1)$. Dacă $a_n \in (0, 1)$, din relația $a_{n+1} = 1 - a_n(1 - a_n)$, rezultă că $a_{n+1} \in (0, 1)$. Deci $a_n \in (0, 1), \forall n \in \mathbb{N}^*$. **b)** $a_{n+1} - a_n = (a_n - 1)^2 > 0, \forall n \geq 1$, deci $(a_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător. **c)** Fiind monoton și mărginit, șirul este convergent. Dacă

$l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, trecând la limită în relația de recurență obținem $l = l^2 - l + 1$, adică $(l-1)^2 = 0$, deci $l = 1$. Din relația $a_n = \frac{1 - a_{n+1}}{1 - a_n}$ obținem $a_1, a_2, \dots, a_n = \frac{1 - a_2}{1 - a_1} \cdot \frac{1 - a_3}{1 - a_2} \cdot \dots \cdot \frac{1 - a_{n+1}}{1 - a_n} = \frac{1 - a_{n+1}}{1 - a_1}$, de unde rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$.

68. a) În orice punct $x_0 \in \mathbb{R}^*$ avem $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, deci f este continuă pe \mathbb{R}^* . Cum

$|f(x)| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$, pentru orice $x \in \mathbb{R}^*$, rezultă că $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, deci f este continuă și

în origine. **b)** $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \sin \frac{1}{x}, \forall x \in \mathbb{R}^*$. Cum funcția $x \rightarrow \sin \frac{1}{x}, x \in \mathbb{R}^*$ nu are limita în $x_0 = 0$, rezultă că f nu este derivabilă în acest punct (nu are nici măcar derivată).

c) $|f(x)| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow |x_{n+1}| = |f(x_n)| \leq |x_n|, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (|x_n|)_{n \geq 0}$ este descrescător. Fiind mărginit inferior de 0, șirul este convergent. Fie $l = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$. Întrucât f este continuă și $f(|x|) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$,

rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(|x_n|) = f(l)$.

69. a) $f'(x) = -e^{-x} + 2nx - 2, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f''(x) = e^{-x} + 2n > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f_n$ este convexă.

b) Arătăm că ecuația $f_n(n) = 0$ are cel mult două soluții reale și distincte. Într-adevăr, dacă ecuația are trei soluții reale $a < b < c$, aplicând teorema lui Rolle funcției f_n pe fiecare dintre intervalele $[a, b]$ și $[b, c]$, ar rezulta că există $\alpha \in (a, b)$ și $\beta \in (b, c)$ astfel încât $f'_n(\alpha) = f'_n(\beta) = 0$. Aplicând teorema lui Rolle funcției f'_n pe intervalul $[\alpha, \beta]$, obținem că există $\gamma \in (\alpha, \beta)$ astfel

încât $f''_n(\gamma) = 0$, adică $e^{-\gamma} + 2n = 0$, contradicție. Se observă că 0 este soluție a ecuației. Cum

$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \left(e^{-\frac{1}{n}} - 1\right) - \frac{1}{n} < 0$ și $f_n\left(\frac{1 + \sqrt{1+n}}{n}\right) = e^{\frac{1 + \sqrt{1+n}}{n}} > 0$, continuitatea funcției f_n implică faptul

că pentru fiecare $n \geq 1$ există $x_n \in \left(\frac{1}{n}, \frac{1 + \sqrt{1+n}}{n}\right)$ astfel încât $f_n(x_n) = 0$. **c)** Din $f(x_n) = 0$ obținem

$nx_n = 2 + \frac{e^{-x_n} - 1}{-x_n}$. Întrucât $x_n \rightarrow 0$, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 3$.

70. a) $f'(x) = nx^{n-1} + \frac{1}{x} > 0, \forall x > 0 \Rightarrow f_n$ este strict crescătoare $\Rightarrow f_n$ este injectivă. Întrucât

$f_n(0+0) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ și f este continuă, rezultă că $f((0, \infty)) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă.

Funcția f_n fiind bijectivă, există un singur număr real $x_n > 0$ astfel încât $f_n(x_n) = 0$. Cum $f_n(0+0) = -\infty$ și $f_n(1) = 1$, deducem că $x_n \in (0, 1)$. **b)** Dacă ar exista $n \geq 1$ astfel încât $x_n \geq x_{n+1}$,

atunci $0 = x_n^n + \ln x_n \geq x_n^n + \ln x_{n+1} \geq x_{n+1}^n + \ln x_{n+1} > x_{n+1}^{n+1} + \ln x_{n+1} = 0$, absurd. Deci $x_n \leq x_{n+1}, \forall n \geq 1$.

c) Fiind monoton și mărginit, șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent. Fie $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Din cele de mai sus deducem că $\lambda \in (0, 1]$. Presupunând $0 < \lambda < 1$, deoarece $x_n < \lambda$, rezultă $x_n^n < \lambda^n$ și $\ln x_n < \ln \lambda$, deci

$0 = x_n^n + \ln x_n < \lambda^n + \ln \lambda$, de unde $\ln \lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda^n + \ln \lambda) \geq 0$, adică $\lambda \geq 1$, absurd. Deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

Tema 3.2. Primitive.

1. a) $F'(x) = (2x+1)e^{2x} - 2(x^2+x+1)e^{2x} = f(x)$.
 b) Cum $F'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow F$ este strict descrescătoare pe \mathbb{R} .
 c) $F''(x) = (-4x)e^{-2x} - 2(-2x^2-1)e^{-2x} = (4x^2-4x+2)e^{-2x} > 0$, deci F este convexă pe \mathbb{R} .
2. a) $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}(\ln x - 2) + 2\sqrt{x} \frac{1}{x} = f(x), \forall x \in (0, +\infty)$.
 b) Fie G o primitivă oarecare a lui f . Deci $G'(x) = f(x) > 0, \forall x \in (1, +\infty) \Rightarrow G$ este crescătoare pe $[1, +\infty)$.
 3. a) Se verifică că $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
 b) Fie G o primitivă oarecare a lui f . $G'(x) = \frac{1}{x^2+x+1} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow G$ este crescătoare.
 c) Fie G o primitivă oarecare a lui f , din b) g este strict crescătoare, deci este injectivă.
 $G(x) = F(x) + a$, deci $\text{Im } G = \left[-\frac{\sqrt{3}\pi}{3} + a, \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + a \right]$, deci G nu este surjectivă.
 d) $F''(x) = -\frac{2x+1}{(x^2+x+2)^2} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ punct de inflexiune.
4. $F'(x) = e^x(x^2+3x+a) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \Delta = 9-4a \leq 0 \Rightarrow a \in \left[\frac{9}{4}, +\infty \right)$.
 b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)-F(1)}{x^2-1} = \frac{1}{2}F'(1) = \frac{e(4+a)}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{2e} - 4$.
 c) Ecuația $F''(x) = 0$ are două soluții distincte, deci $x^2+5x+a+3=0 \Rightarrow \Delta = 13-4a > 0 \Rightarrow a \in \left(-\infty, \frac{13}{4} \right)$.
5. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)-F(0)}{x} = F'(0) = a = 1$
 b) $F'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow a > 0$ și $\Delta = 16-4a^2 \leq 0$. Deci $a \in [2, +\infty)$
 c) $F''(x) = f'(x) = e^{-x}(-ax^2+2x(a-2)+4-a)$ cu $\Delta = 16 > 0$.
6. $F'(x) = 3^{-x}(a-ax \ln 3 - b \ln 3) = x3^{-x} \Rightarrow a = -\frac{1}{\ln 3}, b = \frac{a}{\ln 3} = -\frac{1}{\ln^2 3}$.
7. $F'(x) = a\sqrt{3x+1} + (ax+b) \frac{3}{2\sqrt{3x+1}} = \sqrt{3x+1} \Rightarrow 9ax+3b+2a = 6x+2 \Rightarrow a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{9}$.
8. a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)-F(1)}{x^2-1} = \frac{1}{2}f(1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 b) $F'(x) = f(x) = x\sqrt{x+1}$, deci f e strict descrescătoare pe $(-1, 0]$ și strict crescătoare pe $[0, +\infty)$.

$$c) F'(x) = f(x) = (2ax+b)\sqrt{x+1} + \frac{ax^2+bx+c}{2\sqrt{x+1}} = x\sqrt{x+1} \Rightarrow$$

$$5ax^2 + (4a+3b)x + 2b+c = 2x^2 + 2x \Rightarrow a = \frac{2}{5}, b = \frac{2}{15}, c = \frac{-4}{15}.$$

9. a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)-F(1)}{x-1} = f(1) = 0$. b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2 x = +\infty$. c) $F'(x) = a \ln^2 x + (b+2a) \ln x + b+c = \ln^2 x \Rightarrow a=1, b=-2, c=2$.
10. $F'(x) = 2ax \cos x - \sin x(ax^2+b) + c(\sin x + x \cos x) = x^2 \sin x \Rightarrow a=-1, b=c, 2a+c=0$, deci $b=c=2$.
11. Funcția admite primitive și cum nu poate avea discontinuități de speța I, ea trebuie să fie continuă, deci $f_s(0) = f(0) = f_d(0) \Rightarrow a=b=1$.
12. Funcția f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Trebuie arătat că f este continuă într-un punct oarecare $n \in \mathbb{Z}$.
 $f_s(n) = \lim_{x \nearrow n} (x-(n-1))(1-[x-(n-1)]) = 0$; $f_d(n) = \lim_{x \searrow n} (x-n)(1-(x-n)) = 0$; $f(n) = 0$,
 de unde rezultă continuitatea lui f , deci f admite primitive.
13. Funcția f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Arătăm că f este continuă într-un punct oarecare $n \in \mathbb{Z}$.
 $f_s(n) = \lim_{x \nearrow n} (x-(n-1)) \cos \frac{(1+2x)\pi}{2} = 0$;
 $f_d(n) = \lim_{x \searrow n} (x-n) \cos \frac{(1+2x)\pi}{2} = 0$; $f(n) = 0$, de unde rezultă continuitatea lui f .
14. Dacă F este primitivă unei alte funcții $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, rezultă că F este funcție derivabilă. F este continuă pe \mathbb{R} . $F'(x) = \begin{cases} 4x^3+1 & \text{pentru } x < 0 \\ \frac{2x}{x^2+1} + a & \text{pentru } x > 0 \end{cases}$, deci $a=1$.
15. Dacă G este primitivă unei alte funcții $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, rezultă că G este funcție derivabilă. Din continuitatea în $x_0=1$ găsim $b=1$, iar din derivabilitatea în $x_0=1$ găsim $a=0$.
16. Funcția F este derivabilă pe \mathbb{R} . Din continuitatea în $x_0=0$ găsim $a=c=0$, iar din derivabilitatea în $x_0=0$ găsim $b=1$.
17. F este funcție derivabilă. $F_s(1) = a+b = F_d(1) = 1$. $F'_s(1) = a = F'_d(1) = 0 \Rightarrow b=1$.
18. $f_s(0) = 0 = f_d(0) = b$ și $f'_s(0) = a-1 = f'_d(0) = 1 \Rightarrow a=2$.
19. Avem $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = 0$ pentru $\alpha \in (0, +\infty)$, deci funcția f admite primitive pentru $\alpha \in (0, +\infty)$.
20. a) $f(x) = \begin{cases} \frac{\arctg x}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$ admite primitive pentru $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.
 b) Pentru $f(0)=1$ funcția admite primitive (pentru că este continuă) și $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{I}$ (pentru că x și $\arctg x$ au același semn).

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

21. a) f este continuă pe $(0, +\infty)$ și pe $(-\infty, 0]$; $f_s(0) = f(0) = 0$, iar $f_d(0) = \lim_{x \searrow 0} (x \ln x + \sin x) = 0$. Deci f este continuă pe \mathbb{R} .

b) f este continuă pe \mathbb{R}^* (funcție elementară) și $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$, deci f este continuă pe \mathbb{R} , deci admite primitive.

c) f este continuă pe $(0, +\infty)$ și pe $(-\infty, 0]$; $f_s(0) = f(0) = 0 = f_d(0)$. Deci f este continuă pe \mathbb{R} .

22. Fiecare dintre funcțiile are câte un punct de discontinuitate de speța a I-a, deci nu admite primitive.

a) $f_s(0) = 0 \neq f_d(0) = 1$, deci $x_0 = 0$ este punct de discontinuitate de speța a I-a.

Pentru b) $x_0 = 2$ și pentru c) $x_0 = 0$ sunt puncte de discontinuitate de speța a I-a.

$$23. a) \int (f(x) + f'(x))e^x dx = e^x \cdot f(x) + C.$$

$$b) \int \left(f'(x) \cdot \arctg x + \frac{f(x)}{x^2 + 1} \right) dx = f(x) \cdot \arctg x + C.$$

$$c) \int \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} dx = \int \frac{e^x f'(x) - e^x f(x)}{e^{2x}} dx = \frac{f(x)}{e^x} + C.$$

$$d) \int (\sin x \cdot f'(x) + \cos x \cdot f(x)) dx = f(x) \cdot \sin x + C.$$

$$e) \int (\sin x \cdot f(x) - \cos x \cdot f'(x)) dx = -f(x) \cdot \cos x + C.$$

$$f) \int \frac{e^x f(x) - e^x f'(x)}{f^2(x)} dx = \frac{e^x}{f(x)} + C.$$

$$g) \int (f'(x) f^2(x)) dx = \frac{1}{3} f^3(x) + C.$$

$$24. a) \int (f''(x) + f'(x))e^x dx = e^x \cdot f'(x) + C.$$

$$b) \int (-f'(-x) + f(-x))e^x dx = e^x f(-x) + C.$$

$$c) \int \frac{f''(x) - f'(x)}{e^x} dx = \int \frac{e^x f''(x) - e^x f'(x)}{e^{2x}} dx = \frac{f'(x)}{e^x} + C.$$

$$d) \int ((f')^2(x) + f(x) f''(x)) dx = f'(x) f(x) + C.$$

$$e) \int \frac{f''(x) f(x) - (f')^2(x)}{f^2(x)} dx = \frac{f'(x)}{f(x)} + C.$$

$$25. a) \int f_1(x) dx = \int \frac{x}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) + C,$$

$$\int f_3(x) dx = \int \frac{x^3}{x^2 + 4} dx = \int \left(x - \frac{4x}{x^2 + 4} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 2 \ln(x^2 + 4) + C.$$

b) Fie F_4 o primitivă a lui f_4 ; $F_4'(x) = \frac{x^4}{x^2 + 4} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci F_4 este injectivă.

$$f_4(x) = \frac{x^4}{x^2 + 4} = x^2 - 4 + \frac{16}{x^2 + 4} \Rightarrow F_4(x) = \frac{x^3}{3} - 4x + 8 \arctg x + c, c \in \mathbb{R}. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_4(x) = +\infty \quad \text{și}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_4(x) = -\infty \quad \text{și cum } F_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ este continuă, rezultă surjectivitatea.}$$

c) Fie F o primitivă oarecare a lui f_n . Dacă n este număr par $F'(x) = f_n(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow F$ este injectivă.

Dacă n este impar $F'(x) > 0, \forall x \in (0, +\infty)$ și $F'(x) < 0, \forall x \in (-\infty, 0)$, deci F nu este injectivă.

26. a) Fie F o primitivă oarecare a lui f_1 . $F'(x) = f_1(x) \Rightarrow F''(x) = \ln x + 1 \geq 0, \forall x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty \right) \Rightarrow F$

este convexă pe $\left[\frac{1}{e}, +\infty \right)$.

$$b) \int \frac{\ln x}{f_n(x)} dx = \int \frac{1}{x^n} dx = \frac{x^{1-n}}{1-n} + C.$$

$$27. a) \int f_1(x) dx = \int \frac{x}{x+3} dx = \int \left(1 - \frac{3}{x+3} \right) dx = x - 3 \ln(x+3) + C.$$

$$\int f_2(x) dx = \int \frac{x^2}{x+3} dx = \int \left(x - 3 + \frac{9}{x+3} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 9 \ln(x+3) + C.$$

b) Fie F_4 o primitivă a lui f_4 ; $F_4'(x) = \frac{x^4}{x+3} \geq 0, \forall x \in (-3, +\infty)$, deci F_4 este crescătoare.

c) Fie F_n o primitivă a lui f_n ;

$$F_n'(x) = x^{n-1} \frac{x}{x+3} < 0, \forall x \in (-3, 0) \Rightarrow x^{n-1} > 0 \quad \forall x \in (-3, 0) \Rightarrow n \text{ este număr impar.}$$

$$28. a) \int f_0(x) dx = \int e^{-x} dx = -e^{-x} + C;$$

$$\int (f_0(x) - f_1(x)) dx = \int \frac{1-x}{e^x} dx = \int \frac{e^x - xe^x}{e^{2x}} dx = \frac{x}{e^x} + C.$$

$$b) F_0(x) = -\frac{1}{e^x} + C \Rightarrow F_0(0) = C - 1 = 0 \Rightarrow C = 1, \text{ deci } F_0(1) = 1 - \frac{1}{e}.$$

c) Fie F o primitivă oarecare a funcției

$$f_{2012} \Rightarrow F''(x) = f'_{2012}(x) = \frac{x^{2011}(2012-x)}{e^x} < 0 \quad \forall x \in (-\infty, 0), \text{ deci } F \text{ este concavă pe intervalul } (-\infty, 0).$$

d) Fie G o primitivă oarecare a funcției

$$f_n \Rightarrow G''(x) = f'_n(x) = \frac{x^{n-1}(n-x)}{e^x} > 0 \quad \forall x \in (-\infty, 0) \Rightarrow n \text{ este număr par.}$$

Tema 3.3. Funcții integrabile

$$1. \quad a) \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx = \int_0^1 (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \frac{1}{5} + \frac{2}{3} + 1 = \frac{28}{15}.$$

$$b) \int_0^2 (x - \sqrt{x})^2 dx = \int_0^2 (x^2 - 2x\sqrt{x} + x) dx = \frac{14}{3} - \frac{16}{5}\sqrt{2}.$$

$$c) \int_1^2 \frac{x^2 + x + 1}{x} dx = \frac{5}{2} + \ln 2.$$

$$d) \int_1^2 \frac{x^2 + x + 1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int_1^2 \left(x^{\frac{5}{3}} + x^{\frac{2}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} \right) dx = \frac{21}{5} 2^{\frac{2}{3}} - \frac{99}{40}.$$

$$e) \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 dx = \int_1^2 \left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{29}{6}.$$

$$f) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+2}} dx = 2\sqrt{x+2} \Big|_0^1 = 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}).$$

$$g) \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{3x+1}} dx = \frac{1}{3} \sqrt{3x+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$2. \quad a) \int_0^1 (x - e^x) dx = \frac{1}{2} - (e - 1) = \frac{3}{2} - e.$$

$$b) \int_0^1 \left(\frac{1}{e^x} - e^x \right)^2 dx = \int_0^1 (e^{-2x} - 2 + e^{2x}) dx = \left(-\frac{e^{-2x}}{2} - 2x + \frac{e^{2x}}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} - 2.$$

$$c) \int_0^1 (2^x + 3^{-x}) dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} - \frac{3^{-x}}{\ln 3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{\ln 2} + \frac{2}{3 \ln 3}.$$

$$d) \int_{-1}^1 (2^x - 2^{-x}) dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{2^{-x}}{\ln 2} \right) \Big|_{-1}^1 = 0.$$

$$e) \int_0^4 \left(\sqrt{2^x} - \frac{2}{\sqrt{3^x}} \right) dx = \left(\frac{\sqrt{2^x}}{\ln \sqrt{2}} + 2 \frac{\sqrt{3^{-x}}}{\ln \sqrt{3}} \right) \Big|_0^4 = \frac{6}{\ln 2} + \frac{4 \left(\frac{1}{9} - 1 \right)}{\ln 3}.$$

$$3. \quad a) \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctg x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) \int_0^1 \frac{1}{x^2 - 4} dx = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| \Big|_0^1 = -\frac{1}{4} \ln 3.$$

$$c) \int_0^1 \frac{x+1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_0^1 + \arctg x \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}.$$

$$d) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^3 + x + 2}{x^2 + 1} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \left(x + \frac{2}{x^2 + 1} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2 \arctg x \right) \Big|_1^{\sqrt{3}} = 1 + \frac{\pi}{6}.$$

$$e) \int_2^3 \frac{x^3 - x + 2}{x^2 - 1} dx = \int_2^3 \left(x + \frac{2}{x^2 - 1} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right) \Big|_2^3 = \frac{5}{4} + \ln \frac{3}{2}.$$

$$f) \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{x}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}.$$

$$g) \int_0^1 \frac{x^2}{3x^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{3x^2 + 1} \right) dx = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{9} \arctg(x\sqrt{3}) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}\pi}{27}.$$

$$4. \quad a) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Big|_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

$$b) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

$$c) \int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 + \ln(x + \sqrt{x^2+1}) \Big|_0^1 = \sqrt{2} - 1 + \ln(1 + \sqrt{2})$$

$$d) \int_2^3 \frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int_2^3 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx + \int_2^3 \frac{2}{\sqrt{x^2-1}} dx = \sqrt{x^2-1} \Big|_2^3 + 2 \ln|x + \sqrt{x^2-1}| \Big|_2^3 = 2\sqrt{2} - \sqrt{3} + 2 \ln \frac{3 + \sqrt{8}}{2 + \sqrt{3}}.$$

$$e) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \sqrt{1-x^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{6} + 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$f) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{4-3x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3}-x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{x\sqrt{3}}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3}.$$

$$g) \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{4-3x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{\frac{4}{3}-x^2}} dx = -\frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{4}{3}-x^2} \Big|_{-1}^1 = 0.$$

$$5. \quad a) \int_0^{\pi} \sin x dx = 2.$$

$$b) \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1.$$

$$c) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \lg x dx = -\ln|\cos x| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\ln \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$d) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{ctg} x dx = \ln(\sin x) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \ln \sqrt{2}.$$

$$e) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctgx} \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = -1 + \sqrt{3}.$$

$$f) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tgx} \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = 1.$$

$$g) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

$$6. a) \int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (1-x) dx = 1.$$

$$b) \int_0^2 |x^2 - 1| dx = \int_0^1 (1 - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx = 2.$$

$$c) \int_0^2 x[x] dx = \int_1^2 x dx = \frac{3}{2}.$$

$$d) \int_{-1}^1 x\{x\} dx = \int_{-1}^0 x(x+1) dx + \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{6}.$$

$$e) \int_{-1}^1 |x - \sin x| dx = \int_{-1}^0 (\sin x - x) dx + \int_0^1 (x - \sin x) dx = 2\cos 1 - 1; \text{ altfel}$$

$$\int_{-1}^1 |x - \sin x| dx = 2 \int_0^1 (x - \sin x) dx = 2\cos 1 - 1.$$

$$f) \int_{-1}^1 |x - \operatorname{arctgx}| dx = 2 \int_0^1 (x - \operatorname{arctgx}) dx = 1 - 2 \left(x \operatorname{arctgx} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \right) = 1 - \frac{\pi}{2} + \ln 2.$$

$$7. a) \int_0^{\pi} x \sin x dx = -x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx = \pi.$$

$$b) \int_0^{\pi} x \cos x dx = x \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx = -2.$$

$$c) \int_0^1 x e^x dx = x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = 1.$$

$$d) \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 2 \left(-x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \right) = 2 - \frac{5}{e}.$$

$$e) \int_1^e \ln x dx = x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e 1 dx = 1.$$

$$f) \int_1^e \ln^2 x dx = x \ln^2 x \Big|_1^e - 2 \int_1^e \ln x dx = e - 2.$$

$$g) \int_1^e x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 dx = \frac{5e^3 - 2e^3}{9}.$$

$$h) \int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e 2\sqrt{x} \frac{1}{x} dx = 2\sqrt{e} - 4\sqrt{x} \Big|_1^e = 16 - 2\sqrt{e}.$$

$$i) \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \ln x \Big|_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{e} - \frac{2}{e^2} + \left(\frac{1}{e} - \frac{1}{e^2} \right) = \frac{2}{e} - \frac{3}{e^2}.$$

$$8. a) \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx = -\frac{1}{2} \cos x^2 \Big|_0^{\sqrt{\pi}} = 1.$$

$$b) \int_0^{\sqrt[3]{\pi}} x^2 \cos x^3 dx = \frac{1}{3} \sin x^3 \Big|_0^{\sqrt[3]{\pi}} = 0.$$

$$c) \int_1^e \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2e^{\sqrt{x}} \Big|_1^e = 2(e^{\sqrt{e}} - e).$$

$$d) \int_0^1 x \sqrt{x^2 + 1} dx = \frac{1}{3} (x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3}.$$

$$e) \int_1^e \frac{\ln^{2012} x}{x} dx = \frac{1}{2013} \ln^{2013} x \Big|_1^e = \frac{1}{2013}.$$

$$f) \int_0^{\pi} \cos x \cdot \sin(\sin x) dx = -\cos(\sin x) \Big|_0^{\pi} = 0.$$

$$g) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx = -\ln(1 + \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{3}.$$

$$9. a) \int_0^1 x \sqrt{x+1} dx = \int_1^{x+1} (t-1) \sqrt{t} dt = \frac{4}{15} (1 + \sqrt{2}).$$

$$b) \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx = \int_1^{e+1} \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{t} dt = 1 + \ln \frac{2}{e+1}.$$

$$10. a) F'(x) = \frac{-x \sin x - \cos x}{x^2} = f(x), \forall x \in (0, +\infty).$$

$$b) \int_{\pi}^{2\pi} f(x) dx = F(x) \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{3}{2\pi}.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^{n\pi} f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\cos n\pi}{n\pi} - \frac{\cos \pi}{\pi} \right) = \frac{1}{\pi}.$$

$$11. a) \int f(x) dx = \frac{x^2}{2} + \cos x + C.$$

$$b) \text{Aria este egală cu } \int_0^{\pi} |f(x)| dx = \frac{\pi^2}{2} - 2.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{2} + \cos x - 1}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$12. a) F'(x) = \frac{\left(\frac{1}{x^2+1} \right)'}{1 + \left(\frac{1}{x^2+1} \right)^2} = -2 \frac{x}{x^4 + 2x^2 + 2} = -2f(x).$$

$$b) \int_0^1 f(x) dx = -\frac{1}{2} F(x) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} \left(\arctg \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \right).$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} (F(n) - F(0)) = \frac{\pi}{8}.$$

$$13. a) \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1).$$

$$b) \text{Aria cerută este egală cu } \int_0^1 |g(x)| dx = \int_0^1 x^2 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 te^t dt = \frac{1}{2} \left(e^t t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt \right) = \frac{1}{2}.$$

$$c) 1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < \int_0^1 e^x dx = e - 1 < 2.$$

$$14. a) f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} e^x.$$

$$b) \text{Cum } \frac{t^2}{t^2+1} e' \geq 0, t \in \mathbb{R} \Rightarrow \int_0^x \frac{t^2}{t^2+1} e' dt \geq 0, \forall x \in (0, +\infty).$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^2}{t^2+1} e' dt \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^2}{t^2+1} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \arctg x) = +\infty.$$

$$15. a) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

$$b) f(-x) = \int_x^{-x} \frac{t^{2012}}{t^2+1} dt = -f(x).$$

$$c) \text{Pentru } x \geq 0 \quad \int_{-x}^x \frac{t^{2012}}{t^2+1} dt \geq 0, \text{ iar pentru } x \leq 0 \text{ notăm } x = -y, y \geq 0 \text{ și}$$

$$f(x) = -f(y) \leq 0, y \geq 0.$$

$$16. a) f'(x) = (x^4 - 4x + 3) \sqrt{x^4 + 1}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 3.$$

$$c) f'(x) = (x^4 - 4x + 3) \sqrt{x^4 + 1} = (x-1)^2 (x^2 + 2x + 3) \sqrt{x^4 + 1} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ deci } f \text{ nu are puncte de extrem.}$$

$$17. a) \text{Aria cerută este egală cu } \int_0^1 |f(x)| dx = \arctg x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) \text{Funcția este strict crescătoare, deci există limita } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t^2) dt. \text{ Avem}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t^2) dt = \int_0^1 f(t^2) dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t^2) dt \leq \int_0^1 f(t^2) dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t) dt = \int_0^1 f(t^2) dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\arctg x - \frac{\pi}{4} \right) \in \mathbb{R}.$$

$$c) I = \int_{-1}^1 \frac{e^x}{1+e^x} f(x) dx = - \int_1^{-1} \frac{e^{-t}}{1+e^{-t}} f(-t) dt = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+e^t} f(t) dt.$$

$$\text{Deci } 2I = \int_{-1}^1 \frac{1+e^x}{1+e^x} f(x) dx = 2 \arctg x \Big|_{-1}^1 = \pi.$$

$$18. a) \int_0^1 (t^3 + 1) f(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) \int_{\frac{1}{x}}^1 f(t) dt = \int_x^1 f\left(\frac{1}{y}\right) \left(-\frac{1}{y^2}\right) dy = \int_1^x y^3 f(y) dy, \forall x > 0.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{x}}^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_{\frac{1}{x}}^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_1^x t^3 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\arctg x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

$$19. a) f'(x) = 2x \sqrt{x^8 + 1}.$$

$$b) f'(x) = 2x \sqrt{x^8 + 1} = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ este punct de extrem.}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{x^2} t^2 dt = +\infty, \text{ deci graficul funcției } f \text{ nu are asimptote orizontale la } +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \sqrt{x^8 + 1} = +\infty, \text{ deci graficul funcției } f \text{ nu are asimptote oblice la } +\infty.$$

$$20. a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x \arcsin \frac{t^2}{t^2+1} dt}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2x \arcsin \frac{x^4}{x^4+1} = \frac{\pi}{3}.$$

$$b) f'(x) = 2x \arcsin \frac{x^4}{x^4+1} > 0, \forall x \geq 1, \text{ deci } f \text{ este strict crescătoare.}$$

c) Funcția f este continuă, deci nu are asimptote verticale.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \arcsin \frac{1}{2} dt = +\infty, \text{ deci graficul funcției } f \text{ nu are asimptote horizontale la } +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \arcsin \frac{x^4}{x^4+1} = +\infty, \text{ deci graficul funcției } f \text{ nu are asimptote oblice la } +\infty.$$

$$21. a) \int_0^{\pi} x^2 f(x) dx = \int_0^{\pi} x \sin x dx = -x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx = \pi.$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}, \text{ deci } f \text{ este continuă pe } \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}.$$

$$c) \int_1^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \int_1^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \cos 1.$$

$$22. a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x^4} = 1.$$

$$b) f'(x) = e^{-x^4} > 0 \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ este funcție strict crescătoare, deci este injectivă.}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 e^{-t^4} dt + \int_1^x e^{-t^4} dt \right) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 e^{-t^4} dt + \int_1^x e^{-t} dt \right) = \int_0^1 e^{-t^4} dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e} - e^{-x} \right) \in \mathbb{R}$$

și cum funcția f este strict crescătoare rezultă că $\text{Im } f \neq \mathbb{R}$, deci funcția f nu este surjectivă.

$$23. a) \text{ Considerăm funcția } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x - x - 1; f'(x) = e^x - 1 = 0 \Rightarrow x_0 = 0 \text{ este punct de extrem. Din tabelul de variație deducem că } x_0 = 0 \text{ este punct de minim pentru } f, \text{ deci } f(x) \geq f(0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$b) I_1 = \int_0^1 e^{-x^2} dx \geq \int_0^1 (1-x^2) dx = \frac{2}{3} > \frac{1}{e}.$$

$$\text{Dar } e^{x^2} \geq 1+x^2 \Rightarrow \frac{1}{e^{x^2}} \leq \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

$$c) I_{n+1} - I_n = \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx > 0 \Rightarrow \text{șirul } (I_n)_{n \geq 1} \text{ este monoton crescător. Este suficient să arătăm mărginirea superioară.}$$

$$I_n = \int_0^n e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^n e^{-x^2} dx \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^n e^{-x} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \left(\frac{1}{e} - \frac{1}{e^n} \right) \leq \frac{1}{e} + \frac{\pi}{4}.$$

$$24. a) I_1 = \int_0^1 \frac{x}{x^2+2012} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+2012) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln \frac{2013}{2012}.$$

$$b) I_{n+2} + 2012 I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+2} + 2012 x^n}{x^2+2012} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$$c) 0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{x^2+2012} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

$$d) I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x^2+2012} dx \leq 0 \Rightarrow \text{șirul } (I_n)_{n \geq 1} \text{ este descrescător.}$$

$$e) I_{n+2} + 2012 I_n = \frac{1}{n+1} \leq I_n + 2012 I_n \Rightarrow I_n \geq \frac{1}{2013(n+1)}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$$\frac{1}{n+1} = I_{n+2} + 2012 I_n \geq I_{n+2} + 2012 I_{n+2} \Rightarrow I_{n+2} \leq \frac{1}{2013(n+1)}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$$\text{Deci } \frac{1}{2013(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{2013(n-1)} \Rightarrow \frac{n}{2013(n+1)} \leq n I_n \leq \frac{n}{2013(n-1)} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = \frac{1}{2013}.$$

$$25. a) I_0 = \int_1^2 \ln(x^2+1) dx = x \ln(x^2+1) \Big|_1^2 - 2 \int_1^2 \frac{x^2}{1+x^2} dx = 2 \ln 5 - \ln 2 - 2(x - \arctg x) \Big|_1^2 =$$

$$\ln \frac{25}{2} - 1 + 2 \arctg 2 - \frac{\pi}{2}.$$

$$b) I_{n+1} - I_n = \int_1^2 [(1-x)^{2n+2} - (1-x)^{2n}] \ln(x^2+1) dx = \int_1^2 (1-x)^{2n} (x^2-2x) \ln(x^2+1) dx \leq 0, \text{ deci șirul } (I_n)_{n \geq 1} \text{ este descrescător și cum șirul este mărginit inferior de 0, el este convergent.}$$

$$c) 0 \leq \int_1^2 (1-x)^{2n} \ln(x^2+1) dx \leq \ln 5 \int_1^2 (1-x)^{2n} dx = -\ln 5 \frac{(1-x)^{2n+1}}{2n+1} \Big|_1^2 = \frac{\ln 5}{2n+1} \text{ și prin trecere la limită obținem } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

$$26. a) \int_0^1 (1-x)^4 dx = -\frac{(1-x)^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{1}{5}.$$

$$b) 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (1-x)^{2n} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+1} = 0.$$

$$c) I_n = C_{2n}^0 - \frac{1}{2} C_{2n}^1 + \frac{1}{3} C_{2n}^2 - \dots + \frac{1}{2n+1} C_{2n}^{2n} = \int_0^1 (1-x)^{2n} dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

$$27. a) F'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{x}{1+x^2} = f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$b) \int_0^1 f(x) dx = F(x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1+\frac{k}{n}}{1+\frac{k^2}{n^2}} = \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}, \text{ deci șirul } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ este}$$

convergent.

$$28. a) \int_{-1}^{\frac{\pi-1}{4}} \frac{1}{x^2+2x+2} dx = \int_{-1}^{\frac{\pi-1}{4}} \frac{1}{(x+1)^2+1} dx = \arctg(x+1) \Big|_{-1}^{\frac{\pi-1}{4}} = 1.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} = 0.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{2n^2+2 \cdot n+1^2} + \frac{n}{n^2+2 \cdot 2n+2^2} + \dots + \frac{n}{2n^2+2 \cdot n^2+n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{2n^2+2nk+k^2} =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2+2\frac{k}{n}+\frac{k^2}{n^2}} = \int_0^1 f(x) dx = \arctg 2 - \frac{\pi}{4}.$$

$$29. a) \int_0^1 xf'(x) dx = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$b) V = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 (1-x^2) dx = \frac{2\pi}{3}.$$

$$c) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt.$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2-k^2}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1-\frac{k^2}{n^2}} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

$$30. a) I_1 = \int_0^2 (2x-x^2) dx = \frac{4}{3}.$$

$$b) I_n = \int_0^2 (2x-x^2)^n dx \stackrel{x=1-t^2}{=} \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt = t(1-t^2)^n \Big|_{-1}^1 + 2n \int_{-1}^1 t^2(1-t^2)^{n-1} dt =$$

$$-2n \int_{-1}^1 (1-t^2-1)(1-t^2)^{n-1} dt = -2nI_n + 2nI_{n-1} \Rightarrow (2n+1)I_n = 2nI_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

c)

$$0 \leq I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \dots \cdot \frac{4}{5} I_1 =$$

$$\frac{\sqrt{2n} \cdot \sqrt{2n} \cdot \sqrt{2n-2} \cdot \sqrt{2n-2} \cdot \dots \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{4}}{(2n+1) \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot 5} I_1 \leq \frac{\sqrt{2n} \cdot (2n-1) \cdot (2n-3) \cdot \dots \cdot 5\sqrt{4}}{(2n+1) \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot 5} I_1 =$$

$$\frac{\sqrt{2n}}{2n+1} 2I_1. \text{ În concluzie am obținut } 0 \leq I_n \leq \frac{2\sqrt{2n}}{2n+1} I_1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

$$31. a) I_2 = \int_0^1 (x-x^2) dx = \frac{1}{6}.$$

$$b) I_n = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{x-\frac{1}{2}=t}{2}} \left(\frac{1}{4}-t^2 \right)^n dx = t \left(\frac{1}{4}-t^2 \right)^n \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + 2n \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} t^2 \left(\frac{1}{4}-t^2 \right)^{n-1} dx =$$

$$-2n \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4}-t^2-\frac{1}{4} \right) \left(\frac{1}{4}-t^2 \right)^{n-1} dx = -2nI_n + \frac{n}{2} I_{n-1} \Rightarrow I_n = \frac{n}{4n+2} I_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

$$c) \text{Aplicăm criteriul raportului } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{I_{n-1}} = \frac{1}{4} \in [0,1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

Altfel $0 \leq I_n = \frac{n}{4n+2} I_{n-1} \leq \frac{1}{4} I_{n-1} \leq \frac{1}{4^2} I_{n-2} \leq \dots \leq \frac{1}{4^{n-1}} I_1$ și prin trecere la limită în inegalități obținem $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

$$32. a) \int_1^4 f(\sqrt{x}) dx = \int_1^4 (x-3\sqrt{x}+2) dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x \right) \Big|_1^4 = -\frac{1}{2}.$$

b) Aria cerută este egală cu

$$\int_1^2 |g(x)| dx = -\int_1^2 \frac{x^2-3x+2}{x} dx = \left(-\frac{x^2}{2} + 3x - 2\ln(x) \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2} - 2\ln 2.$$

$$b) \int_1^2 f^n(x) dx = \int_1^2 (x^2-3x+2)^n dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (2x-3)(x^2-3x+2)^n dx =$$

$$\frac{1}{2} (2x-3)(x^2-3x+2)^n \Big|_1^2 - \frac{n}{2} \int_1^2 (2x-3)^2 f^{n-1}(x) dx =$$

$$-\frac{n}{2} \int_1^2 (4x^2-12x+9) f^{n-1}(x) dx = -\frac{n}{2} \int_1^2 (4(x^2-3x+2)+1) f^{n-1}(x) dx =$$

$$-\frac{4n}{2} \int_1^2 f^n(x) dx - \frac{n}{2} \int_1^2 f^{n-1}(x) dx, \text{ de unde rezultă cerința.}$$

$$33. a) \int_0^1 \frac{x^{2011}}{x^{2012}+1} dx = \frac{1}{2012} \ln 2.$$

$$b) 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n \cdot f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{x^{2012}+1} dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{2} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(n+1)} = 0.$$

c) Funcția $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ este strict crescătoare, deci există limita $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t) dt$.

$$\text{Avem } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t) dt \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^2+1} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\arctg x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

34. a) f este continuă pe $[0, 1]$, pe $(1, 2]$ și $f(1) = f_s(1) = 1 \neq f_d(1) = 2$, deci f este integrabilă pe $[0, 2]$, dar nu admite primitive (pentru că are un punct de discontinuitate de speța a 1-a).

b) Aria este egală cu $\int_0^2 |f(x)| dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (x + e^x) dx = 2 + e^2 - e$.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^2 f^n(x) dx}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^2 (x + e^x)^n dx}{n} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^2 (x+1)^n dx}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{n+1} - \frac{2^{n+1}}{n+1}}{n} = +\infty$.

35. $g'(x) = f(x) - f(1006) > 0, \forall x > 1006$ și $g'(x) < 0, \forall x < 1006$, deci funcția g este strict descrescătoare pe $(0, 1006)$ și strict crescătoare pe $(1006, 2012)$, deci nu este injectivă

36. a) $I_2 = \int_1^2 \frac{1}{x^2+1} dx = \arctg 2 - \frac{\pi}{4}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \int_1^2 \frac{1}{x^{n+1}+1} dx - \int_1^2 \frac{1}{x^n+1} dx \leq 0$, de unde concluzia.

c) Șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător și mărginit inferior de 0, deci este convergent.

d) $0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{1}{x^n+1} dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{1}{x^n} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{-n+1} (2^{-n+1} - 1) = 0$.

37. a) $I_1 + I_2 + I_3 = \int_0^1 \frac{x^1 + x^2 + x^3}{x^2 + x + 1} dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x^2 + x + 1} dx \leq 0 \Rightarrow$ șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.

c) $0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + x + 1} dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

38. a) $I_3 = \int_0^1 \frac{t^3}{t^2+1} dt = \int_0^1 \left(t - \frac{t}{t^2+1} \right) dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2$.

b) $I_{2n} + I_{2n-2} = \int_0^1 t^{2n-2} dt = \frac{1}{2n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

c) $I_0 + I_2 + \dots + I_{2012} = I_0 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2011} = \frac{\pi}{4} + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2011} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

d) $0 \leq I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{t^2+1} dt \leq \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

e) $I_{2n} = \frac{1}{2n-1} - I_{2n-2} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3} + \frac{1}{2n-5} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{1} + (-1)^n I_0 \Rightarrow$

$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} = I_0 + (-1)^{n-1} I_{2n} \Rightarrow$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} \right) = I_0$.

39. a) $I_0 = \int_0^1 \frac{1-x}{x^2+1} dx = \arctg x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.

b) $I_2 - I_0 = \int_0^1 \frac{(x^2+x+1)^2 - 1}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{(x^2+1)^2 + 2x(x^2+1) + x^2 + 1 - 2}{x^2+1} dx =$

$\left(\frac{x^3}{3} + x + x^2 + x - 2 \arctg x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + 3 - \frac{\pi}{2} \notin \mathbb{Q}$.

c) Arătăm că polinomul $g = (X^2 + X + 1)^{4n+1} - X$ se divide cu $X^2 + 1$.

$g(i) = (i^2 + i + 1)^{4n+1} - i = i^{4n+1} - i = 0$, deci există $q \in \mathbb{Q}[X]$ astfel încât

$g = q \cdot (X^2 + 1) \Rightarrow I_{4n+1} = \int_0^1 \frac{(x^2+x+1)^{4n+1} - x}{x^2+1} dx = \int_0^1 q(x) dx \in \mathbb{Q}$.

40. a) $I_n = 2 - \ln \frac{n+1}{n} \Rightarrow I_{n+1} - I_n = \ln \frac{n+1}{n} - \ln \frac{n+2}{n+1} = \ln \frac{n^2+2n+1}{n^2+2n} > 0$.

b) $I_n = 2 - \ln \frac{n+1}{n} < 2, I_n = \int_n^{n+1} \frac{2x-1}{x} dx > 0$.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(2 - I_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\ln \frac{n+1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$.

41. a) $I_1 = \int_1^2 \frac{x}{x+1} dx = \int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx = 1 - \ln \frac{3}{2}$.

b) $I_n = \int_1^2 \frac{x^n}{x^n+1} dx \leq \int_1^2 \frac{x^n+1}{x^n+1} dx = 1$.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{x^n+1-1}{x^n+1} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x^n+1} \right) dx$.

Pe de altă parte

$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{1}{x^n+1} dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{1}{x^n} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^{-n+1}}{-n+1} \right) \Big|_1^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^{1-n}}{1-n} - \frac{1}{1-n} \right) = 0$, deci $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 1$.

42. a) $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

b) $0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

c) Arătăm că polinomul $g = X(X^2 + 1)^{6n+1} + X^{3n+2} \in \mathbb{Q}[X]$ se divide prin $X^2 + X + 1$. Fie $\varepsilon = \omega$

rădăcină a lui $X^2 + X + 1 \Rightarrow \varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$, $\varepsilon^3 = 1$. $g(\varepsilon) = \varepsilon(-\varepsilon)^{6n+1} + \varepsilon^{3n+2} = 0$, deci există

$q \in \mathbb{Q}[X]$ astfel încât $g = q \cdot (X^2 + X + 1) \Rightarrow \int_0^1 (x^2 + x + 1)q(x)f(x)dx = \int_0^1 q(x)dx \in \mathbb{Q}$.

43. a) Avem $x^3 + x^2 + x + 1 = (x+1)(x^2 + 1) \Rightarrow \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2+1} \Leftrightarrow$

$a(x^2+1) + (bx+c)(x+1) = 1 \Rightarrow a=1, b=-1, c=1$.

b) $I_0 = \int_0^1 \frac{1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} + \frac{x-1}{x^2+1} \right) dx = \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}$.

c) $I_{4n+2} - I_{4n+1} + I_1 + I_0 = \int_0^1 \frac{x^{4n+2} - x^{4n+1} + x + 1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx \in \mathbb{Q}$ pentru că polinomul

$g = X^{4n+2} - X^{4n+1} + X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ se divide prin $(X+1)(X^2+1)$.

44. a) $I_1 + I_3 = \int_0^1 \frac{x+1}{x^3 + x^2 + x + 1} dx = \int_0^1 \frac{x+1}{(x+1)(x^2+1)} dx = \frac{\pi}{4}$.

b) $0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

c) $I_{n+3} + I_{n+2} + I_{n+1} + I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+3} + x^{n+2} + x^{n+1} + x^n}{x^3 + x^2 + x + 1} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

d) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x^3 + x^2 + x + 1} dx \leq 0 \Rightarrow$ șirul $(I_n)_{n \geq 0}$ este descrescător.

$I_{n+3} + I_{n+2} + I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1} \leq 4I_{n+3} \Rightarrow I_n \geq \frac{1}{4(n-2)}$;

$I_{n+3} + I_{n+2} + I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1} \geq 4I_n \Rightarrow I_n \leq \frac{1}{4(n+1)}$. Din ultimele două relații avem

$\frac{n}{4(n+1)} \leq nI_n \leq \frac{n}{4(n-2)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \frac{1}{4}$.

e) $I_{2n+3} + I_{2n+1} = \int_0^1 \frac{x^{2n+3} + x^{2n+1}}{x^3 + x^2 + x + 1} dx = \int_0^1 \frac{x^{2n+1} + 1 - 1}{x+1} dx =$

$\int_0^1 \left[(x^{2n} - x^{2n-1} + x^{2n-2} - \dots + 1) - \frac{1}{x+1} \right] dx = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n} + \dots + 1 - \ln 2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

45. a) $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$.

b) $\int_0^1 x^5 g(x^3) dx = \int_0^1 x^5 e^{-x^3} dx \stackrel{x^3=t}{=} \frac{1}{3} \int_0^1 t e^{-t} dt = -\frac{1}{3} t e^{-t} \Big|_0^1 + \frac{1}{3} \int_0^1 e^{-t} dt = \frac{e-2}{3e}$.

c) $I_{n+1} - I_n = \int_n^{n+1} e^{-x^3} dx > 0 \Rightarrow I_{n+1} > I_n$.

$0 \leq I_n = \int_1^n e^{-x^3} dx \leq \int_1^n e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_1^n = \frac{1}{e} - \frac{1}{e^n} < \frac{1}{e}$, deci șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este mărginit și cum șirul este și monoton crescător, rezultă că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

46. a) $I_4 = \int_2^3 \frac{t^4}{t^2+1} dt = \int_2^3 \frac{t^4-1+1}{t^2+1} dt = \int_2^3 \left(t^2 - 1 + \frac{1}{t^2+1} \right) dt = \frac{2}{3} + \arctg 3 - \arctg 2$.

b) $I_{n+1} - I_n = \int_2^3 \frac{t^{n+1} - t^n}{t^2+1} dt \geq 0$.

c) Cum șirul $(I_n)_{n \geq 0}$ este monoton crescător rezultă că există $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$. Dar

$I_{n+2} + I_n = \int_2^3 \frac{t^{n+2} + t^n}{t^2+1} dt = \frac{3^{n+1} - 2^{n+1}}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (I_{n+2} + I_n) = +\infty$, deci $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = +\infty$.

Altfel. $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_2^3 \frac{t^n}{t^2+1} dt \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_2^3 \frac{t^n}{10} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{10(n+1)} (3^{n+1} - 2^{n+1}) dt = +\infty$.

47. a) $f_4(1) + f_1(1) = \int_0^1 \frac{t^4 + t}{t^3 + 1} dt = \frac{1}{2}$.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_{2012}(x)}{x^{2013}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2012}}{2013x^{2012}} = \frac{1}{2013}$.

c) $0 \leq f_n(1) = \int_0^1 \frac{t^n}{t^3+1} dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1) = 0$, deci șirul $(f_n(1))_{n \geq 0}$ este convergent.

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 \frac{t^n}{t^3+1} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 \frac{t^n}{t^3+1} dt + \int_1^2 \frac{t^n}{t^3+1} dt \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{t^n}{t^3+1} dt \geq$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 \frac{t^n}{9} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{9(n+1)} (2^{n+1} - 1) dt = +\infty$.

48. a) $I_1 + I_3 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + tg^2 x) tg x dx = \frac{1}{2} tg^2 x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} tg^n x (1 - tg x) dx \leq 0$, pentru că $0 \leq tg x \leq 1 \forall x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right]$, deci șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este

monoton descrescător și cum șirul este mărginit inferior (pentru că $0 \leq I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} tg^n x dx$), rezultă

convergența.

$$c) I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} t g^n x \, dx = \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 \frac{t^n}{t^2+1} dt.$$

$$d) 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 \frac{x^n}{x^2+1} dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 x^n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^{n+1} \right) = 0.$$

$$49. a) I_1 \left(\frac{\pi}{3} \right) = \int_0^{\frac{\pi}{3}} t g x \, dx = -\ln \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \ln 2.$$

$$b) \text{ și } c) 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a t g^n x \, dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} t g^n x \, dx \leq$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + t g^2 x) t g^n x \, dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} t g^{n+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} = 0, \text{ deci șirul } (I_n(a))_{n \geq 1} \text{ este convergent la } 0.$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n \left(\frac{\pi}{3} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} t g^n x \, dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} t g^n x \, dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} t g^n x \, dx \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} t g^n x \, dx =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{t^n}{t^2+1} dt \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{t^n}{4} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4(n+1)} (\sqrt{3}^{n+1} - 1) = +\infty, \text{ deci } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n \left(\frac{\pi}{3} \right) = +\infty.$$

$$50. a) I_2(\pi) = \int_0^{\pi} (1 + \sin x)^2 dx = \int_0^{\pi} \left(1 + 2 \sin x + \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx = 3\pi.$$

$$b) \lim_{a \rightarrow 0} \frac{I_{2012}(a)}{a} = \lim_{a \rightarrow 0} (1 + \sin a)^{2012} = 1.$$

c)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a (1 + \sin x)^n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a (1 + C_n^1 \sin x + C_n^2 \sin^2 x + \dots) dx \geq$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a (1 + C_n^1 \sin x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a + n(1 - \cos a)) = +\infty.$$

$$51. a) x_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^1 dx = (x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} + 1.$$

$$b) x_{n+1} - x_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^n (\cos x) dx \geq 0, \text{ deci șirul } (x_n)_{n \geq 1} \text{ este strict crescător.}$$

$$c) x_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^n dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \right)^n dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t)^n dt.$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin x)^n dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + C_n^1 \sin x + C_n^2 \sin^2 x + \dots) dx \geq$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + C_n^1 \sin x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} + n \left(1 - \cos \frac{\pi}{2} \right) \right) = +\infty, \text{ deci } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

$$52. a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx \stackrel{\sin x = t}{=} \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} dt = \arctg t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) \text{ Fie } F \text{ o primitivă a funcției } f, \text{ deci } F'(x) = f(x) = \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} \geq 0, x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

$$c) \int_0^{2\pi} x f(x) dx = \int_0^{\pi} x \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx + \int_{\pi}^{2\pi} x \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx.$$

Pe de altă parte

$$\int_{\pi}^{2\pi} x \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx \stackrel{x = \pi + t}{=} \int_0^{\pi} (t + \pi) \frac{-\cos t}{2 - \cos^2 t} dt = - \int_0^{\pi} t \frac{\cos t}{2 - \cos^2 t} dt - \pi \int_0^{\pi} \frac{\cos t}{2 - \cos^2 t} dt.$$

$$\text{Deci } \int_0^{2\pi} x f(x) dx = \int_0^{\pi} x \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx - \int_0^{\pi} t \frac{\cos t}{2 - \cos^2 t} dt - \pi \int_0^{\pi} \frac{\cos t}{2 - \cos^2 t} dt = -\pi \int_0^{\pi} \frac{\cos t}{1 + \sin^2 t} dt = 0$$

$$53. a) \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x' \arctg x dx = x \arctg x \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \arctg x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\arctg x}{\frac{1}{x}} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{\frac{1}{1+x^2}} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right) = +\infty.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \arctg \frac{k}{n} = \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$54. a) I_1 = \int_0^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = 0.$$

$$b) 0 \leq I_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \cos^n x dx \leq I_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} dx = \frac{\pi}{n} \leq \frac{\pi}{2}.$$

c) Din b) avem $0 \leq I_n \leq \frac{\pi}{n}$ și prin trecere la limită rezultă $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

55. a) Aria cerută este egală cu $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

c) Arătăm că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este monoton și mărginit.

Monotonie: $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x (\cos x - 1) dx \leq 0$, deci șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător.

Mărginirea: $0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$.

56. a) $\int_0^1 f(e^x) dx = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$.

b) Volumul cerut este egal cu $\pi \int_1^e f^2(x) dx = \pi \int_1^e \ln x dx = \pi \left(x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx \right) = \pi$.

c) $\int_0^1 e^{x^2} dx = \int_1^e t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_1^e = \frac{2}{3} (e^{\frac{3}{2}} - 1)$

deci $\int_0^1 e^{x^2} dx + \int_1^e f(x) dx = e$.

57. a) $\int_0^{\frac{3}{4}} \frac{2t+1}{f(\sqrt{t})} dt = \int_0^{\frac{3}{4}} \frac{2t+1}{t^2+t+1} dt = \ln(t^2+t+1) \Big|_0^{\frac{3}{4}} = \ln \frac{37}{16}$.

b) În $\int_1^3 g(x) dx$ facem schimbarea de variabilă

$g(x) = t$, deci $\begin{cases} x \in [1, 3] \Rightarrow t \in [0, 1] \\ x = f(t) \Rightarrow dx = f'(t) dt \end{cases}$ și obținem

$\int_1^3 g(x) dx = \int_0^1 t f'(t) dt = t f(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(t) dt \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 3$.

c) Considerăm funcția $h: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $h(\alpha) = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^\alpha g(x) dx - \alpha$.

$h'(\alpha) = g(\alpha) - 1 \leq 0$, pentru că $g(\alpha) \in [0, 1]$, $\forall \alpha \in [1, 3]$. Deci funcția h este descrescătoare, adică $h(\alpha) \leq h(3) = 0$, $\forall \alpha \in [1, 3]$.

58. a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ este funcție crescătoare pe \mathbb{R} și cum $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) \geq 0, \forall x \geq 0$.

Aria cerută este egală cu

$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x - \arctg x) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - (x \arctg x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$.

b) La punctul a) am arătat că funcția f este strict crescătoare, deci este injectivă.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă și din $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, rezultă că f este surjectivă. În consecință funcția f este bijectivă.

c) În $\int_0^{1-\frac{\pi}{4}} f^{-1}(x) dx$ facem schimbarea de variabilă $f^{-1}(x) = t$, deci $\begin{cases} x \in [0, 1-\frac{\pi}{4}] \Rightarrow t \in [0, 1] \\ x = f(t) \Rightarrow dx = f'(t) dt \end{cases}$

Obținem $\int_0^{1-\frac{\pi}{4}} f^{-1}(x) dx = \int_0^1 t f'(t) dt = t f(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(t) dt \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx + \int_0^{1-\frac{\pi}{4}} f^{-1}(x) dx = f(1) = \frac{\pi}{4}$.

59. a) $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 = (x+1)(x^2+1)$.

Aria este egală cu $\int_{-2}^0 f(x) dx = \int_{-2}^{-1} -(x+1)(x^2+1) dx + \int_{-1}^0 (x+1)(x^2+1) dx =$
 $= \int_{-2}^{-1} -(x^3+x^2+x+1) dx + \int_{-1}^0 (x^3+x^2+x+1) dx = \frac{5}{2}$.

b) $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 > 0, x \in \mathbb{R}$ rezultă că funcția f este strict crescătoare, deci este injectivă. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă și din $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, rezultă că f este surjectivă. În consecință funcția f este bijectivă.

c) În $\int_1^4 f^{-1}(x) dx$ facem schimbarea de variabilă $f^{-1}(x) = t$, deci $\begin{cases} x \in [1, 4] \Rightarrow t \in [0, 1] \\ x = f(t) \Rightarrow dx = f'(t) dt \end{cases}$ și

obținem $\int_1^4 f^{-1}(x) dx = \int_0^1 t f'(t) dt = t f(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(t) dt = 4 - \int_0^1 f(t) dt = 4 - \frac{25}{12} = \frac{23}{12}$.

60. a) $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{6}$.

b) Funcția f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Trebuie arătat că f este continuă într-un punct oarecare $n \in \mathbb{Z}$. $f_s(n) = \lim_{x \nearrow n} (x - (n-1))(1 - [x - (n-1)]) = 0$; $f_d(n) = \lim_{x \searrow n} (x - n)(1 - (x - n)) = 0$; $f(n) = 0$, de unde rezultă continuitatea lui f , deci f admite primitive.

c) Considerăm funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(a) = \int_a^{a+1} f(x) dx$. Cum g este derivabilă cu $g'(a) = f(a+1) - f(a) = 0$, $\forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow$ funcția g este constantă, adică ceea ce trebuia demonstrat.

61. a) $\int_{-1}^1 xf(x) dx = - \int_1^{-1} (-t) f(-t) dt = - \int_1^{-1} tf'(t) dt \Rightarrow \int_{-1}^1 xf'(x) dx = 0$.

b) $\int_0^1 [f(x)f'(x) + (f'(x))^2] dx = \int_0^1 [f'(x)f(x)]' dx = [f'(x)f(x)]_0^1 = -2012$.

c) $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx$, deci inegalitatea este echivalentă cu $\frac{\pi}{4} \leq \int_0^1 f(x) dx \leq 1$.

$\frac{\pi}{4} = \arctg x|_0^1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 dx = 1$.

62. a) $\int \frac{f_{2012}(x)}{f_{2012}(x+1)} dx = \int \frac{1}{\frac{(x+1)(x+2)\dots(x+2012)}{1}} dx = \int \frac{x+2013}{x+2012} dx = x + \ln(x+2012) + C$

b) $\int_0^1 (x^2+2)f_3(x^2) dx = \int_0^1 (x^2+2) \frac{1}{(x^2+1)(x^2+2)(x^2+3)} dx = \int_0^1 \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+3} \right) dx =$
 $\frac{1}{2} \left(\arctg x|_0^1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{x}{\sqrt{3}}|_0^1 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \right)$.

c) $\int_1^x f_n(t^3) dt = \int_1^x \frac{1}{(t^3+1)(t^3+2)\dots(t^3+n)} dt \leq \int_1^x \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} dt = \frac{x-1}{n!}$, $\forall x \geq 1$, $\forall n \geq 1$.

63. a) $\int_0^1 f(x) dx = x \ln(x^2+1)|_0^1 - \int_0^1 x \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln 2 - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$.

b) $g(-x) = \int_0^{-x} f(t^2) dt = - \int_0^x f(y^2) dy = -g(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

c) Limita este egală cu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^{1006}) + f((-x)^{1006})}{2013x^{2012}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(x^{2012}+1)}{2013x^{2012}} = \frac{2}{2013}$.

64. a) $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \arctg x|_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_{2012}(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}} f_{2012}(\cos x) dx$.

c) $\int_0^1 f_n(\sin x) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sin^n x + 1} dx$.

Pentru $x \in [0,1] \Rightarrow \sin x \in [0, \sin 1] \Rightarrow \frac{1}{1+\sin^n 1} \leq \int_0^1 \frac{1}{\sin^n x + 1} dx \leq 1 \Rightarrow$

$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\sin^n 1} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{\sin^n x + 1} dx \leq 1$.

65. a) $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx = \int_0^1 x\sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \frac{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \sqrt{2} - \frac{1}{3}$.

b) $g'(x) = f(x) \geq 0 \Rightarrow g$ este crescătoare pe \mathbb{R} .

c) $g(x) = \int_0^x t^2 \sqrt{t^4+1} dt \geq \int_0^x t^4 dt = \frac{x^5}{5} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \Rightarrow$ graficul funcției f nu admite asimptote orizontale la $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = +\infty \Rightarrow$ graficul funcției g nu admite asimptote oblice la $+\infty$.

66. a) $A = \int_0^1 f_1(x) dx = \int_0^1 f_1(x) dx = \left(\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$.

b) $\int_0^1 x [f_1(e^x)]^2 dx = \int_0^1 x(e^x+1) dx = \int_0^1 xe^x dx + \int_0^1 x dx = xe^x|_0^1 - e^x|_0^1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

c) $1 \leq I_n = \int_0^1 \sqrt{x^n+1} dx \leq \int_0^1 (x^n+1) dx = \frac{1}{n+1} + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, deci, prin trecere la limită, obținem $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 1 \Rightarrow$ șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este convergent la 1.

67. a) $I_1 = \int_0^1 x\sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \frac{2(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$.

b) $0 \leq \int_0^1 x^n \sqrt{x^2+1} dx \leq \int_0^1 x^n \sqrt{2} dx = \frac{\sqrt{2}}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

c) $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{n+2} + x^n}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int_0^1 x^{n+1} (\sqrt{x^2+1})' dx + \int_0^1 x^{n-1} (\sqrt{x^2+1}) dx =$

$\sqrt{2} - (n+1) \int_0^1 x^n \sqrt{x^2+1} dx + \sqrt{2} - (n-1) \int_0^1 x^{n-2} \sqrt{x^2+1} dx = 2\sqrt{2} - (n+1)I_n - (n-1)I_{n-2} \Rightarrow$

$I_n = \frac{1}{n+2} [2\sqrt{2} - (n-1)I_{n-2}]$.

68. a) $I_1 = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$.

$$b) I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^1 x^{n-1} (x\sqrt{1-x^2}) dx = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} x^{n-1} \Big|_0^1 + \frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2} (1-x^2) \sqrt{1-x^2} dx =$$

$$\frac{n-1}{3} \int_0^1 x^{n-2} (1-x^2) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{n-1}{3} (I_{n-2} - I_n) \Rightarrow (n+2)I_n = (n-1)I_{n-2}.$$

$$c) 0 \leq \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

$$69. a) \int_1^e x \cdot f(x) dx = \int_1^e x \cdot \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} dx = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

$$b) \int_1^e f^n(x) dx + n \int_1^e f^{n-1}(x) dx = \int_1^e x' \ln^n x dx + n \int_1^e \ln^{n-1} x dx = x \ln^n x \Big|_1^e - n \int_1^e \ln^{n-1} x + n \int_1^e \ln^{n-1} x = e^n.$$

$$c) \int_1^e \ln^n x dx = \int_0^1 t^n e^t dt;$$

$$0 \leq \int_0^1 t^n e^t dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 t^n e^t dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^e f^n(x) dx = 0.$$

În relația $\int_1^e f^{n+1}(x) dx + (n+1) \int_1^e f^n(x) dx = e^n$ trecem la limită

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^e f^{n+1}(x) dx + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^e f^n(x) dx = e^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_1^e f^n(x) dx = e^n.$$

$$70. a) I_{n+3} + I_{n+1} + I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+3} + x^{n+1} + x^n}{x^3 + x + 1} dx = \frac{1}{n+1}.$$

$$b) I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x^3 + x + 1} dx \leq 0, \forall n \geq 1, \text{ deci șirul este descrescător.}$$

$$c) \text{ Avem } 0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

Pe de altă parte $3I_{n+3} \leq I_{n+3} + I_{n+1} + I_n = \frac{1}{n+1} \leq 3I_n \Rightarrow \frac{1}{3(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{3(n-2)}$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \frac{1}{3}.$$

$$71. a) I_1 = \int_0^1 x\sqrt{x+1} dx = \int_1^2 (t-1)\sqrt{t} dt = \frac{4\sqrt{2} + 4}{15}.$$

$$b) I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) \sqrt{x+1} dx \leq 0, \forall n \geq 1, \text{ deci șirul este descrescător.}$$

$$c) nI_n = n \int_0^1 x^n \sqrt{x+1} dx = x^n (x\sqrt{x+1}) \Big|_0^1 - \int_0^1 x^n \left(\sqrt{x+1} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} \right) dx = \sqrt{2} - I_n - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2\sqrt{x+1}} dx.$$

Pe de altă parte $0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n \sqrt{2} dx = \frac{\sqrt{2}}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ și

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2\sqrt{x+1}} dx \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2} dx = \frac{1}{2(n+2)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2\sqrt{x+1}} dx = 0.$$

În final $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \sqrt{2}.$

$$72. a) \Gamma_f = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos 2x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx = 1.$$

$$b) V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 2x dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 4x}{2} dx = \pi \left(\frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{8} \sin 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{\pi^2}{4}.$$

$$c) \int_0^{\frac{\pi}{4}} f^n(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^n(2x) dx = \frac{\sin 2x}{2} \cos^{n-1} 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2(2x) \cos^{n-2}(2x) dx =$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{n-2}(2x) (1 - \cos^2(2x)) dx = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} f^{n-2}(x) dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} f^n(x) dx$$

de unde cerința.

$$73. a) \int_0^2 f_1(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+(1-x)} dx + \int_1^2 \frac{1}{1+(x-1)} dx = 2 \ln 2.$$

b) Fie F o primitivă oarecare a lui f_{2013} ; $F'(x) = f_{2013}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2014-x}, & x \in [0, 2013] \\ \frac{1}{x-2012}, & x > 2013 \end{cases}$;

$$F''(x) = f'_{2013}(x) = \begin{cases} \frac{1}{(2014-x)^2}, & x \in (0, 2013) \\ \frac{-1}{(x-2012)^2}, & x > 2013 \end{cases}, \text{ deci } F \text{ este convexă pe } (0, 2013) \text{ și concavă pe}$$

$(2013, +\infty).$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_{3n-1}^{3n} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_{3n-1}^{3n} \frac{1}{x-n+1} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(\frac{2n+1}{2n} \right) = \frac{1}{2}.$$

74. a) $F'(x) = f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci F este strict crescătoare.

$$b) \int_0^1 \frac{f(x)}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x^2+2}{(x^2+1)(x^2+3)} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+3} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3\sqrt{6}} \right).$$

c) Din teorema de medie pentru integrale aplicată funcției $f: [x, 2x] \rightarrow \mathbb{R}$, există $c_x \in (x, 2x)$ astfel

$$\text{ca } \int_x^{2x} f(t) dt = (2x-x)f(c_x), \text{ deci } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{2x} f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x-x)f(c_x)}{x} = \lim_{c_x \rightarrow +\infty} f(c_x) = 1.$$

Partea 4. VARIANTE DE SUBIECTE

Tema 4.1 Subiecte date la examenul de bacalaureat în anii anteriori

Testul 1 Examen Bacalaureat, iulie 2012

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$(1+i)^2 = 2i$	3p
	$ 2i = 2$	2p
2.	$f(x) = g(x) \Rightarrow x^2 + 3x + 2 = 0$	1p
	$x_1 = -1 \Rightarrow y_1 = -1$	2p
	$x_2 = -2 \Rightarrow y_2 = 0$	2p
3.	$2^{x+1} \leq 2^2$	1p
	$x+1 \leq 2$	2p
	$S = (-\infty, 1]$	2p
4.	$p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}}$	1p
	Submulțimile cu 3 termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice sunt: $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 4\}$, $\{3, 4, 5\}$ și $\{1, 3, 5\} \Rightarrow 4$ cazuri favorabile	2p
	Numărul submulțimilor cu 3 elemente este $C_5^3 = 10 \Rightarrow 10$ cazuri posibile; $p = \frac{2}{5}$.	2p
5.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \Leftrightarrow a + 2 = 3$	4p
	$a = 1$	1p
6.	$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC}$	2p
	$\cos A = -\frac{1}{5}$	3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$	2p
	$\det A = 3m - 6$	3p
b)	Sistemul are o soluție unică și numai dacă $\det A \neq 0$	3p
	Finalizare $m \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$	3p
c)	$\det A = 0$ și $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$, deci matricea sistemului are rangul doi	1p
	$z = \alpha \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = -3\alpha \\ x + 2y = -3\alpha \end{cases} \Rightarrow x = -\alpha, y = -\alpha$	2p
	$x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 3 \Rightarrow (-\alpha)^2 + +(-\alpha)^2 + \alpha^2 = 3 \Rightarrow \alpha \in \{-1, 1\}$	1p

	Soluția este $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, -1)$	1p
2.a)	$X(p) \cdot X(q) = X(p+q+pq)$	3p
	$p, q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \Rightarrow (p+1)(q+1) \neq 0 \Rightarrow p+q+pq \neq -1$, deci $X(p+q+pq) \in G$	2p
b)	Pentru orice $X(p) \in G$, există $X\left(-\frac{p}{1+p}\right)$ astfel încât	3p
	$X(p) \cdot X\left(-\frac{p}{1+p}\right) = X(0)$	2p
	$-\frac{p}{1+p} \neq -1 \Rightarrow X\left(-\frac{p}{1+p}\right) \in G$ și $X\left(-\frac{p}{1+p}\right)$ este inversul lui $X(p)$	1p
c)	$(X(p))^3 = X(7)$	3p
	$(X(p))^3 = X((p+1)^3 - 1)$	1p
	$(p+1)^3 = 8$, deci $p = 1$ și soluția este $X(1)$	

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = 3x^3 - 12$	3p
	$f'(x) \geq 0$ pentru orice $x \in [2, +\infty)$, deci f este crescătoare pe $[2, +\infty)$	2p
b)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	2p
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{3x^3 - 12} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{6x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{6} = +\infty$	3p
c)	Șirul lui Rolle pentru funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - a$ este	3p
	$-\infty, 16 - a, -16 - a, +\infty$	21p
	Ecuția are trei soluții reale distincte dacă și numai dacă $a \in (16, 16)$	1p
2.a)	$F'(x) = f(x)$ pentru orice $x \in (-1, +\infty)$	1p
	$f(x) > 0$ pentru orice $x \in (-1, +\infty)$	2p
	F este strict crescătoare	3p
b)	$\int_0^1 \frac{f(x)}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{2x+3}{(x+1)(x+2)} dx = \int_0^1 \frac{dx}{x+1} + \int_0^1 \frac{dx}{x+2} =$	2p
	$= \ln(x+1) \Big _0^1 + \ln(x+2) \Big _0^1 = \ln 3$	
c)	$\int_x^{2x} f(t) dt = (2t - \ln(t+2)) \Big _x^{2x} = 2x - \ln \frac{2x+2}{x+2}$, pentru $x > 0$	3p
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \ln \frac{2x+2}{x+2}}{x} = 2$	2p

Testul 2 Examen Bacalaureat, iulie 2012, subiect de rezervă

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$(1+2i)^2 = -3+4i$	3p
	Partea reală este egală cu -3	2p

2.	$x_1 + x_2 = 3$	2p
	$x_1 x_2 = a$	2p
	$a = 2$	1p
3.	$x = g(5) \Rightarrow f(x) = 5$	2p
	$2^x + 3 = 5$	2p
	$x = 1$	1p
4.	$p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}}$	1p
	Numărul cazurilor posibile este $2^5 = 32$	2p
	Numărul submulțimilor cu 3 elemente este $C_3^5 = 10 \Rightarrow 10$ cazuri favorabile	1p
	$p = \frac{5}{16}$	1p
5.	$\overrightarrow{AB} \cdot 6\vec{i} + 9\vec{j}$ și $\overrightarrow{AM} = (x_M - 1)\vec{i} + (y_M - 3)\vec{j}$	2p
	$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M - 1 = 2 \\ y_M - 3 = 3 \end{cases}$	2p
	$M(3, 6)$	
6.	$\sin x + 2\cos x = 3\cos x$	1p
	$\sin x = \cos x$	2p
	$x = \frac{\pi}{4}$	1p
		2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$D(0, 1, -1) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}$	2p
	$D(0, 1, -1) = 12$	3p
b)	$A(0, 1, x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2x \\ 0 & 3 & 3x^2 \end{pmatrix}$	1p
	Există minorul $d = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow \text{rang } A(0, 1, x) \geq 2$	1p
	$\text{rang } A(0, 1, x) = 2 \Leftrightarrow D(0, 1, x) = 0$	1p
	$D(0, 1, x) = 6x(x-1) \Rightarrow x = 0 \text{ sau } x = 1$	2p
c)	$D(a, b, c) = 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$	1p
	$D(a, b, c) = 6(b-a)(c-a)(c-b)$	2p
	$D(a, b, c) = 0 \Rightarrow a = b \text{ sau } b = c \text{ sau } c = a$ deci triunghiul este isoscel	2p
2.a)	$f(\hat{1}) = \hat{0}$	2p
	$f(\hat{3}) = \hat{0}$	2p
	Finalizare	1p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = \frac{3-9x}{(x^2+3)\sqrt{x^2+3}}$	4p
	Finalizare	1p
b)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$	3p
	Dreapta de ecuație $y = 1$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$	2p
c)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$	2p
	Din monotonie, valoarea maximă a funcției este $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2\sqrt{7}$	2p
	Imaginea funcției este $(-1, 2\sqrt{7})$	1p
2.a)	F este derivabilă și $F'(x) = \ln x$, pentru orice $x > 0$	3p
	$F' = f$	2p
b)	Aria este egală cu $\int_1^e \ln x dx =$	2p
	$= F(x) \Big _1^e$	3p
c)	$(p+1) \int_1^x f^p(t) dt = \int_1^x t \cdot (p+1) \cdot f^p(t) \cdot \frac{1}{t} dt =$	1p
	$= \int_1^x t \cdot (\ln^{p+1} t)' dt = t \cdot \ln^{p+1} t \Big _1^x - \int_1^x \ln^{p+1} t dt = x \ln^{p+1} x - \int_1^x \ln^{p+1} t dt$	3p
	Finalizare	1p

Testul 3 Examen Bacalaureat, mai 2012, sesiunea specială

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$x^2 + mx + 4 = 0$ are soluția $x = 2 \Rightarrow m = -4$	3p
	Pentru $m = -4$ cele două mulțimi sunt egale	2p
2.	$x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$	2p
	$\Delta = 1$	1p
	$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{1}{4}$	2p
3.	Condiție: $x > 0$	2p
	$3^{\log_3 x} < 3^0 \Leftrightarrow x < 1$	2p
	$x \in (0, 1)$	1p

4.	$p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}}$	2p
	\overline{ab} cu $a, b \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$ sunt 25 de numere \Rightarrow 25 de cazuri favorabile	2p
	\overline{ab} cu $a \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ și $b \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$ sunt 90 de numere \Rightarrow 90 de cazuri posibile	1p
	$p = \frac{5}{18}$	1p
5.	$\frac{3}{a} = \frac{a}{2a-3}$	2p
	$a^2 - 6a + 9 = 0$	2p
	$a = 3$	1p
6.	$S_{ABC} = 12$	2p
	$R = \frac{abc}{4S}$	2p
	$R = \frac{25}{8}$	1p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	3p
	$A(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	2p
b)	$A(x) \cdot A(y) = \begin{pmatrix} \cos x \cos y - \sin x \sin y & 0 & i(\cos x \sin y + \sin x \cos y) \\ 0 & 1 & 0 \\ i(\cos x \sin y + \sin x \cos y) & 0 & \cos x \cos y - \sin x \sin y \end{pmatrix}, \forall x, y \in \mathbb{R};$	1p
	$A(x+y) = \begin{pmatrix} \cos(x+y) & 0 & i \sin(x+y) \\ 0 & 1 & 0 \\ i \sin(x+y) & 0 & \cos(x+y) \end{pmatrix}, \text{ pentru orice } x, y \in \mathbb{R}$	3p
	Finalizare	1p
c)	$A^{2012}(x) = A(2012x)$	2p
	$A(2012x) = I_3 \Leftrightarrow \cos(2012x) = 1 \text{ și } \sin(2012x) = 0$	1p
	$x = \frac{k\pi}{1006}, k \in \mathbb{Z}$	2p
2.a)	$x \circ \frac{1}{2} = \frac{x \cdot \frac{1}{2}}{2x \cdot \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2} + 1} = x, \text{ pentru orice } x \in G$	2p
	$\frac{1}{2} \circ x = \frac{\frac{1}{2} \cdot x}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x - \frac{1}{2} - x + 1} = x \text{ pentru orice } x \in G$	2p
	Finalizare	1p

b)	$x \circ x' = \frac{xx'}{2xx' - x - x' + 1} = \frac{x'x}{2x'x - x' - x + 1} = x' \circ x, \text{ pentru orice } x, x' \in G$	1p
	$x \circ x' = \frac{1}{2} \Rightarrow x' = 1 - x$	3p
	$x \in (0, 1)$	1p
c)	f este bijectivă	2p
	$f(x \circ y) = \frac{1}{x \circ y} - 1 = \frac{(x-1)(y-1)}{xy}$ pentru orice $x, y \in G$	2p
	$f(x)f(y) = \left(\frac{1}{x} - 1\right)\left(\frac{1}{y} - 1\right) = \frac{(x-1)(y-1)}{xy}$ pentru orice $x, y \in G$	1p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x - e^{-x}} = 0$	3p
	$= 0$	2p
b)	$f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$	1p
	$f''(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$	2p
	$f''(x) > 0$ pentru orice x real, deci f este convexă	2p
c)	$g(x) = \frac{e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}}{2} \Rightarrow g'(x) = \frac{e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}}$ pentru orice $x > 0$	2p
	$x > 0 \Rightarrow \sqrt{x} > 0 \Rightarrow e^{\sqrt{x}} > e^{-\sqrt{x}}$	2p
	$g'(x) > 0 \Rightarrow g$ este strict crescătoare pe $(0, +\infty)$	2p
2.a)	$J_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt$	1p
	$J_1 = \cos t \Big _0^{\frac{\pi}{2}}$	2p
	$J_1 = 1$	1p
b)	$I_1 = \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx$	1p
	$I_1 = -\frac{1}{3} \sqrt{1-x^2} \Big _0^1$	3p
	$I_1 = \frac{1}{3}$	1p
c)	$J_{2n} - J_{2n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \cos^2 x dx$	2p
	Cu schimbarea de variabilă $\sin x = t$ obținem $J_{2n} - J_{2n+2} = \int_0^1 t^{2n} \cdot \sqrt{1-t^2} dt = I_{2n}$	3p

Testul 4 Examen Bacalaureat, august 2012

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$\log_2(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + \log_2(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = \log_2(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$	3p
	Finalizare	2p
2.	$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ sau $x = -4$	3p
	Distanța este egală cu 3	2p
3.	Notăm $3^t = t$ și obținem $t + 3t = 4$	3p
	$t = 1 \Leftrightarrow x = 0$	2p
4.	$T_{k+1} = C_{20}^k \cdot x^{20-k} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k = C_{20}^k \cdot x^{20-k-\frac{k}{2}}$	2p
	$20 - k - \frac{k}{2} = 14 \Leftrightarrow k = 4$	2p
	Rangul termenului este 5	1p
5.	$m_d = -\frac{3}{2}$	2p
	Ecuția paralelei este $y - y_A = -\frac{3}{2}(x - x_A)$ adică $y = -\frac{3}{2}x + \frac{15}{2}$	3p
6.	$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow C = \frac{1}{2}$	3p
	$m(\angle C) = 30^\circ$, deoarece $m(\angle A) > m(\angle C)$	2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\det A = \begin{vmatrix} -1 & a & 1 \\ a+2 & a & a+1 \\ a+1 & 2a-1 & 3 \end{vmatrix} =$	2p
	$= \begin{vmatrix} 3a+3 & a & 2a+4 \\ 3a+3 & a & a+1 \\ 3a+3 & 2a-1 & 3 \end{vmatrix} = (3a+3) \begin{vmatrix} 1 & a & 2a+4 \\ 1 & a & a+1 \\ 1 & 2a-1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} 1 & a & 2a+4 \\ 0 & 0 & -a+1 \\ 0 & a-1 & -2a-13 \end{vmatrix}$	2p
	Finalizare	1p
b)	Sistemul este compatibil determinat $\Leftrightarrow \det A \neq 0$	2p
	$\det A = 0 \Leftrightarrow a \in \{-1, 1, -3\}$	2p
c)	$a = -2 \Rightarrow \begin{cases} -x - 2y = 1 \\ -2y - z = 1 \\ -x - 5y + 3z = 2 \end{cases}$	1p
	$x = -\frac{1}{9}, y = -\frac{4}{9}, z = -\frac{1}{9}$	4p
2.a)	$\hat{0}^5 = \hat{0}, \hat{1}^5 = \hat{1}, \hat{2}^5 = \hat{2}, \hat{3}^5 = \hat{3}, \hat{4}^5 = \hat{4}$	5p
b)	$f = X^9 + X^4 + 3X^4 + \hat{3} = X^4(X^4 + \hat{1}) + \hat{3}(X^4 + \hat{1})$	2p
	$f = (X^4 + \hat{1})(X^4 + \hat{3})$	3p
c)	$f(\hat{0}) = \hat{3}$	1p

$a \neq \hat{0} \Rightarrow a^4 = \hat{1}$	2p
$f(a) = \hat{1} + \hat{4} + \hat{3} = \hat{3}$ pentru orice $a \neq \hat{0}$	1p
Finalizare	1p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	f este derivabilă pe \mathbb{R} și $f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$	2p
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1$	3p
b)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x} = 2$	2p
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = 0$	2p
	$y = 2x$ este ecuația asimptotei oblice spre $+\infty$ la graficul funcției f	1p
c)	f este continuă pe \mathbb{R} , $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ și $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow f$ este surjectivă, deci ecuația are soluție	2p
	$f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ este strict crescătoare $\Rightarrow f$ este injectivă, deci soluția e unică	3p
2.a)	$I_1 = \int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} \Big _0^1 =$	3p
	$= \frac{e-1}{2}$	2p
b)	$2I_p = \int_0^1 x^{p-1} (2xe^{x^2}) dx = \int_0^1 (e^{x^2})' x^{p-1} dx = x^{p-1} e^{x^2} \Big _0^1 - (p-1) \int_0^1 e^{x^2} x^{p-2} dx$	3p
	$2I_p = e - (p-1)I_{p-2} \Rightarrow 2I_p + (p-1)I_{p-2} = e$	2p
c)	Considerăm funcția continuă $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = xe^{x^2}$ și șirul de diviziuni $\Delta_n = \left(\frac{k}{n}\right)_{k=0,n}$ cu $\ \Delta_n\ \rightarrow 0$ și punctele intermediare $\frac{k}{n} \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$	1p
	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \left(e^{\frac{1^2}{n^2}} + 2e^{\frac{2^2}{n^2}} + \dots + ne^{\frac{n^2}{n^2}}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cdot e^{\left(\frac{k}{n}\right)^2} =$	2p
	$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx = \frac{e-1}{2}$	2p

Testul 5 Bacalaureat 2012, Model MECTS (www.edu.ro)

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$-24 \leq x+1 \leq 24$	2p
	$-25 \leq x \leq 23$	2p
	$\text{Card } A = 49$	2p
2.	$2x - 1 = 2x^2 - 3x + 1$	1p
	$x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{2}$	3p
	Punctele de intersecție sunt $(2,3)$ și $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$	2p

3.	$1 + 7x = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$	1p
	$x(x^2 + 3x - 4) = 0$	1p
	$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = -4$	3p
4.	Alegem 2 numere impare din cele 5 în $C_2^5 = 10$ moduri	2p
	Alegem un număr par din cele 5 în 5 moduri	1p
	Sunt 50 de submulțimi	2p
5.	Mijlocul segmentului are coordonatele (2, 1)	1p
	Dreapta AB are panta 3, deci mediatoarea are panta $-\frac{1}{3}$	2p
	Ecuația mediatorei este $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$	2p
6.	$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x = \frac{1}{3}$	2p
	$\sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$	2p
	$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sin x = \frac{1}{\sqrt{3}}$	1p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & m & m^2 \\ m & m^2 & 1 \\ m^2 & 1 & m \end{vmatrix} = -(m^3 - 1)^2$	3p
	Finalizare: $m = 1$	2p
b)	Dacă sistemul are soluții nenule, atunci $\Delta = 0$	2p
	În acest caz, sistemul se reduce la $x + y + z = 0$	1p
	Această ecuație nu are soluții cu toate componentele strict pozitive	2p
c)	Pentru $m = 1$, rangul este 1	2p
	Pentru $m \neq 1$, rangul este 3	3p
2.a)	$(x * y) * z = \frac{1}{4}(x-1)(y-1)(z-1) + 1$ și $x * (y * z) = \frac{1}{4}(x-1)(y-1)(z-1) + 1$	4p
	Finalizare: legea este asociativă	1p
b)	Trebuie să arătăm că există $e \in \mathbb{R}$ astfel încât $x * e = e * x = x$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$	1p
	$x * e = x \Leftrightarrow x + e - xe + 1 = 2x \Leftrightarrow (e+1)(x-1) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$, deci $e = -1$	3p
	Verificarea relației $(-1) * x = x, \forall x \in \mathbb{R}$	1p
c)	$x * x * x = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 3}{4}$	2p
	Ecuația $x * x * x = 3$ este echivalentă cu $(x-3)\underbrace{(x^2+3)}_{>0} = 0 \Rightarrow x = 3$	3p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f(-x) = -x^3 + 3x + 2$	2p
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3x + 2}{-x^3 + 3x + 2} = -1$	3p
b)	$f'(A) = 3A^2 - 3$	2p

	$f'(x) \leq 0, \forall x \in [-1, 1] \Rightarrow f$ este descrescătoare pe $[-1, 1]$	3p
c)	$f(1) = 0, f(-1) = 4, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	2p
	Din studiul variației funcției deducem că ecuația $f(x) = m$ are trei soluții reale distincte dacă și numai dacă $m \in (0, 4)$	3p
2.a)	$I_2 = \int_0^1 1 dx - 2 \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 x^4 dx =$	1p
	$= \left(x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right) \Big _0^1 =$	3p
	$= \frac{8}{15}$	1p
b)	$I_n - I_{n+1} = \int_0^1 x^2(1-x^2)^n dx \geq 0$ pentru orice n , deci șirul este descrescător	3p
	$I_n \geq 0$ deci șirul este mărginit inferior	1p
	Finalizare	1p
c)	$I_n = x(1-x^2)^n \Big _0^1 - n \int_0^1 x(1-x^2)^{n-1} \cdot (-2x) dx =$	2p
	$= -2n \int_0^1 [(1-x^2) - 1](1-x^2)^{n-1} dx =$	1p
	$= -2nI_n + 2nI_{n-1} \Rightarrow (2n+1)I_n = 2nI_{n-1}, \forall n \geq 2$	

Testul 6 Examen Bacalaureat, iunie 2011

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$1 < \sqrt{2} < 2$	2p
	$2 < \sqrt{5} < 3$	2p
	Rezultă că 2 este singurul număr întreg din intervalul dat	1p
2.	Axa de simetrie a parabolei este dreapta de ecuație $x = x_v = -\frac{b}{2a}$	2p
	$-\frac{m}{2} = 2 \Rightarrow m = -4$	3p
3.	$x - \frac{\pi}{6} \in \left\{ (-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$	3p
	$x \in \left\{ \frac{\pi}{3}, \pi \right\}$	2p
4.	$A_n^2 = n(n-1)$	2p
	$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$	2p
	$n(n-1) = 12 \Rightarrow n = 4$	1p
5.	$\frac{a}{1} = \frac{1}{-2}$	3p
	$a = -\frac{1}{2}$	2p

6.	$\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} = 2$	2p
	$1 = 2 \sin x \cdot \cos x$	2p
	$\sin 2x = 1$	1p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A(x) \cdot A(y) = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & y & y^2 \\ 0 & 1 & 2y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	1p
	$\begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & y & y^2 \\ 0 & 1 & 2y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x+y & (x+y)^2 \\ 0 & 1 & 2(x+y) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A(x+y)$	4p
b)	$A(x) - A(y) = \begin{pmatrix} 0 & x-y & x^2-y^2 \\ 0 & 0 & 2(x-y) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	1p
	$(A(x) - A(y))^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2(x-y)^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	2p
	$(A(x) - A(y))^3 = O_3 \Rightarrow (A(x) - A(y))^{2011} = O_3$	2p
c)	Matricea A este inversabilă	1p
	$(A(x))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -x & x^2 \\ 0 & 1 & -2x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A(-x)$	4p
2.a)	$f(-1) = -1 + 1 - \alpha - i(\alpha - 2) + \alpha + (\alpha - 2)i$	2p
	Finalizare: $f(-1) = 0$	3p
b)	Rădăcinile lui g sunt de forma $x_1 = u + iv$ și $x_2 = u - iv$, unde $u, v \in \mathbb{R}$	1p
	Din relația lui Viète rezultă $x_1 + x_2 = -p$ și $x_1 x_2 = q$	1p
	$p = -2 \in \mathbb{R}$ și $q = u^2 + v^2 \in \mathbb{R}$	2p
	Ecuția $x^2 + px + q = 0$, cu $p, q \in \mathbb{R}$, are soluții distincte complex conjugate dacă și numai dacă $\Delta < 0$, de unde $p^2 < 4q$	1p
c)	$f = (X+1)(X^2 - \alpha X + \alpha + (\alpha - 2)i)$	2p
	Polinomul $h = X^2 - \alpha X + \alpha + (\alpha - 2)i \in \mathbb{C}[X]$ are două rădăcini distincte complex conjugate	1p
	Conform punctului b), rezultă $\alpha \in \mathbb{R}$ și $\alpha + (\alpha - 2)i \in \mathbb{R}$, de unde $\alpha = 2$, care convine	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{-2}{x^2-1}$	3p
------	--	----

	$f'(x) < 0$ pentru orice $x > 1$, de unde concluzia	2p
b)	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$, deci $x = 1$ este asimptotă verticală	2p
	f este continuă pe $(1, \infty)$, deci nu are alte asimptote verticale	1p
	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x+1}{x-1} = 0$, deci $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$	2p
c)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1) - \ln(x-1)}{x^{-1}}$ - nedeterminare de forma $\frac{0}{0}$	2p
	Cu regula lui l'Hospital, limita este $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^{-1} - (x-1)^{-1}}{-x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2-1} = 2$	3p
2.a)	$\int_1^4 (x - 3\sqrt{x} + 2) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} + 2x \right) \Big _1^4 =$	4p
	$= -\frac{1}{2}$	1p
b)	$A = \int_1^2 \left \frac{f(x)}{x} \right dx = - \int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx$, deoarece $f \leq 0$ pe intervalul $[1, 2]$	2p
	$= - \int_1^2 x dx + 3 \int_1^2 dx - \int_1^2 \frac{2}{x} dx =$	1p
	$= \frac{3}{2} - 2 \ln 2$	2p
c)	$\int_1^2 f^n(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (2x-3)' f^n(x) dx = \frac{1}{2} (2x-3) (x^2 - 3x + 2) \Big _1^2 -$	3p
	$-\frac{1}{2} \int_1^2 (2x-3)^2 n f^{n-1}(x) dx =$	
	$= -\frac{n}{2} \int_1^2 (4x^2 - 12x + 8 + 1) f^{n-1}(x) dx = -\frac{4n}{2} \int_1^2 f^n(x) dx - \frac{n}{2} \int_1^2 f^{n-1}(x) dx$, de unde concluzia	2p

Testul 7 Examen Bacalaureat, august 2011

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$b_3 = b_1 q^2, b_4 = b_1 q^3$	2p
	$24 = 6q^2$	2p
	$q = 2$	1p
	$q = 2$	3p
2.	$1 - a^2 = 0$	2p
	$a = 1$ sau $a = -1$	1p
3.	$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{-x}$	2p
	Deoarece $\frac{3}{2} > 1$, inecuația devine $x < -x$	2p
	$S = (-\infty, 0)$	2p
4.	$T_{k+1} = C_{10}^k \sqrt{2}^k, k \in \{0, 1, \dots, 10\}$	2p

$T_{k+1} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow k$ par	2p
Sunt 6 termeni raționali	1p
5. $BC: x + y - 1 = 0$	2p
Distanța este $\frac{ 2+2-1 }{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$	3p
6. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$	2p
$\overline{AB} \cdot \overline{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos A =$	2p
$= 10$	1p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	4p
Așadar $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in H$	1p
b) $(A^n)^2 = A^{2n} = (A^2)^n =$	2p
$= A^n$, deci $A^n \in H$	3p
c) Matricele $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ aparțin lui H pentru orice $x \in \mathbb{R}$	4p
Finalizare	1p
2.a) Restul împărțirii polinomului f la $X - i$ este $f(i)$	2p
$f(i) = (2i)^{10} = -2^{10}$	3p
b) $f = \sum_{k=0}^{10} (C_{10}^k X^{10-k} i^k + C_{10}^k X^{10-k} (-i)^k) = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k X^{10-k} i^k (1 + (-i)^k)$	2p
$a_{2p+1} = 0 \in \mathbb{R}$, pentru orice $p \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$	1p
$a_{2p} = C_{10}^{2p} i^{2p} (1 + (-1)^{2p}) = 2C_{10}^{2p} \cdot (-1)^p \in \mathbb{R}$, pentru orice $p \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$	2p
c) Dacă z este rădăcină, atunci $(z+i)^{10} = -(z-i)^{10}$, deci $ z+i = z-i $	3p
Punctul de afix z este egal depărtat de punctele de afixe $\pm i$, deci aparține axei reale	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$	2p
$f'(x) = 5x^4 - 5$	2p
$f'(2) = 75$	1p
b) $f''(x) = 20x^3$ se anulează în 0	3p
Deoarece f'' are semne opuse de o parte și de cealaltă a lui 0, rezultă că 0 este punct de inflexiune.	2p
c) $f'(x) = 0 \Rightarrow x^4 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$	1p
Tabelul de variație a funcției f	2p

Finalizare	2p
2.a) $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big _0^1 =$	3p
$= \frac{e-1}{e}$	2p
b) Cu schimbarea de variabilă $x^3 = t$ se obține $\frac{1}{3} \int_0^1 t \cdot e^{-t} dt =$	2p
$= -\frac{1}{3} t e^{-t} \Big _0^1 + \frac{1}{3} \int_0^1 e^{-t} dt = \frac{e-2}{3e}$	3p
c) $I_{n+1} - I_n = \int_n^{n+1} g(x^3) dx = \int_n^{n+1} e^{-x^3} dx \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, deci șirul este crescător	2p
$0 \leq I_n \leq \int_0^n e^{-x} dx = \frac{1}{e} - \frac{1}{e^n} < \frac{1}{e}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, deci șirul este mărginit	2p
Deoarece șirul este monoton și mărginit, el este convergent	1p

Testul 8 Bacalaureat 2011, Model MECTS (www.edu.ro)

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. $ 1 - i\sqrt{3} = \sqrt{1 + (-\sqrt{3})^2} =$	3p
$= \sqrt{4} = 2$	2p
2. $x^2 + x + 1 - y = 0$	1p
$\Delta = 4y - 3 \geq 0$	2p
$\text{Im}_f = \left[\frac{3}{4}, +\infty \right)$	2p
3. $b_1 = \frac{3}{2}$	1p
$q^2 = 4$	2p
$b_7 = 96$	2p
4. $\log_a x = \log_a 9 - \log_a 8$	3p
$\log_a x = \log_a \frac{9}{8} \Rightarrow x = \frac{9}{8}$	2p
5. $m_d = -\frac{1}{2} \Rightarrow m_{d'} = 2$ unde $d \perp d'$	2p
Ecuția dreptei d' este $y = 2x - 4$	3p
6. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = \frac{1}{9}$	2p
$\cos x = \pm \frac{1}{3}$	1p
$x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right) \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{3}$	2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A(2) - A(0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 16 \\ 0 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	2p
	$(A(2) - A(0))^3 = O_3$	2p
	$(A(2) - A(0))^{2010} = O_3$	1p
b)	$A(x)A(y) = \begin{pmatrix} 1 & -2x-2y & 4y^2+8xy+4x^2 \\ 0 & 1 & -4x-4y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	3p
	Finalizare	2p
c)	$\det(A(x)) = 1 \neq 0$, deci matricea este inversabilă	1p
	$A(x)A(-x) = A(0) = I_3$	2p
	$A^{-1}(x) = A(-x) = \begin{pmatrix} 1 & 2x & 4x^2 \\ 0 & 1 & 4x \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	2p
2.a)	$x * \frac{1}{2} = \frac{1}{2} * x = x, \forall x \in G$	1p
	Verificare	3p
	Legea „*“ are element neutru $e = \frac{1}{2}$	1p
b)	Orice element din G este simetrizabil și $x' = 1 - x$	3p
	$0 < x' < 1$, deci $x' \in G$	2p
c)	Justificarea faptului că funcția f este bijectivă	2p
	$f(x * y) = \frac{1}{x * y} - 1 = \frac{(x-1)(y-1)}{xy}$	2p
	$f(x)f(y) = \left(\frac{1}{x} - 1\right)\left(\frac{1}{y} - 1\right) = \frac{(x-1)(y-1)}{xy} = f(x * y)$	1p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\lim_{n \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} =$	2p
	$= \lim_{n \rightarrow 5} (x-2)(x-3)(x-4) =$	2p
	$= 6$	1p
b)	$\frac{f(n+1)-1}{f(n)-1} = \frac{n-1}{n-5}$	1p
	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(n+1)-1}{f(n)-1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n-5} \right)^n =$	1p
	$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4}{n-5} \right)^n =$	1p
	$= e^4$	2p
c)	$f(2) = 1, f(3) = 1, f(4) = 1, f(5) = 1$	1p

	f continuă pe intervalele $[2,3], [3,4], [4,5]$	1p
	f derivabilă pe intervalele $(2,3), (3,4), (4,5)$	1p
	Din teorema lui Rolle și din faptul că f' este de gradul trei rezultă că $f'(x) = 0$ are exact trei soluții reale distincte	2p
2.a)	$I_0 = \int_0^1 \frac{1-x}{x^2+1} dx =$	1p
	$\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \arctg x \Big _0^1 = \frac{\pi}{4}$	1p
	$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big _0^1 = \frac{\ln 2}{2}$	2p
	$I_0 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$	1p
b)	$I_2 - I_0 = \int_0^1 \frac{(x^2+x+1)^2 - 1}{x^2+1} dx =$	1p
	$\int_0^1 (x^2+2x+2) dx - \int_0^1 \frac{2}{x^2+1} dx =$	1p
	$= \frac{10}{3} - 2 \int_0^1 \frac{dx}{x^2+1} =$	2p
	$= \frac{10}{3} - \frac{\pi}{2} \notin \mathbb{Q}$	2p
c)	$X^2 + 1$ divide $(X^2 + X + 1)^{4n+1} - X$	1p
	$\frac{(x^2+x+1)^{4n+1} - x}{x^2+1} = g(x)$, unde $g \in \mathbb{Z}[X]$	2p
	$\int_0^1 g(x) dx \in \mathbb{Q}$	2p

Testul 9 Examen Bacalaureat, iunie 2010

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$((1-i)(i-1))^4 = (2i)^4 =$	3p
	$= 16$	2p
2.	$f(-x) = \ln \frac{3+x}{3-x} =$	2p
	$= \ln \left(\frac{3-x}{3+x} \right)^{-1} = -\ln \frac{3-x}{3+x} =$	1p
	$= -f(x)$	2p
3.	$x^2 + 2x - 8 = (x-2)(x+4)$	2p
	$x \in (-4, 2)$	1p
	$(-4, 2) \cap \mathbb{Z} = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$	1p

4.	25 de numere sunt divizibile cu 4	1p
	20 de numere sunt divizibile cu 5	1p
	5 numere sunt divizibile cu 4 și cu 5	1p
	Deci 40 de numere sunt divizibile cu 4 sau cu 5	2p
5.	Fie $Q(a, b)$. Avem $\overrightarrow{MQ} = (a-1)\vec{i} + (b+2)\vec{j}$ și $\overrightarrow{NP} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$	2p
	$MNPQ$ este paralelogram $\Leftrightarrow \overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{NP} \Leftrightarrow a-1=2$ și $b+2=3$	2p
	Punctul căutat este $Q(3,1)$	1p
6.	$A_{ABC} = 2\sqrt{14}$	3p
	$AD = \frac{4\sqrt{14}}{5}$	2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\det(A) = 0$	3p
	$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 7$ (sau orice alt minor de ordinul 2 nenul), deci rangul matricei A este 2.	2p
b)	Minorul caracteristic este nul, deci sistemul este compatibil nedeterminat.	2p
	De exemplu, luând $z = \alpha$ necunoscută secundară se obține $x = 2\alpha - 3$, $y = 31 - 3\alpha$, $z = \alpha$	3p
c)	$x = 2\alpha - 3 \geq 0$, $y = 31 - 3\alpha \geq 0$, $z = \alpha \geq 0 \Rightarrow$	1p
	$\frac{3}{2} \leq \alpha \leq \frac{31}{3}$	2p
	$\alpha \in \{2, 3, 4, \dots, 10\}$	1p
	Sunt 9 soluții în $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.	1p
2.a)	$a, b \in \mathbb{Z}_5$ și $\text{card } \mathbb{Z}_5 = 5$.	2p
	Deci mulțimea A are 25 de elemente.	3p
b)	$\begin{pmatrix} \hat{3} & \hat{1} \\ -\hat{1} & \hat{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{3}a - b & \hat{3}b + a \\ -a - \hat{3}b & -b + \hat{3}a \end{pmatrix}$	2p
	$\begin{pmatrix} \hat{3}a - b & \hat{3}b + a \\ -a - \hat{3}b & -b + \hat{3}a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}$ dacă $\hat{3}a = b$ și $\hat{3}b = -a$.	1p
	Un exemplu: $M = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{3} \\ -\hat{3} & \hat{1} \end{pmatrix}$.	2p
c)	Dacă $X = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}$ atunci $X^2 = I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x^2 - y^2 & 2xy \\ -2xy & x^2 - y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \Leftrightarrow x^2 - y^2 = \hat{1}$	1p
	și $xy = \hat{0}$	
	Dacă $x = \hat{0} \Rightarrow y^2 = \hat{4} \Rightarrow y \in \{\hat{2}, \hat{3}\}$; dacă $y = \hat{0} \Rightarrow x^2 = \hat{1} \Rightarrow x \in \{\hat{1}, \hat{4}\}$	2p
	Obținem matricele $\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{2} \\ -\hat{2} & \hat{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{3} \\ -\hat{3} & \hat{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \hat{4} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{4} \end{pmatrix}$	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\pi}{4}$	3p
	Deci $y = \frac{\pi}{4}$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$.	2p
b)	$f'(x) = \frac{1}{2x^2 + 2x + 1}$	2p
	$2x^2 + 2x + 1 > 0$ pentru orice x real, deci $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	2p
	Funcția f este strict crescătoare pe $(-\infty, -1)$ și pe $(-1, +\infty)$.	1p
c)	$f''(x) = \frac{-2(2x+1)}{(2x^2 + 2x + 1)^2}, x \neq -1$	2p
	$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$	1p
	Din tabelul de variație rezultă că $x = -\frac{1}{2}$ este punctul de inflexiune al funcției f .	2p
2.a)	$I_n = \int_n^{n+1} \left(2 - \frac{1}{x}\right) dx = (2x - \ln x) \Big _n^{n+1} = 2 - \ln \frac{n+1}{n}$	2p
	$I_{n+1} - I_n = \ln \frac{n+1}{n} - \ln \frac{n+2}{n+1} =$	1p
	$= \ln \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} = \ln \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n^2 + 2n}\right) > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*,$ deci șirul este strict crescător.	2p
b)	$1 < \frac{n+1}{n} \leq 2 < e \Rightarrow 0 < \ln \frac{n+1}{n} < 1$	2p
	$1 < 2 - \ln \frac{n+1}{n} < 2$	1p
	$1 < I_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}^*,$ deci șirul este mărginit.	2p
c)	$\lim_{n \rightarrow \infty} n(2 - I_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{n+1}{n} =$	3p
	$= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \ln e = 1$	

Testul 10 Examen Bacalaureat, iunie 2010, subiect de rezervă

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$(i\sqrt{2} - 1)^2 + 2(i\sqrt{2} - 1) + 3 =$	1p
	$= 2i^2 - 2i\sqrt{2} + 1 + 2i\sqrt{2} - 2 + 3 =$	2p
	$= 0$	2p
2.	$f(g(x)) = 2(x^2 - a) + a =$	1p
	$= 2x^2 - a$	2p
	$2x^2 - a > 0 \Leftrightarrow a < 0$	

3.	$\sqrt{(x-1)^2} = x+1$	2p
	$ x-1 = x+1$	1p
	$x=0$	1p
4.	0, 3, 6, 9, ..., 2010 sunt în progresie aritmetică cu rația 3.	2p
	Numărul termenilor este 671.	2p
5.	Mijlocul segmentului $[BC]$ este $M(2,1)$.	3p
	Ecuția medianei este $y = 4x - 7$.	2p
6.	$\sin \frac{\pi}{12} = \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) =$	3p
	$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$	2p
		3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\begin{cases} x+y=1 \\ x+z=-1 \\ y+z=0 \end{cases}$	2p
	$S = \{(0,1,-1)\}$	3p
b)	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$	3p
	Rang $A = 2$.	1p
	Sistemul este compatibil, deoarece rang $\bar{A} = 2$.	1p
c)	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2a & 1 \\ 2a & 1 & a+1 \end{vmatrix} = -2(2a-1)(a-1)(a+1)$	3p
	$a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \pm 1, \frac{1}{2} \right\}$	2p
2.a)	$x_1 = 2+i \Rightarrow x_2 = 2-i$	1p
	Folosind relațiile lui Viète, obținem $x_3 = 3 - x_1 - x_2 = -1$.	2p
	$m=1, n=-5$	2p
b)	Restul este $r = X(m-3) + 1 - n$.	3p
	$m=3$ și $n=1$.	2p
c)	Presupunând prin absurd că $x_1 \leq 0$, rezultă $x_1^3 \leq 0, -3x_1^2 \leq 0, mx_1 \leq 0, -n < 0$.	3p
	Adunând cele patru relații se obține $0 = f(x_1) < 0$, o contradicție.	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$	2p
	$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3x + 2 - x^3}{\sqrt[3]{(x^3 - 3x + 2)^2} + x\sqrt[3]{x^3 - 3x + 2} + x^2} = 0$	2p

	Asimptota oblică este $y = x$.	1p
b)	$x^3 - 3x + 2 = (x+1)^2(x-2)$	1p
	$\frac{f(x) - f(-2)}{x+2} = \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2}{(x+2)^2}}$	1p
	$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x+2} = \infty$	2p
	Deci f nu e derivabilă în -2 .	1p
c)	$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\ln(x^3 - 3x^2 + 2)}{\ln x^3} =$	2p
	Finalizare: limita este egală cu 1.	3p
2.a)	Cu substituția $\sin x = t$ se obține $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} =$	3p
	$= \arctg t \Big _0^1 = \frac{\pi}{4}$	2p
b)	Dacă funcția F este o primitivă a funcției f , atunci $F'(x) = \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x}, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$	2p
	Cum $\cos x \in [-1, 1], \forall x \in \mathbb{R}$, rezultă $F'(x) = \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} \geq 0, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$	2p
	F este strict crescătoare pe $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$	1p
c)	$f(y) = f(2\pi - y)$	1p
	Cu substituția $x = 2\pi - y$ se obține $I = \int_0^{2\pi} (2\pi - y)f(y)dy =$	1p
	$= 2\pi \int_0^{2\pi} f(y)dy - I$	1p
	$\int_0^{2\pi} f(y)dy = 0$	1p
	Deci $I = 0$	1p

Testul 11 Examen Bacalaureat, august 2010

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$2\sqrt[3]{6} = \sqrt[3]{48}$	2p
	$3\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{81}$	2p
	$2\sqrt[3]{6} < 3\sqrt[3]{3}$	1p
2.	$ x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{Im } f \subset [0, +\infty)$	2p
	$x \geq 0 \Rightarrow x = f(x) \Rightarrow [0, +\infty) \subset \text{Im } f$	2p
	$\text{Im } f = [0, +\infty)$	1p
3.	$\Delta = 1 - 4m^2$	2p

	Ecuția are două soluții egale $\Leftrightarrow \Delta = 0$	1p
	$\Delta = 0 \Leftrightarrow m = \pm \frac{1}{2}$	2p
4.	$T_{k+1} = C_{41}^k \sqrt[4]{2^k} = C_{41}^k 2^{\frac{k}{4}}$	2p
	$T_{k+1} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow 4 \text{ divide } k.$	1p
	Sunt 11 termeni raționali.	2p
5.	$m_{AB} = m_{CD}$	1p
	$m_{AB} = -\frac{1}{2}$ și $m_{CD} = \frac{a+3}{3}$	2p
	Finalizare: $a = -\frac{9}{2}$	2p
6.	$\sin^3 x + \cos^3 x = 1, x \in A$, numai pentru $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$	3p
	$P = \frac{2}{5}$	2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}$	1p
	$A^3 = aI_3$	2p
	$A^{2010} = (A^3)^{670} = a^{670}I_3$	2p
b)	$B_1 = A + A^2 + A^3 = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ a & a & 1 \\ a & a & a \end{pmatrix}$	2p
	$\det(B_1) = a(a-1)^2$	2p
	$\det(B_1) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ sau } a = 1$	1p
c)	$B_n = A^{n-1}B_1$	1p
	B_n inversabilă $\Leftrightarrow \det(B_n) \neq 0$	1p
	$\det B_n = a^n(a-1)^2$	2p
	$a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$	1p
2.a)	$x * y = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(y - \frac{3}{2}\right) + \frac{3}{2} + m - 6$	1p
	Dacă $m = 6$, atunci oricare ar fi $x, y \in M$ rezultă că $x * y \neq \frac{3}{2}$, adică $x * y \in M$	2p
	Dacă $m \neq 6$, atunci $0 * \frac{2m-3}{6} = \frac{3}{2}$	1p
	Cum $0, \frac{2m-3}{6} \in M$ rezultă $0 * \frac{2m-3}{6} \notin M$, deci $m = 6$	1p
b)	Asociativitatea	1p
	Justificarea faptului că elementul neutru este 2	2p

	Justificarea faptului că pentru $x \in M$, există $x' = \frac{3x-4}{2x-3} \in M$ astfel încât $x * x' = x' * x = 2$	2p
c)	Verificarea relației $f(x * y) = f(x) \cdot f(y), \forall x, y \in M$	3p
	Justificarea faptului că f este bijectivă.	

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x-1)^2}} - \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}, x \neq \pm \frac{1}{2}$	2p
	$f(0) = -2$ și $f'(0) = 0$	2p
	$y + 2 = 0$	1p
b)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$	3p
	$y = 0$ asimptotă orizontală spre $+\infty$	2p
c)	$f(1) + f(2) + \dots + f(n) = 1 - \sqrt[3]{2n+1}$	2p
	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2n+1}} \right)^{-\sqrt[3]{2n+1}} - \frac{\sqrt[3]{2n}}{\sqrt[3]{2n+1}} \right] =$	1p
	$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{\sqrt[3]{2n}}{\sqrt[3]{2n+1}} \right)} =$	1p
	$= e^{-1} = \frac{1}{e}$	1p
2.a)	$I_1 + I_2 + I_3 = \int_0^1 \frac{x^3 + x^2 + x}{x^2 + x + 1} dx =$	2p
	$= \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$	3p
b)	$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x^n \geq x^{n+1}$	1p
	$x^2 + x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$	2p
	$\frac{x^n}{x^2 + x + 1} \geq \frac{x^{n+1}}{x^2 + x + 1}, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow I_n \geq I_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, adică șirul este descrescător	2p
c)	$x^2 + x + 1 \geq 1, \forall x \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \frac{x^n}{x^2 + x + 1} \leq x^n, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$	2p
	$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$	2p
	$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$	1p

Testul 12 Bacalaureat 2010, Model MECS (www.edu.ro)

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$z = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$	2p
----	---	----

	$z^6 = 2^6 \cdot \left(\cos \frac{6\pi}{6} + i \sin \frac{6\pi}{6} \right) = -2^6 \Rightarrow \operatorname{Re} z^6 = -64$	3p
2.	$f(512) = \frac{1}{8}$	2p
	$(f \circ f)(512) = f\left(\frac{1}{8}\right) = 2$	3p
3.	Ecuția devine $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$, cu soluțiile $\sin x = -\frac{1}{2}$ și $\sin x = 1$.	3p
	Obținem $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ și $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.	2p
4.	Numărul cerut este egal cu numărul submulțimilor cu trei elemente ale mulțimii M .	3p
	Acesta este $C_3^3 = 20$.	2p
5.	Punctul $A(0,3)$ se află pe prima dreaptă.	2p
	Distanța este $d(A, d_2) = \frac{ 2 \cdot 0 + 4 \cdot 3 - 11 }{\sqrt{2^2 + 4^2}} = \frac{1}{\sqrt{20}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$	3p
6.	$\overline{AC} \cdot \overline{AD} = (\overline{AB} + \overline{AD}) \cdot \overline{AD} = \overline{AB} \cdot \overline{AD} + \overline{AD}^2$	3p
	$\overline{AB} \cdot \overline{AD} = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 1$	1p
	$\overline{AC} \cdot \overline{AD} = 1 + 2^2 = 5$	1p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & b & c \\ a+b+c & a & b \\ a+b+c & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & b \\ 1 & c & a \end{vmatrix}$	2p
	$\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & b \\ 1 & c & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$, de unde rezultă concluzia	3p
b)	Observăm că $x=0, y=1, z=0$ verifică sistemul.	3p
	Cum soluția este unică, aceasta este soluția căutată.	2p
c)	$a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 + (a-c)^2 + (c-b)^2 = 0 \Leftrightarrow a=b=c$	2p
	Sistemul are o infinitate de soluții de forma $x=\alpha, y=\beta, z=1-\alpha-\beta$.	2p
	Putem lua $\beta = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{1-4\alpha^2-4\alpha})$, cu $4\alpha^2 + 4\alpha - 1 \leq 0$.	1p
2.a)	a, b, c pot lua fiecare 4 valori	3p
	Avem $4^3 = 64$ matrice.	2p
b)	Luăm $A = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{2} \end{pmatrix}$	3p
	$\det(A) = \hat{2}, \det(A^2) = \hat{0}$	2p
c)	$X = \begin{pmatrix} a & b \\ \hat{0} & c \end{pmatrix} \Rightarrow X^2 = \begin{pmatrix} a^2 & b(a+c) \\ \hat{0} & c^2 \end{pmatrix}$	2p

Ecuția devine $a^2 = \hat{1}, b(a+c) = \hat{0}, c^2 = \hat{0}$.	1p
Obținem $a \in \{\hat{1}, \hat{3}\}, c \in \{\hat{0}, \hat{2}\}, b = \hat{0}$, deci există 4 soluții.	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \Rightarrow m = 1$	2p
	$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = 0$, deci avem asimptotă oblică $y = x$.	3p
b)	$f'(x) = \frac{(2x+1)(x+1) - (x^2+x+1)}{(x+1)^2}$	3p
	$f'(x) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$	2p
c)	$f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}$	3p
	$f''(x) < 0, \forall x \in (-\infty, -1)$, deci f este concavă pe $(-\infty, -1)$.	2p
2.a)	$\int_0^\pi \sin 2x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin 2x dx$	2p
	$I = \frac{-\cos 2x}{2} \Big _0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\cos 2x}{2} \Big _{\frac{\pi}{2}}^\pi$	2p
	$I = 2$	1p
b)	$I_n = \int_\pi^{2\pi} \frac{f_n(x)}{x} dx \leq \int_\pi^{2\pi} \frac{1}{x} dx$	3p
	$\int_\pi^{2\pi} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big _\pi^{2\pi} = \ln 2$	2p
c)	$I_n = \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{ \sin t }{t} dt$	1p
	$I_n = \int_{n\pi}^{n\pi+\pi} \frac{ \sin t }{t} dt + \int_{n\pi+\pi}^{n\pi+2\pi} \frac{ \sin t }{t} dt + \dots + \int_{2n\pi-\pi}^{2n\pi} \frac{ \sin t }{t} dt$	2p
	$I_n \geq \frac{1}{\pi(n+1)} \int_{n\pi}^{n\pi+\pi} \sin t dt + \frac{1}{\pi(n+2)} \int_{n\pi+\pi}^{n\pi+2\pi} \sin t dt + \dots + \frac{1}{2n\pi} \int_{2n\pi-\pi}^{2n\pi} \sin t dt$	1p
	Din $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \sin t dt = 2, \forall k \in \mathbb{Z}$ rezultă concluzia.	1p

Tema 4.2 Variante de subiecte propuse spre rezolvare

Testul 1

Subiectul I

- $a_5 + a_{11} = a_1 + 4r + a_1 + 10r = 2a_1 + 14r = 2(a_1 + 7r) = 2a_8$. Deci $a_8 = 10$.
- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3g(x) + 2 = 2(2x + a) + 2 = 6x + 3a + 2$ și $(g \circ f)(x) = 6x + 4 + a$. Rezultă că $3a + 2 = a + 4$, deci $a = 1$. 3. Pentru $x > 0$, avem $9^{\log_3 x} = x^{\log_3 9} = x^2$, deci ecuația se scrie $2x^2 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 4$, deci $x = 2$, deoarece $x > 0$. 4. Numărul submulțimilor nevide este $2^5 - 1 = 31$. Numărul submulțimilor cu 2, 3 sau 5 elemente este $C_5^2 + C_5^3 + C_5^5 = 21$. Probabilitatea este $\frac{21}{31}$.

5. $\cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{2 + m^2}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} > 0$, deci unghiul vectorilor \vec{u} și \vec{v} este ascuțit.

6. $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \left(\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) = 2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} \cos x \right) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \leq 2$.

Subiectul II

1. a) Fie $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$. Cum $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ -6 & -3 \end{pmatrix} = 3A$, rezultă că $A \in M$.

b) Fie $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M$. Dacă $\det(X) \neq 0$, rezultă că X e inversabilă și, din $X^2 = 3X$, rezultă

$X = 3I_2$, deci $a + d = 3 + 3 = 6$. Dacă $\det(X) = 0$, atunci $X^2 = (a + d)X$. Cum $X^2 = 3X$ rezultă că $(a + d)X = 3X$, dacă $(a + d - 3)X = O_2$.

Obținem $a + d - 3 = 0$ sau $X = O_2$. Rezultă că $a + d = 3$ sau $a + d = 0$, deci $a + d \in \{0, 3, 6\}$.

c) Dacă $X, Y \in M$, rezultă că $X^2 + Y^2 = 3(X + Y)$. Cum $X + Y \in M$, obținem: $(X + Y)^2 = 3(X + Y)$, deci $(X + Y)^2 = X^2 + Y^2$. Rezultă $X^2 + Y^2 + XY + YX = X^2 + Y^2$, deci $XY = -YX$.

2. a) $x * y = \frac{xy}{x + y} = \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^{-1}$, $x, y \in (0, \infty)$. Avem $(x * y) * z = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^{-1} *$

$* z = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)^{-1}$ și $x * (y * z) = x * \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)^{-1}$, deci legea „*” este asociativă.

b) Dacă $e \in (0, \infty)$ ar fi element neutru al legii „*”, atunci $1 * e = 1$, deci $\frac{e}{e + 1} = 1$, de unde $e = e + 1$.

Rezultă $0 = 1$, fals. Deci „*” nu are element neutru.

c) $x * x * x * x = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \right)^{-1} = \left(\frac{4}{x} \right)^{-1} = \frac{x}{4}$. Ecuația devine $\frac{x}{4} = 5$, deci $x = 20$.

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = -1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 4} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 4}{\sqrt{x^2 + 2x + 4} + x} = 1$, deci dreapta

de ecuație $y = -x + 1$ este asimptotă oblică spre $+\infty$.

b) $f'(x) = \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x + 4}} - 2 = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 4}} - 2 = \frac{x + 1}{\sqrt{(x + 1)^2 + 3}} - 2 < 1 - 2 = -1 < 0$ oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$,

deci f este strict descrescătoare.

c) Fie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = e^x - x - 1$. Cum $g'(x) = e^x - 1$ și $g'(x) < 0$ pentru $x \in (-\infty, 0)$ și

$g'(x) > 0$ pentru $x \in (0, \infty)$, din monotonia lui g rezultă că $g(x) > g(0)$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, deci $e^x > x + 1$, pentru orice $x \in \mathbb{R}^*$. Cum f este strict descrescătoare, rezultă că $f(e^x) < f(x + 1)$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$.

2. a) $I_1 = \int_0^{\pi} e^x \cos x dx = \int_0^{\pi} (e^x)' \cos x dx = e^x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} e^x \sin x dx = -e^{\pi} - 1 + \int_0^{\pi} e^x \sin x dx = -e^{\pi} - 1 + e^x \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^x \cos x dx = -e^{\pi} - 1 - I_1$. Rezultă că $2I_1 = -e^{\pi} - 1$, deci $I_1 = -\frac{e^{\pi} + 1}{2}$.

b) $|I_n| = \left| \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx \right| \leq \int_0^{\pi} e^x |\cos nx| dx = \int_0^{\pi} e^x |\cos nx| dx \leq \int_0^{\pi} e^x dx = e^x \Big|_0^{\pi} = e^{\pi} - 1 < 3^4 - 1 = 80$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

c) Deoarece $I_n = \int_0^{\pi} e^x \left(\frac{\sin nx}{n} \right)' dx = \frac{e^x \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^x \frac{\sin x}{n} dx = -\frac{1}{n} \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx$, rezultă că $|I_n| = \frac{1}{n} \left| \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx \right| \leq \frac{1}{n} \int_0^{\pi} e^x |\sin nx| dx \leq \frac{1}{n} \int_0^{\pi} e^x dx \leq \frac{1}{n} (e^{\pi} - 1)$. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Testul 2

Subiectul I

1. Fie q rația progresiei. Atunci $a_1 + a_2 + a_3 = a_1(1 + q + q^2)$ și $a_4 + a_5 + a_6 = a_1(q^3 + q^4 + q^5) = a_1q^3(1 + q + q^2)$. Obținem $\frac{a_1q^3(1 + q + q^2)}{a_1(1 + q + q^2)} = 8$, deci $q^3 = 8$, de unde $q = 2$.

2. $f(-x) = \ln \frac{-x - 3}{-x + 3} = \ln \frac{x + 3}{x - 3} = \ln \left(\frac{x - 3}{x + 3} \right)^{-1} = -\ln \frac{x - 3}{x + 3} = -f(x)$, $\forall x \in D_f$, deci f este impară.

3. Sistemul de condiții $\begin{cases} 3x - 2 \geq 0 \\ 1 - 2x \geq 0 \end{cases}$ conduce la $x \in \left(-\infty, \frac{1}{2} \right] \cap \left[\frac{2}{3}, \infty \right) = \emptyset$, deci ecuația nu are soluții.

4. Dacă $n \geq 5$, rezultă că $n! + (n + 1)! \geq 5! + 6! = 120 + 720 = 840$, deci orice valoare a lui n care verifică ipoteza aparține mulțimii $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Dacă $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, atunci $n! + (n + 1)! \leq 4! + 5! = 24 + 120 < 840$, deci soluțiile sunt 0, 1, 2, 3 și 4. 5. $3\vec{u} - \vec{v} = 3(2\vec{i} - 3\vec{j}) - (4\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} - 10\vec{j}$.

Atunci $|3\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{4 + 100} = \sqrt{104} = 2\sqrt{26}$. 6. Din $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, rezultă $\cos^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$.

Cum $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2} \right)$, avem $\cos x < 0$, deci $\cos x = -\frac{12}{13}$. Rezultă că $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = -5$.

Subiectul II

1. a) $AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 8 \\ 4 & -9 \end{pmatrix}$. Cum $\det(AB) = -5 \neq 0$, rezultă că AB este inversabilă și

$(AB)^{-1} = \frac{1}{\det(AB)} \cdot (AB)^* = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -9 & -8 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{8}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

b) $A + xB = \begin{pmatrix} 2 - x & -1 + 3x \\ -1 + x & 3 - 2x \end{pmatrix}$, deci $\det(A + xB) = (2x - 3)(x - 2) - (3x - 1)(x - 1) = 2x^2 - 7x + 6 - 3x^2$

$+ 4x - 1 = -x^2 - 3x + 5$. Avem $\det(A + xB) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 5 = 0$ cu soluțiile $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{29}}{2}$.

c) $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + E$, unde $E = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Cum $E^2 = O_2$ și $I_2 \cdot E = E \cdot I_2 = E$, rezultă din formula

binomului lui Newton că $(A + B)^n = (I_2 + E)^n = I_2 + C_n^1 E = I_2 + nE$. Dacă există $n \in \mathbb{N}$ cu $(A + B)^n = I_2$, rezultă că $I_2 + nE = I_2$, deci $nE = O_2$. Rezultă $n = 0$, fals.

2. a) Avem $x * y = 3(x+1)(y+1) - 1$, $x, y \in \mathbb{Z}$. Fie $x, y \in H$, $x = 3k+2$, $y = 3p+2$, $k, p \in \mathbb{Z}$. Rezultă că $x * y = 3(3k+3)(3p+3) - 1 = 27(k+1)(p+1) - 1 = 3s - 1$ unde $s = 9(k+1)(p+1)$. Cum $x * y = 3(s-1) + 2$ și $s-1 \in \mathbb{Z}$, rezultă că $x * y \in H$. b) Dacă legea „ $*$ ” ar admite elementul neutru $e \in \mathbb{Z}$, atunci $1 * e = 1$, deci $6(e+1) - 1 = 1$, de unde $3(e+1) = 1$. Rezultă că 3 divide 1, fals. Deci „ $*$ ” nu are element neutru. c) Avem $(x * x) * x = [3(x+1)^2 - 1] * x = 9(x+1)^3 - 1$. Atunci $(x * x) * x = 8 \Leftrightarrow 9(x+1)^3 - 1 = 8 \Leftrightarrow (x+1)^3 = 1 \Leftrightarrow x = 0$.

Subiectul III

$$1. a) \lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{e^x - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{e^x - 1}}{\sqrt[3]{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{e^x - 1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{e^x - 1}{x} \cdot \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{1}{x^2}} = +\infty. \text{ Rezultă că } g \text{ nu e derivabilă în } 0 \text{ și } g'(0) = \infty.$$

$$c) f(-1) + f(-2) + \dots + f(-n) + n = \frac{1}{e} - 1 + \frac{1}{e^2} - 1 + \dots + \frac{1}{e^n} - 1 + n = \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots + \frac{1}{e^n} = \frac{1}{e} \cdot \frac{1 - \frac{1}{e^n}}{1 - \frac{1}{e}}. \text{ Cum}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^n} = 0, \text{ rezultă că limita cerută este } \frac{1}{e-1}.$$

$$2. a) I_1 = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx = \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 = \sqrt{2} - 1.$$

b) Fie $x \in [0, 1]$. Atunci $1 \leq \sqrt{x^2+1} \leq \sqrt{2}$, deci $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \leq 1$. Cum $\frac{1}{\sqrt{2}} x^n \leq \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \leq x^n$ pentru orice $x \in [0, 1]$, rezultă că $\frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 x^n dx \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx$. Cum $\int_0^1 x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}$, rezultă concluzia.

$$c) I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int_0^1 x^n \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int_0^1 x^n (\sqrt{x^2+1})' dx = x^n \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} \sqrt{x^2+1} dx = \sqrt{2} - n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{\sqrt{x^2+1}} dx = \sqrt{2} - n \int_0^1 \left(\frac{x^{n-1}}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{x^{n-1}}{\sqrt{x^2+1}} \right) dx = \sqrt{2} - n(I_{n+1} + I_{n-1}). \text{ Cum } \lim_{n \rightarrow \infty} I_{n+1} = 0, \text{ rezultă că } \lim_{n \rightarrow \infty} n(I_{n+1} + I_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} - I_{n+1}) = \sqrt{2}.$$

Testul 3

Subiectul I

$$1. a) (1+i)^5 = (1+i)^4 \cdot (1+i) = (2i)^2 (1+i) = -4(1+i) \Rightarrow z = \frac{32}{-4(1+i)} = -\frac{8}{(1+i)} = -4+4i \Rightarrow \operatorname{Re} z = -4.$$

$$2. \text{ Cum } \operatorname{Im} f = \left[-\frac{\Delta}{4a}, \infty\right) = \left[f\left(-\frac{b}{2a}\right), \infty\right) = [f(2), \infty) = [a-4, \infty), \text{ rezultă } a-4=3 \Leftrightarrow a=7.$$

$$3. \sin x - \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{4} \in \left\{(-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$\text{Rezultă că mulțimea soluțiilor ecuației este } \left\{(-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \cap [0, 2\pi) = \left\{\frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}\right\}.$$

4. Deoarece $f(-1) = f(1)$ și $f(-2) = f(2)$, rezultă că numărul cerut este egal cu numărul funcțiilor de la $\{0, 1, 2\}$ în $\{1, 2, 3\}$, deci $3^3 = 27$.

5. Prelungim semidreapta $(DC$ cu $CC' = DC$. Cum $ACCB$ este paralelogram rezultă că $\overline{AB} + \overline{AC} = 2 \overline{AM}$, unde M este mijlocul lui BC . Atunci $|\overline{AB} + \overline{AC}| = |2 \overline{AM}|$, unde M este mijlocul

$$\text{lui } BC. \text{ Atunci } |\overline{AB} + \overline{AC}| = |2 \overline{AM}| = 2AM = 2\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{5}.$$

$$6. S_{ABC} = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{2} = \frac{24\sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3}. \text{ Din teorema cosinusului rezultă că } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot$$

$$AC \cos A = 16 + 36 - 24 = 28, \text{ deci } BC = 2\sqrt{7}. \text{ Obținem } h_A = \frac{2 S_{ABC}}{BC} = \frac{12\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = 6\sqrt{\frac{3}{7}}.$$

Subiectul II

$$1. a) \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^3 & b^3-a^3 & c^3-a^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c^2+ac-b^2-ab) = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c).$$

$$b) \text{ Dacă } \operatorname{rang}(A) = 1 \text{ rezultă că } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & c \end{vmatrix} = 0, \text{ dacă } b-a=c-a=0, \text{ de unde } a=b=c. \text{ Pentru}$$

$$a=b=c, \text{ rezultă } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & a & a \\ a^3 & a^3 & a^3 \end{pmatrix}. \text{ Cum toți minorii de ordinul 2 sunt 0 și } A \neq O_3, \text{ rezultă } \operatorname{rang} A = 1.$$

c) Presupunem că A^{-1} are toate elementele întregi. Cum $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det I_3 = 1$ și $\det A \in \mathbb{Z}$, rezultă că $\det A \in \{-1, 1\}$. Atunci $c-b, c-a, b-a \in \{-1, 1\}$. Obținem $a=b$ sau $a=c$ sau $b=c$, deci $\det(A) = 0$, fals.

2. a) Cum ε este soluția ecuației $x^2 - x + 1 = 0$, rezultă că $\varepsilon^2 - \varepsilon = -1$, deci $(z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon) - \varepsilon = z_1 z_2 + \varepsilon z_1 + \varepsilon z_2 + \varepsilon^2 - \varepsilon = z_1 z_2 + \varepsilon z_1 + \varepsilon z_2 - 1 = z_1 * z_2$.

b) Fie $G = \mathbb{C} \setminus \{-\varepsilon\}$ și $z_1, z_2 \in G$. Cum $z_1 + \varepsilon \neq 0, z_2 + \varepsilon \neq 0$ rezultă că $(z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon) \neq 0$, deci $z_1 * z_2 \in G$. Rezultă că „ $*$ ” este lege bine definită pe G . Vom verifica axiomele grupului:

- Avem $(z_1 * z_2) * z_3 = [(z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon) - \varepsilon] * z_3 = (z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon)(z_3 + \varepsilon) - \varepsilon$ și $z_1 * (z_2 * z_3) = z_1 * [(z_2 + \varepsilon)(z_3 + \varepsilon) - \varepsilon] = (z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon)(z_3 + \varepsilon) - \varepsilon = (z_1 * z_2) * z_3, \forall z_1, z_2, z_3 \in G$, deci legea „ $*$ ” e asociativă.
- $e \in G$ este element neutru $\Leftrightarrow z * e = e * z = z, \forall z \in G \Leftrightarrow (z + \varepsilon)(e + \varepsilon) - \varepsilon = z, \forall z \in G \Leftrightarrow (z + \varepsilon)(e + \varepsilon) = z + \varepsilon, \forall z \in G \Leftrightarrow e + \varepsilon = 1 \Leftrightarrow e = 1 - \varepsilon$. Cum $1 - \varepsilon \in G$, rezultă că $e = 1 - \varepsilon$ este elementul neutru al legii „ $*$ ”.
- Fie $z \in G, z$ este simetrizabil $\Leftrightarrow \exists z' \in G$ astfel încât $z * z' = z' * z = e \Leftrightarrow (z + \varepsilon)(z' + \varepsilon) - \varepsilon = 1 - \varepsilon$

$$\Leftrightarrow (z + \varepsilon)(z' + \varepsilon) = 1. \text{ Cum } z + \varepsilon \neq 0 \text{ rezultă că } z' = -\varepsilon + \frac{1}{z + \varepsilon} \in G, \text{ deoarece } \frac{1}{z + \varepsilon} \neq 0. \text{ Rezultă că}$$

toate elementele G sunt simetrizabile.

$$c) \text{ Avem } H = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + \varepsilon| = 1\}. \text{ Fie } z_1, z_2 \in H. \text{ Atunci } |(z_1 * z_2) + \varepsilon| = |(z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon) - \varepsilon + \varepsilon| = |(z_1 + \varepsilon)(z_2 + \varepsilon)| = 1.$$

+ $\varepsilon)(z_2 + \varepsilon) = |z_1 + \varepsilon| |z_2 + \varepsilon| = 1$, deci $z_1 * z_2 \in H$. Fie $z \in H$. Din punctul b) rezultă că $z' = -\varepsilon + \frac{1}{z + \varepsilon}$,

de unde $|z' + \varepsilon| = \left| \frac{1}{z + \varepsilon} \right| = \frac{1}{|z + \varepsilon|} = 1$. Obținem că $z' \in H$, deci H este subgrup al lui G .

Subiectul III

1. a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x^2}{\sqrt{1-x^2}(\sqrt{1-x^2} + 1)}$, $x \in (-1, 1)$.

Cum $f'(x) \leq 0$, $\forall x \in (-1, 1)$ și $f' = 0 \Leftrightarrow x = 0$, rezultă că f este strict descrescătoare pe $(-1, 1)$. Cum f este continuă în 1 și -1, rezultă că f este strict descrescătoare pe $[-1, 1]$.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$. Aplicăm teorema lui L'Hôpital în cazul $\frac{0}{0}$. Cum

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3\sqrt{1-x^2}(\sqrt{1-x^2} + 1)} = -\frac{1}{6}$ rezultă că limita cerută este $-\frac{1}{6}$.

c) $f''(x) = \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)' = -\left((1-x^2)^{-1/2} \right)' = \frac{1}{2} \cdot (1-x^2)^{-3/2} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$. Rezultă că $f''(x) > 0$

pentru $x \in (-1, 0)$ și $f''(x) < 0$ pentru $x \in (0, 1)$. Cum f este continuă în 0, rezultă că 0 este unicul punct de inflexiune a graficului lui f .

2. a) $A = \int_0^1 f(x) dx$. Cum $\frac{2-x}{2+x} \leq 1$ pentru $x \in [0, 1]$ rezultă că $f(x) \leq 0$ pentru $x \in [0, 1]$,

deci $A = -\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \ln(2+x) dx - \int_0^1 \ln(2-x) dx = \int_0^1 x' \ln(2+x) dx - \int_0^1 x' \ln(2-x) dx =$
 $= x \ln(2+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x dx}{x+2} - x \ln(2-x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{x dx}{x-2} = \ln 3 + \int_0^1 x \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln 3 + \int_0^1 \frac{4x}{x^2-4} dx =$
 $= \ln 3 + 2 \ln \left| x^2 - 4 \right| \Big|_0^1 = \ln 3 + 2 \ln \frac{3}{4} = \ln \frac{27}{16}$.

b) Cum $f(-x) = \ln \frac{2+x}{2-x} = \ln \left(\frac{2-x}{2+x} \right)^{-1} = -\ln \frac{2-x}{2+x} = -f(x)$, $\forall x \in (-2, 2)$, rezultă că f este impară,

deci $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$.

c) Aplicând teorema lui L'Hôpital în cazul $\frac{0}{0}$ obținem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{2-x}{2+x}}{2x} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{-2x}{2+x} \right)}{-\frac{2x}{2+x}} \cdot \frac{-1}{2+x} = -\frac{1}{2}$. Deci limita cerută este $-\frac{1}{2}$.

Testul 4

Subiectul I

1. Cum $2 = \log_2 4 < \log_2 5 < \log_2 8 = 3 < \log_2 9 < \log_2 16 = 4$, rezultă că mulțimea dată are un singur element, $x = 3$. 2. Avem $y \in \text{Im} f \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}$ astfel încât $\frac{x}{x^2+1} = y \Leftrightarrow$ ecuația $yx^2 - x + y = 0$ are

soluții reale $\Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 4y^2 \geq 0 \Leftrightarrow y \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$, deci $\text{Im} f = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$.

3. Avem succesiv: $\sin x \cos x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x \in \left\{ (-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, deci $x \in \left\{ (-1)^k \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. Cum $x \in [0, 2\pi)$, obținem soluțiile $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12} \right\}$.

4. Numărul numerelor naturale de 4 cifre este $9 \cdot 10^3$, iar cel al multiplilor de 5 din această mulțime este $9 \cdot 10^2 \cdot 2$. Probabilitatea este $\frac{1}{5}$. 5. Avem $\overline{BA}(3, 2)$ și $\overline{BC}(-2, 3)$. Cum $\overline{BA} \cdot \overline{BC} = -6 + 6 = 0$,

rezultă $\cos(\widehat{ABC}) = 0$. 6. Fie $AB = 2c$, $AC = 2b$, $BC = 2a$. Atunci $R = a$ și $r = \frac{S}{p} = \frac{2bc}{a+b+c}$. Avem:

$2(R+r) = 2 \left(a + \frac{2bc}{a+b+c} \right) = 2 \frac{a^2 + ab + ac + 2bc}{a+b+c} = 2 \frac{b^2 + c^2 + ab + ac + 2bc}{a+b+c} = 2 \frac{(b+c)^2 + a(b+c)}{a+b+c} =$
 $= 2(b+c) = AB + AC$.

Subiectul II

1. a) $\det(A) = 0$. Cum $A \neq O_2$ rezultă că $\text{rang}(A) = 1$.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = A$. Vom demonstra prin inducție că $A^n = A$, $\forall n \geq 1$. Cum $P(1)$ și $P(2)$ sunt

adevărate, presupunem că $A^n = A$. Atunci $A^{n+1} = A^n \cdot A = A \cdot A = A^2 = A$, deci $P(n)$ este adevărată $\forall n \geq 1$. În concluzie $A^{2012} = A$.

c) Cum $I_2 \cdot (3A) = (3A) \cdot I_2$, folosind binomul lui Newton obținem $(I_2 + 3A)^n =$
 $= \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot I_2^{n-k} \cdot (3A)^k = I_2 + \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot 3^k \cdot A = I_2 + A \left(1 + \sum_{k=1}^n C_n^k 3^k - 1 \right) = I_2 + A[(1+3)^n - 1] =$
 $= I_2 + (4^n - 1)A$.

2. a) Fie (a, b) și $(x, y) \in G$. Atunci $(a, b) * (x, y) = (ax + 2by, ay + bx)$. Cum $\alpha = ax + 2by \in \mathbb{Z}$, $\beta = ay + bx \in \mathbb{Z}$ și $\alpha^2 - 2\beta^2 = (ax + 2by)^2 - 2(ay + bx)^2 = a^2x^2 + 4abxy - 2a^2y^2 - 2b^2x^2 = (a^2 - 2b^2)(x^2 - 2y^2) = 1 \cdot 1 = 1$ rezultă că $(a, b) * (x, y) \in G$. Cum $(1, 0) \in G$ rezultă că $G \neq \emptyset$ și de aici concluzia.

b) Din punctul a) rezultă că „*” este lege pe G . Cum $(a, b) * (1, 0) = (a, b) = (1, 0) * (a, b)$, $\forall (a, b) \in G$, rezultă că „*” are pe G elementul neutru $(1, 0)$. c) Fie $x_1 = (3, 2)$. Cum $9 - 2 \cdot 4 = 1$ rezultă că $x_1 \in G$. Notăm cu $x_2 = x_1 * x_1$, $x_3 = x_2 * x_1$ și inductiv $x_{n+1} = x_n * x_1$. Cum „*” este lege pe G rezultă că $x_n \in G$, $\forall n \geq 1$. Dacă $x_n = (a_n, b_n)$, atunci cum $x_{n+1} = (a_n, b_n) * (3, 2) = (3a_n + 4b_n, 2a_n + 3b_n)$ rezultă că $a_{n+1} = 3a_n + 4b_n$ și $b_{n+1} = 2a_n + 3b_n$. Cum $a_1 = 3$, $b_1 = 2$, rezultă că $a_n, b_n \in \mathbb{N}^*$, $\forall n \geq 1$ și $a_{n+1} > a_n$. Rezultă $x_n \neq x_m \forall n \neq m$, deci mulțimea $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$ este infinită.

Subiectul III

1. a) Fie A punctul de pe graficul lui f , de abscisa 3. Cum $f(3) = 27 + 1 = 28$, rezultă că A are coordonatele $(3, 28)$. Cum $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{3}$ și $f'(3) = 27 + \frac{1}{3} = \frac{82}{3}$, rezultă că ecuația tangentei în A este $y - 28 = \frac{82}{3}(x - 3)$. Deci, ecuația tangentei este $82x - 3y - 162 = 0$.

b) Avem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[k]{f(x)} - \sqrt[k]{f(0)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[k]{x^3 + \frac{x}{3}} - \sqrt[k]{\frac{1}{3}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[k]{\frac{x^3 + \frac{x}{3}}{x^k}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[k]{\frac{x^2 + \frac{1}{3}}{x^{k-1}}} = +\infty$, deoarece $k-1$ este număr par; rezultă că $g'(0) = \infty$, deci g nu e derivabilă în 0.

c) Deoarece $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{3} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, rezultă că f este strict crescătoare. Arătăm prin inducție că

șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător. Avem $x_1 = 1 + \frac{1}{3} > x_0 = 1$. Presupunem că $x_n > x_{n-1}$. Cum f este strict crescătoare, rezultă că $f(x_n) > f(x_{n-1})$, deci $x_{n+1} > x_n$. Dacă $(x_n)_n$ e mărginit, atunci $x_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$. Cum $x_{n+1} = x_n^3 + \frac{x_n}{3}$, rezultă că $l = l^3 + \frac{l}{3} \Leftrightarrow 3l^3 = 2l \Leftrightarrow l \in \left\{-\sqrt{\frac{2}{3}}, 0, \sqrt{\frac{2}{3}}\right\}$. Deoarece $(x_n)_n$ este strict crescător, rezultă că $x_n < l, \forall n \in \mathbb{N}$, deci $x_n < \sqrt{\frac{2}{3}} < 1, \forall n \geq 0$, fals. Deci $(x_n)_n$ este nemărginit și fiind crescător, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

2. a) $I_1 = \int_0^1 x \cdot \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 2x \sqrt{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2+1)^{1/2} \cdot (x^2+1)' dx = \frac{1}{3} (x^2+1)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2}-1)$.

b) Cum $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} \sqrt{x^2+1} - x^n \sqrt{x^2+1}) dx = \int_0^1 x^n \sqrt{x^2+1} (x-1) dx \leq 0$, deoarece $x^n \sqrt{x^2+1} \geq 0$ și $x-1 \leq 0, \forall x \in [0,1]$, rezultă că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător, deci mărginit superior. Cum $x^n \sqrt{x^2+1} \geq 0, (\forall) x \in [0,1]$ rezultă că $I_n \geq 0, \forall n \geq 1$, deci șirul $(I_n)_n$ este mărginit.

c) Cum $0 \leq x^n \sqrt{x^2+1} \leq \sqrt{2} x^n, \forall x \in [0,1], \forall n \in \mathbb{N}^*$, avem $0 \leq I_n \leq \int_0^1 \sqrt{2} x^n dx = \sqrt{2} \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{n+1}$.

Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{n+1} = 0$, din teorema cleștelui rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Testul 5

Subiectul I

1. a) Avem $\frac{z+i}{1+iz} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{a+(b+1)i}{1-b+ai} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{[a+(b+1)i](1-b-ai)}{(1-b)^2+a^2} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (b+1)(1-b) - a^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$, unde $z = a + bi$. Obținem $|z|^2 = 1$, deci $|z| = 1$.

2. $f = f^{-1} \Leftrightarrow (f \circ f)(x) = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f(x+a) = x \Leftrightarrow x+a+a = x, \forall x \in \mathbb{R}$, de unde $a = 0$.

3. Ecuația se scrie $\sin x = 1 - 2 \sin^2 x \Leftrightarrow 2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow (2 \sin x - 1)(\sin x + 1) = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2}$ sau $\sin x = -1$, deci $x \in \left\{(-1)^k \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

4. Numărul numerelor naturale de trei cifre este 900, iar numărul celor cu toate cele trei cifre pare este 100. Deci numărul cerut este 800.

5. $d(P, d_1) = \frac{|-3a+1|}{\sqrt{10}}$, iar $d(P, d_2) = \frac{|a+2|}{\sqrt{10}}$. Atunci $d(P, d_1) = d(P, d_2) \Leftrightarrow |-3a+1| = |a+2| \Leftrightarrow -$

$3a+1 = a+2$ sau $-3a+1 = -a-2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{4}$ sau $a = \frac{3}{2}$. Deci $a \in \left\{-\frac{1}{4}, \frac{3}{2}\right\}$.

6. Avem $\sqrt{3} = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{2} \Leftrightarrow AC = \frac{\sqrt{3}}{\sin A} = 2$, deci triunghiul ABC este echilateral. Rezultă $BC = 2$.

Subiectul II

1. a) Cum $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{C})$ și $\Delta_P = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, rezultă că rangul lui B este 2, $\forall m \in \mathbb{R}$.

b) $AB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2+m & 7 \end{pmatrix}$. Atunci $\det(AB) = 11 + 2m$. Rezultă că $m = -\frac{11}{2}$.

c) Fie $X = (a \ b)$; $X \cdot A = (1 \ 2 \ 8) \Leftrightarrow a + 2b = 1, b = 2, -2a + b = 8 \Leftrightarrow a = -3, b = 2 \Rightarrow X = (-3 \ 2)$.

2. a) Avem $e * x = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow ex + ae + x = x, (\forall) x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e(x+a) = 0, (\forall) x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e = 0$. Deci singurul număr cu proprietatea din enunț este 0.

b) Legea „*” are element neutru $\Leftrightarrow \exists e \in \mathbb{R}$ astfel încât $x * e = e * x = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow xe + ax + e = x$ și $ex + ae + x = x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x(e+a-1) + e = 0$ și $ex + ae = 0 \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e = 0$ și $e+a-1 = 0 \Leftrightarrow a = 1$.

c) Pentru $a = 1$ avem $x * y = xy + x + y = (x+1)(y+1) - 1$. Atunci $(x * x) * (x * x) = 15 \Leftrightarrow ((x+1)^2 - 1) * ((x+1)^2 - 1) = 15 \Leftrightarrow (x+1)^4 - 1 = 15 \Leftrightarrow (x+1)^4 = 16 \Leftrightarrow x+1 = 2$ sau $x+1 = -2$, deci $x = 1$ sau $x = -3$.

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2}$. Aplicând teorema lui l'Hôpital, cazul $\frac{0}{0}$, obținem:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2x \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = 0$, deci f este derivabilă în 0 și $f'(0) = 0$.

b) Pentru $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ avem $f'(x) = \frac{\frac{x}{\cos^2 x} - \tan x}{x^2} = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x} = \frac{2x - \sin 2x}{2x^2 \cos^2 x}$.

Fie $g: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 2x - \sin 2x$. Cum $g'(x) = 2 - 2\cos 2x = 2(1 - \cos 2x) > 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

rezultă că g este strict crescătoare pe $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, deci $g(x) > \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Cum $f'(x) > 0$,

$\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ și $f'(0) = 0$ rezultă că f este strict crescătoare pe $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, deci este injectivă. Deoarece $f(0) = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = \infty$, din continuitatea lui f rezultă că $\text{Im } f = [1, \infty)$, deci f este surjectivă.

c) Cum $\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = \infty$ și f este continuă și inversabilă rezultă $\lim_{x \rightarrow \infty} f^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(n) = \frac{\pi}{2}$,

deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$.

2. a) $I_1 = \int_1^e x \ln x dx = \int_1^e \left(\frac{x^2}{2}\right)' \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \frac{1+e^2}{4}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \int_1^e x \ln^n x (\ln x - 1) dx \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, deoarece $0 \leq \ln x \leq 1, \forall x \in [1, e]$. Rezultă că $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător, deci mărginit superior. Cum $x \ln^n x \geq 0, \forall x \in [1, e]$, obținem $I_n \geq 0, \forall n \geq 1$, deci șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este mărginit.

c) $I_{n+1} = \int_1^e x \ln^{n+1} x dx = \int_1^e \left(\frac{x^2}{2}\right)' \ln^{n+1} x dx = \frac{x^2}{2} \ln^{n+1} x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot (n+1) \ln^n x \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} \int_1^e x \ln^n x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} I_n$, deci $I_n = \frac{e^2}{n+1} - \frac{2}{n+1} I_{n+1}$. Cum șirul $(I_n)_n$ este mărginit și $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Testul 6

Subiectul I

1. Avem $\left[\frac{x+1}{2}\right] = 3 \Leftrightarrow 3 \leq \frac{x+1}{2} < 4 \Leftrightarrow 5 \leq x < 7 \Rightarrow A = [5, 7) \cap \mathbb{Z} = \{5, 6\}$, deci A are două elemente.
2. Fie $y \in [2, \infty)$. Atunci $f(x) = y \Leftrightarrow x^2 - 2x + 3 = y \Leftrightarrow x^2 - 2x + 3 - y = 0$. Cum $\Delta = 4y - 8 \geq 0$, rezultă că $x = 1 \pm \sqrt{y-2}$. Cum $x \in [1, \infty)$ obținem $f^{-1}(y) = 1 + \sqrt{y-2}$. Ca urmare, inversa funcției f este $f^{-1}: [2, \infty) \rightarrow [1, \infty)$, $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$.
3. Ecuația se scrie $\arccos x + \frac{2\pi}{3} = \pi \Leftrightarrow \arccos x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.
4. Numărul submulțimilor lui A este $2^5 = 32$, iar numărul submulțimilor care conțin elementul 1 este egal cu numărul submulțimilor lui $B = \{2, 3, 4, 5\}$, adică $2^4 = 16$. Probabilitatea cerută este $\frac{1}{2}$.
5. Cum $A \in d_1$ rezultă că $2 + 2a = 4$, deci $a = 1$. Din $A \in d_2$ rezultă că $b = 1 - 2 = -1$.
6. $\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x = 4 \Leftrightarrow \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\cos x} = 4 \Leftrightarrow \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x \cos x} = 4 \Leftrightarrow \frac{2 \cos 2x}{\sin 2x} = 4 \Leftrightarrow \operatorname{ctg} 2x = 2 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \frac{1}{2}$.

Subiectul II

1. a) Inversiunile lui σ sunt $(2, 5)$, $(3, 5)$ și $(4, 5)$.
- b) Avem $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ și $\sigma^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = e$. Fie $k, c \in \mathbb{Z}$ și $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ astfel încât $k = 4c + r$. Atunci $\sigma^k = \sigma^{4c+r} = (\sigma^4)^c \cdot \sigma^r = \sigma^r$, deci $A = \{e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\}$. În concluzie, A are 4 elemente.
- c) Presupunem că $\sigma\tau = \tau\sigma$. Atunci $(\sigma\tau)(1) = (\tau\sigma)(1) \Rightarrow \sigma(\tau(1)) = \tau(\sigma(1)) \Rightarrow \sigma(i) = \tau(1) \Rightarrow \sigma(i) = i$, fals pentru ca singurul punct fix al lui τ este 1, iar $i \geq 2$.
2. a) De exemplu, $x = y = -\sqrt[3]{\frac{2012}{2}}$. Atunci $x^3 = y^3 = -1006$ și $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + 2012} = 0 \in \mathbb{N}$.
- b) Din enunț, „*” este lege pe \mathbb{R} . Pentru asociativitate, fie $x, y, z \in \mathbb{R}$ și avem $(x * y) * z = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + 2012} * z = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + z^3 + 4024} = x * (y * z)$.
- Deoarece $x * \sqrt[3]{-2012} = \sqrt[3]{x^3 - 2012 + 2012} = x$ rezultă că $e = \sqrt[3]{-2012}$ este elementul neutru al legii „*”. Fie $x \in \mathbb{R}$; din $x * x' = x' * x = e$ se obține $x' = -\sqrt[3]{4024 + x^3} \in \mathbb{R}$, deci toate elementele lui \mathbb{R} sunt simetrizabile. Ca urmare, $(\mathbb{R}, *)$ este grup.
- c) Fie $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, *)$, $f(x) = \sqrt[3]{x - 2012}$. Cum $f(x) * f(y) = \sqrt[3]{x - 2012} * \sqrt[3]{y - 2012} = \sqrt[3]{x + y - 2012} = f(x + y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$ și f este bijectivă, rezultă că f este izomorfism.

Subiectul III

1. a) Deoarece $f(x) = \begin{cases} -\frac{\ln x}{x}, & x \in (0, 1) \\ \frac{\ln x}{x}, & x \in (1, \infty) \end{cases}$ avem $f'(x) = \begin{cases} \frac{\ln x - 1}{x^2}, & x \in (0, 1) \\ \frac{1 - \ln x}{x^2}, & x \in (1, \infty) \end{cases}$, deci f este derivabilă pe $(0, \infty) \setminus \{1\}$. Cum $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = f(1)$, rezultă că f este continuă în $x_0 = 1$. Aplicăm corolarul lui Lagrange și obținem $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = -1$, deci $f'_s(1) = -1$ și $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$, deci $f'_d(1) = 1$. Rezultă că f nu e

derivabilă în $x_0 = 1$.

b) Punctele de extrem ale lui f sunt 1 și e , așa cum se observă din tabloul de variație al lui f de mai jos:

x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$	---	---	---	---
$f(x)$	$+\infty$	\searrow	0	\nearrow
			$\frac{1}{e}$	\searrow
				0

c) Deoarece $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, $f(1) = 0$, $f(e) = \frac{1}{e}$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, din continuitatea lui f rezultă că ecuația $f(x) = m$ are trei soluții reale $\Leftrightarrow m \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$.

2. a) $A = \int_{-1}^0 |f(x)| dx$. Cum $f(x) = e^x - \frac{1}{e^x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^x} < 0$ pentru $x \in [-1, 0]$, rezultă că $|f(x)| = -f(x)$,

$$\forall x \in [-1, 0], \text{ deci } A = \int_{-1}^0 (e^{-x} - e^x) dx = -(e^{-x} + e^x) \Big|_{-1}^0 = e^{-1} + e - 2.$$

b) Fie F o primitivă a lui f . Atunci $F''(x) = f'(x) = e^x + e^{-x} > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, deci F este funcție convexă.

c) Cu teorema lui L'Hôpital: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x \cdot e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = 1$.

Testul 7

Subiectul I

1. Avem $(1 + \sqrt{2})(2012 + \sqrt{2}) = (1 + \sqrt{2})(\sqrt{2}) = (1 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - [\sqrt{2}]) = (1 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1) = 1 \in \mathbb{N}$.
2. Deoarece $f(1 - x) = f(1 + x)$ și $f(2 - x) = f(2 + x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ rezultă că $f(x + 2) = f(2 - x) = f(1 - (x - 1)) = f(1 + x - 1) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, deci f este periodică, de perioadă 2.
3. Ecuația se scrie $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2}$. Cum $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow 2x \in [0, \pi]$, deci $2x = \frac{\pi}{3}$. Rezultă $x = \frac{\pi}{6}$.
4. Pentru $k \geq 2$ avem $A_k^5 = \frac{5!}{(5-k)!} = 5 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (6-k)$, care este număr par. Cum $A_5^0 = 1$ și $A_5^1 = 5$, probabilitatea cerută este $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
5. Avem $2\overline{AM} - 2\overline{BN} = \overline{AB} + \overline{AC} - (\overline{BA} + \overline{BC}) = 2\overline{AB} + \overline{AC} - \overline{CB} = 2\overline{AB} + \overline{AB} = 3\overline{AB}$.
6. Cum $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, avem $\cos x < 0$. Din $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ rezultă $\cos x = -\sqrt{1 - \sin^2 x} = -\sqrt{1 - \frac{25}{169}} = -\frac{12}{13}$. Atunci $\operatorname{ctg} 2x = \frac{\cos 2x}{\sin 2x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = -\frac{119}{120}$.

Subiectul II

1. a) $\det A(m) = -3m^2 - m + 1$.
- b) $\det A(m) = 0 \Leftrightarrow 3m^2 + m - 1 = 0 \Leftrightarrow m \in \left\{\frac{-1 - \sqrt{13}}{6}, \frac{-1 + \sqrt{13}}{6}\right\}$. Cum $m \in \mathbb{Q}$, rezultă $\det A(m) \neq 0$, deci $A(m)$ este inversabilă, pentru orice $m \in \mathbb{Q}$.
- c) $A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 + B$, unde $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Deoarece $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $B^3 = O_3$,

rezultă că $B^k = O_3$ pentru orice $k \geq 3$. Ținând cont că $I_3 \cdot B = B \cdot I_3$, avem:

$$(A(0))^n = (I_3 + B)^n = I_3 + C_n^1 B + C_n^2 B^2 = I_3 + nB + \frac{n(n-1)}{2} B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2n & -n^2 - 2n \\ 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Observăm că putem scrie $x * y = x^{\frac{1}{\log_3 y}} = x^{\log_3 y} = (9^{\log_3 y})^{\log_3 x} = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 y}$.

a) $x * y = 1 \Leftrightarrow 9^{\log_3 x \cdot \log_3 y} = 1 \Leftrightarrow \log_3 x \cdot \log_3 y = 0 \Leftrightarrow \log_3 x = 0$ sau $\log_3 y = 0 \Leftrightarrow x = 1$ sau $y = 1$.

b) Cum $x * y = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 y} > 0, \forall x, y > 0$, din punctul a) rezultă că $x * y \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ pentru orice $x, y \in (0, \infty) \setminus \{1\}$, deci „*” este lege de compoziție bine definită pe $G = (0, \infty) \setminus \{1\}$. Verificăm în continuare axiomele grupului.

• Asociativitatea: pentru orice $x, y, z \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ avem $(x * y) * z = x * (y * z)$, deoarece:

$$(x * y) * z = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 y} * z = 9^{\log_3 (9^{\log_3 x \cdot \log_3 y}) \cdot \log_3 z} = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 y \cdot \log_3 z}$$

$$\text{și } x * (y * z) = x * 9^{\log_3 y \cdot \log_3 z} = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 (9^{\log_3 y \cdot \log_3 z})} = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 y \cdot \log_3 z}.$$

• Existența elementului neutru: Cum $x * 9 = 9^{\log_3 x \cdot \log_3 9} = x$ și $9 * x = 9^{\log_3 9 \cdot \log_3 x} = x$, pentru orice $x \in (0, \infty) \setminus \{1\}$, rezultă că 9 este element neutru al legii „*“.

• Simetrizabilitatea elementelor: Fie $x \in (0, \infty) \setminus \{1\}$. Cum $x * x' = x' * x = e \Leftrightarrow 9^{\log_3 x \cdot \log_3 x'} = 9 \Leftrightarrow (x')^{\log_3 x} = 9 \Leftrightarrow x' = 9^{\frac{1}{\log_3 x}} = 9^{\log_3 9} \in (0, \infty) \setminus \{1\}$, rezultă că toate elementele din G sunt simetrizabile.

$$c) x * x * x = 3 \Leftrightarrow 9^{\log_3^3 x} = 3 \Leftrightarrow \log_3^3 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \log_3 x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \Leftrightarrow x = 9^{\frac{1}{\sqrt[3]{2}}}.$$

Subiectul III

1. a) $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0, \forall x \in [1, \infty)$. Cum $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$, rezultă că f este strict crescătoare pe $[1, \infty)$.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, deci graficul lui f nu are asimptotă orizontală spre $+\infty$. Cum $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, rezultă că graficul lui f nu are asimptotă oblică spre $+\infty$.

c) Din punctul a) rezultă că $f(x) > f(1) = 0, \forall x \in (1, \infty)$, deci $\frac{1}{2} \ln x > \frac{x-1}{x+1}, \forall x \in (1, \infty)$. Rezultă că

$$\frac{1}{2} \ln \frac{x}{y} > \frac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{x}{y} + 1} = \frac{x-y}{x+y}, \text{ pentru orice } x, y \in (0, \infty), x > y. \text{ Atunci } \frac{1}{2} \ln \frac{k+1}{k} > \frac{1}{2k+1}, \forall k \geq 1, \text{ deci}$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} > \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1}, \text{ de unde } \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{2} \ln \left(\prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} \right) = \frac{1}{2} \ln(n+1).$$

$$2. a) \text{ Aria suprafeței este } \int_0^1 f(x) | dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+e^x} = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x(1+e^x)} dx = \int_1^e \frac{dt}{t(t+1)} = \int_1^e \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt =$$

$$= \ln t \Big|_1^e - \ln(t+1) \Big|_1^e = \ln e - \ln(e+1) + \ln 2 = \ln \frac{2e}{e+1}.$$

$$b) \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 f(x) dx + \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 t^2 f(-t) dt + \int_0^1 x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 (f(-x) + f(x)) dx =$$

$$= \int_0^1 x^2 \left(\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{1}{1+e^x} \right) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$c) \text{ Avem } \int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = \int_0^1 x^{2n} (f(-x) + f(x)) dx = \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{2n+1}. \text{ Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

Testul 8

Subiectul I

1. Ecuația $2z^2 + z + 2 = 0$ are soluțiile z și \bar{z} . Cum $z \cdot \bar{z} = 1$, rezultă că $|z|^2 = 1$, deci $|z| = 1$.

2. Dacă $a \neq 0$, atunci f este funcție de gradul II care nu este funcție monotonă. Pentru $a = 0$, $f(x) = 2x + 3$, deci f este strict crescătoare.

$$3. \text{ Ecuația se scrie } \left(\frac{2}{3} \right)^{2x} - 3 \left(\frac{2}{3} \right)^x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left(\left(\frac{2}{3} \right)^x - 1 \right) \left(\left(\frac{2}{3} \right)^x - 2 \right) = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3} \right)^x = 1 \text{ sau } \left(\frac{2}{3} \right)^x = 2,$$

deci soluțiile sunt $x_1 = 0$ și $x_2 = \log_{2/3} 2$.

4. Numărul funcțiilor strict monotone este $2C_n^2$. Atunci $2C_n^2 = 20 \Leftrightarrow C_n^2 = 10 \Leftrightarrow n(n-1) = 20$, deci $n = 5$.

5. Fie $M(\alpha, \beta)$ piciorul perpendicularei din A pe dreapta $d: x - 2y + 5 = 0$. Cum $m_d \cdot m_{AM} = -1$ rezultă $\frac{\beta-2}{\alpha-1} = -2$, deci $2\alpha + \beta = 4$. Cum $M \in d$ avem $\alpha - 2\beta = -5$, de unde $\alpha = \frac{3}{5}$ și $\beta = \frac{14}{5}$. Dacă A' este

simetricul lui A față de dreapta d , atunci $x_{A'} = 2\alpha - x_A = \frac{1}{5}$ și $y_{A'} = 2\beta - y_A = \frac{18}{5}$, deci $A' \left(\frac{1}{5}, \frac{18}{5} \right)$.

6. Presupunem că triunghiul este dreptunghic în A . Atunci $BC = 2R = 12$ și $AC = 6$. Cum $AB = \sqrt{144 - 36} = 6\sqrt{3}$, rezultă că perimetrul $\triangle ABC$ este $18 + 6\sqrt{3}$.

Subiectul II

1. a) Inversiunile lui σ sunt $(1, 2), (1, 3)$ și $(2, 3)$. Cum $m(\sigma) = 3$, rezultă că σ este permutare impară.

b) $\varepsilon(f(x)) = 1 \Leftrightarrow \varepsilon(\sigma x) = 1 \Leftrightarrow \varepsilon(\sigma) \cdot \varepsilon(x) = 1 \Leftrightarrow \varepsilon(x) = -1$ ceea ce demonstrează echivalența din enunț.

c) Avem $f(x) = f(y) \Rightarrow \sigma x = \sigma y \Rightarrow x = y$, deci f este funcție injectivă. Fie p numărul permutărilor pare din S_4 și q numărul celor impare. Deoarece f este injectivă și duce orice permutare pară în una impară, rezultă că $p \leq q$. Cum f este injectivă și duce orice permutare impară în una pară, rezultă $q \leq p$.

Obținem $p = q = \frac{24}{2} = 12$. Deci oricum înmulțim permutările din S_4 obținem o permutare pară, deci produsul este diferit de σ .

$$2. a) \text{ Notând } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ și } F = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ avem } A(x) = E + xF. \text{ Cum } E^2 = E, F^2 = 2F \text{ și}$$

$EF = FE = F$, avem $A(x) \cdot A(y) = (E + xF)(E + yF) = E + (x + y + 2xy)F = A(2xy + x + y)$, care aparține lui G , deoarece $2xy + x + y = 2 \left(x + \frac{1}{2} \right) \left(y + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \neq -\frac{1}{2}$, pentru orice $x, y \neq -\frac{1}{2}$.

b) Din punctul a) înmulțirea matricelor este lege pe G . Înmulțirea matricelor este asociativă și $A(x) \cdot A(0) = A(0) \cdot A(x) = A(x)$, deci $A(0) \in G$ este element neutru. Fie $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$; atunci $A(x)$ este simetrizabilă dacă și numai dacă există $x' \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ astfel încât $A(x) \cdot A(x') = A(x') \cdot A(x) = A(0) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow A(2xx' + x + x') = A(0) \Leftrightarrow x'(2x+1) = -x \Leftrightarrow x' = -\frac{x}{2x+1} \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$. Deci, $A(x)$ este element

simetrizabil în G și $(A(x))' = A\left(-\frac{x}{2x+1}\right)$.

c) Avem $f(x) \cdot f(y) = A\left(\frac{x-1}{2}\right)A\left(\frac{y-1}{2}\right) = A\left(2\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{y}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\right) = A\left(\frac{xy-1}{2}\right) = f(xy)$, oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}^*$, deci f este morfism.

Injectivitatea: dacă $x, y \in \mathbb{R}^*$ astfel încât $f(x) = f(y) \Rightarrow A\left(\frac{x-1}{2}\right) = A\left(\frac{y-1}{2}\right) \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} \Rightarrow x = y$.

Surjectivitatea: Fie $A \in G$. Atunci există $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ astfel încât $A = A(x)$. Cum $2x+1 \neq 0$ și

$f(2x+1) = A\left(\frac{2x+1-1}{2}\right) = A(x) = A$, deci f este surjectivă. În consecință, f este izomorfism.

Subiectul III

1. a) Cum $x > 0$, avem $f(x) = \ln x - \ln(x+1)$, deci $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)} > 0, \forall x \in (0, \infty)$. Rezultă că f este strict crescătoare.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x - \ln(x+1)}{\frac{1}{x}}$. Aplicăm teorema lui L'Hôpital în cazul $\frac{0}{0}$. Cum

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x(x+1)}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1}, \text{ rezultă că limita cerută este } -1.$$

c) Fie $x > 0$. Din teorema lui Lagrange aplicată funcției $g: [x, x+1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = \ln t$ rezultă că $\exists c \in (x, x+1)$ astfel încât $\ln(x+1) - \ln x = g'(c) = \frac{1}{c} \in \left(\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}\right)$. Atunci $\ln \frac{x}{x+1} \in \left(-\frac{1}{x}, -\frac{1}{x+1}\right)$,

$$\text{deci } -\frac{1}{x} < f(x) < -\frac{1}{x+1}.$$

$$\begin{aligned} 2. a) I_1 &= \int_0^1 x^2 \sin x \, dx = \int_0^1 x^2 (-\cos x)' \, dx = -x^2 \cos x \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 x \cos x \, dx = -\cos 1 + 2 \cdot \int_0^1 x (\sin x)' \, dx = \\ &= -\cos 1 + 2x \sin x \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \sin x \, dx = -\cos 1 + 2 \sin 1 + 2 \cos x \Big|_0^1 = 2 \sin 1 + \cos 1 - 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \text{ Avem } 0 \leq \sin x \leq \sin 1 < \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \forall x \in [0, 1], \text{ deci } 0 \leq \int_0^1 x^{2n} \sin x \, dx \leq \int_0^1 \frac{\sqrt{3}}{2} x^{2n} \, dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \\ = \frac{\sqrt{3}}{4n+2}, \text{ pentru orice } n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

$$c) I_n = \int_0^1 \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)' \sin x \, dx = \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \sin x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \cos x \, dx = \frac{1}{2n+1} \sin 1 - \frac{1}{2n+1} \int_0^1 x^{2n+1} \cos x \, dx.$$

$$\text{Cum } 0 \leq \int_0^1 x^{2n+1} \cos x \, dx \leq \int_0^1 x^{2n+1} \, dx = \frac{1}{2n+2}, \text{ rezultă că } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{2n+1} \cos x \, dx = 0. \text{ Atunci, din}$$

$$n I_n = \frac{n}{2n+1} \sin 1 - \frac{n}{2n+1} \int_0^1 x^{2n+1} \cos x \, dx, \text{ rezultă că } \lim_{n \rightarrow \infty} n I_n = \frac{1}{2} \sin 1.$$

Testul 9

Subiectul I

1. Avem $1 + 3 + 5 + \dots + (2n+1) = \sum_{k=0}^n (2k+1) = 2 \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n 1 = n(n+1) + n+1 = (n+1)^2$. Relația din enunț devine $(n+1)^2 = 625 \Leftrightarrow n+1 = 25 \Leftrightarrow n = 24$.

2. Avem $f(x) = x^3(x^2-2)+3$. Cum $f(0) = f(\sqrt{2}) = 3$, rezultă că f nu este injectivă.

3. Ecuația este echivalentă cu $\frac{1+\cos 2x}{2} + \frac{1+\cos 4x}{2} = 1 \Leftrightarrow \cos 2x + \cos 4x = 0 \Leftrightarrow$

$$\cos 3x \cdot \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos 3x = 0 \text{ sau } \cos x = 0. \text{ Cum } \cos 3x = 0, x \in [0, \pi] \Leftrightarrow 3x \in \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right\}, \text{ iar } \cos x = 0, x \in [0, \pi] \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}, \text{ rezultă că soluțiile sunt } x \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right\}.$$

4. Numărul total de funcții este 5^3 , iar numărul de funcții pentru care $f(1) = f(2)$ este 5^2 . Rezultă că numărul cerut este $5^3 - 5^2 = 100$. 5. Cum \vec{u} și \vec{v} sunt coliniari, rezultă că $2 = \frac{m}{5}$, deci $m = 10$. Atunci

$$|\vec{v}| = \sqrt{4+m^2} = \sqrt{104} = 2\sqrt{26}. \quad 6. \text{ Fie } l \text{ latura triunghiului echilateral. Din teorema sinusului rezultă că } l = 2R \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}. \text{ Deci } S = \frac{l^3}{4R} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

Subiectul II

1. a) Fie $X = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Atunci $2X^2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, de unde $2X^2 + X + I_2 = O_2$, deci $X \in M$.

b) Avem $A \in M \Leftrightarrow 2A^2 + A = -I_2 \Leftrightarrow A(2A + I_2) = -I_2$. Rezultă $\det(A) \cdot \det(2A + I_2) = 1$, deci $\det(A) \neq 0$. În consecință, A este inversabilă.

c) $A \in M \Leftrightarrow A^2 + \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}I_2 = O_2$. Din teorema lui Hamilton-Cayley este suficient să găsim o

infinite de matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cu $a+d = -\frac{1}{2}$ și $ad-bc = \frac{1}{2}$. Alegem, de exemplu

$$a = -\frac{1}{2}, d = 0, b \in \mathbb{R}^* \text{ și } c = -\frac{1}{2b}. \text{ Matricele } \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & b \\ -\frac{1}{2b} & 0 \end{pmatrix}, \text{ cu } b \in \mathbb{R}^*, \text{ aparțin lui } M.$$

2. a) Avem $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = e$, deci ordinul lui σ este 2.

b) Fie $\tau_1, \tau_2 \in H$. Cum $\varepsilon(\tau_1 \tau_2) = \varepsilon(\tau_1) \cdot \varepsilon(\tau_2) = 1$, rezultă că $\tau_1 \tau_2$ este pară, deci $\tau_1 \tau_2 \in H$. Fie $\tau \in H$. Cum $\varepsilon(e) = \varepsilon(\tau \cdot \tau^{-1}) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\tau^{-1}) = \varepsilon(\tau^{-1})$ rezultă că $\varepsilon(\tau^{-1}) = \varepsilon(e) = 1$, deci τ^{-1} este pară, de unde $\tau^{-1} \in H$. Deci H este subgrup al grupului S_4 .

c) Fie $f: S_4 \rightarrow S_4$ un morfism de grupuri. Dacă $f(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, atunci $e = f(e) = f(\sigma^2) =$

$$= f^2(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \text{ fals. Deci } f(\sigma) \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x} \cdot x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 \cdot \ln e = 1$, deci dreapta $y = 1$ este asimptotă orizontală spre $+\infty$.

b) $f'(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}$, $x \in (0, \infty)$. Cum $f''(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2(x+1)} > 0$, $\forall x \in (0, \infty)$, rezultă că f' e strict crescătoare. Dar $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, deci $f'(x) < 0$, $\forall x \in (0, \infty)$, adică f este strict descrescătoare.

c) Avem $\frac{f(k)}{k+1} = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$, deci $\sum_{k=1}^n \frac{f(k)}{k+1} = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = \ln(n+1)$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} = 0$. Cu teorema lui L'Hôpital, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} = 0$, de unde rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n} = 0$. Ca urmare, limita cerută este 1.

2. a) $\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x 2^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 2^t dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 2^t dt = \frac{1}{2} \left[\frac{2^t}{\ln 2} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{4 \ln 2}$.

b) Avem $I_{n+1} - I_n = \int_1^{n+1} f(x) dx - \int_1^n f(x) dx = \int_n^{n+1} f(x) dx$. Cum $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, rezultă că

$I_{n+1} - I_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, deci șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător. Deoarece $0 \leq I_n = \int_1^n 2^{-x^2} dx \leq \int_1^n 2^{-x} dx = -\frac{2^{-x}}{\ln 2} \Big|_1^n = \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^n} \right) < \frac{1}{2 \ln 2}$, rezultă că șirul $(I_n)_n$ este mărginit.

c) Din teorema de medie, există $c_n \in [n, n+1]$ astfel încât $\int_n^{n+1} f(x) dx = f(c_n)(n+1-n) = f(c_n)$. Cum

$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-c_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-x^2} = 0$, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} f(x) dx = 0$.

Testul 10

Subiectul I

1. Cum $3^2 > 2^3$ rezultă că $3 > 2^{1.5} > 2^{\sqrt{2}}$. Rezultă că $\log_2 3 > \sqrt{2}$, deci $\log_2^2 3 > 2$. Atunci $\log_2 3 > \frac{2}{\log_2 3} = 2 \log_3 2 = \log_3 4$. 2. $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^4 - 2x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow (x^2 + 1)(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$,

rezultă că graficul lui f taie axa Ox în două puncte. 3. Pentru $x > 0$, $x \neq 1$ ecuația este echivalentă cu $x^2 - 3x + 2 = 0$, ecuație care are soluțiile $x_1 = 1$ și $x_2 = 2$. Cum $x \neq 1$, ecuația are soluția unică $x = 2$.

4. Numărul este $C_{20}^3 \cdot C_{10}^2$. 5. Fie $M(\alpha, \beta)$ piciorul perpendicularei din A pe d . Cum $m_d \cdot m_{AM} = -1$, rezultă că $\frac{\beta-2}{\alpha-1} = -1$, deci $\alpha + \beta = 3$. Deoarece $M(\alpha, \beta) \in d$, avem $\alpha - \beta = 3$, deci $\alpha = 3$ și $\beta = 0$.

6. Avem $B + C = \pi - A > \frac{\pi}{2}$, deci $\frac{\pi}{2} > B > \frac{\pi}{2} - C$. Cum funcția \sin este strict crescătoare pe $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ rezultă că $\sin B > \sin\left(\frac{\pi}{2} - C\right) = \cos C$.

Subiectul II

1. a) Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Cum $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A = A'$, rezultă $A \in M$.

b) $A \in M \Rightarrow \det(A^2) = \det(A') \Rightarrow \det^2(A) = \det(A)$. Cum $\det(A) \neq 0$, rezultă că $\det(A) = 1$.

c) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M$ cu $\det(A) = 0$. Cum $A^2 = (a+d)A = A'$, rezultă că $(a+d)a = a$ și $(a+d)d = d$,

deci $(a+d)^2 = a+d$. Dacă $a+d=0$, atunci $A' = 0$, deci $a=b=0$ și $a^2+b^2-a=0$. Dacă $a+d=1$, atunci $A=A'$. Rezultă $b=c$ și $d=1-a$. Cum $ad-bc=0$ obținem $a(1-a)-b^2=0$, deci $a^2+b^2-a=0$.

2. a) $(f_a \circ f_b)(x) = af_b(x) + 3(1-a) = a(bx+3(1-b)) + 3(1-a) = abx + 3(1-ab) = f_{ab}(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Cum $f_a \circ f_b$ și f_{ab} au același domeniu de definiție și același domeniu de valori, rezultă $f_a \circ f_b = f_{ab}$.

b) Cum $a \neq 0$, $b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$, din punctul a), deci compunerea funcțiilor este lege bine definită pe G . Compunerea funcțiilor este asociativă, are element neutru, deoarece $f_a \circ f_1 = f_1 \circ f_a = f_a$, $\forall a \in \mathbb{R}^*$, și, pentru orice $a \in \mathbb{R}^*$, $f_a \circ f_{\frac{1}{a}} = f_{\frac{1}{a}} \circ f_a = f_1$. Ca urmare, (G, \circ) este grup.

c) $f_a \circ f_a \circ f_a = f_{a^3}$. Atunci $f_{a^3}(x) = 8x - 21 \Leftrightarrow a^3x + 3(1-a^3) = 8x - 21$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, de unde rezultă că $a^3 = 8$ și $3(1-a^3) = -21$, condiții îndeplinite pentru $a = 2$.

Subiectul III

1. a) Cum f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$, studiem limitele laterale ale funcției f în punctele 1 și 2. Avem $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ și, respectiv, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$, deci dreptele de ecuații $x=1$ și $x=2$ sunt asimptotele verticale ale graficului funcției f .

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x))^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2}{x^2 - 3x + 2} \right)^{\frac{1}{x}} \cdot \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0^+} y^y = \lim_{y \rightarrow 0^+} e^{y \ln y} = e^{\lim_{y \rightarrow 0^+} y \ln y} = 1$, deoarece

$\lim_{y \rightarrow 0^+} y \ln y = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\ln y}{y^{-1}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{-y^2} = \lim_{y \rightarrow 0^+} (-y) = 0$.

c) $f(x) = \frac{2x}{(x-1)(x-2)} = \frac{4}{x-2} - \frac{2}{x-1}$. Rezultă că $f''(x) = 4 \left(\frac{2}{(x-2)^3} - \frac{1}{(x-1)^3} \right)$. Avem $f''(x) = 0$

$\Leftrightarrow \frac{2}{(x-2)^3} = \frac{1}{(x-1)^3} \Leftrightarrow \left(\frac{x-2}{x-1} \right)^3 = 2 \Leftrightarrow \frac{x-2}{x-1} = \sqrt[3]{2} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt[3]{2}-2}{\sqrt[3]{2}-1}$.

2. a) $f(1) = \int_0^1 \frac{t}{t^2+2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(t^2+2)'}{t^2+2} dt = \frac{1}{2} \ln(t^2+2) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$.

b) $f(x+2) + 2f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x+2} + 2t^x}{t^2+2} dt = \int_0^1 t^x dt = \frac{t^{x+1}}{x+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{x+1}$.

c) Cum $f(x+1) - f(x) = \int_0^1 \frac{t^x(t-1)}{t^2+2} dt \leq 0$, rezultă $f(x+1) \leq f(x)$, $\forall x > 0$. Folosind acest lucru, avem:

$3f(x+2) \leq f(x+2) + 2f(x) \leq 3f(x)$, de unde, conform b), rezultă $3f(x+2) \leq \frac{1}{x+1} \leq 3f(x)$, $\forall x > 0$.

Obținem $\frac{1}{3(x+1)} \leq f(x) \leq \frac{1}{3(x-1)}$, de unde $\frac{x}{3(x+1)} \leq xf(x) \leq \frac{x}{3(x-1)}$, pentru orice $x > 1$. Cum

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3(x+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3(x-1)} = \frac{1}{3}$, rezultă că $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = \frac{1}{3}$.

Testul 11

Subiectul I

1. Fie $z = a + ib$. Atunci $a^2 + b^2 = (a-1)^2 + b^2 \Leftrightarrow 2a-1=0 \Leftrightarrow a=\frac{1}{2}$. 2. $\operatorname{Im} f = \left[-\frac{\Delta}{4a}, \infty\right) = [2, \infty)$,

$\operatorname{Im} g = \left[-\infty, -\frac{\Delta}{4a}\right] = (-\infty, a+4]$. Atunci $|\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Im} g| = 1 \Leftrightarrow a+4=2 \Leftrightarrow a=-2$.

3. Ecuația se scrie $8^x + 1 = 9^x \Rightarrow \left(\frac{8}{9}\right)^x + \left(\frac{1}{9}\right)^x = 1$. Cum funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \left(\frac{8}{9}\right)^x + \left(\frac{1}{9}\right)^x$ este strict descrescătoare, deci injectivă și $f(1) = 1$, rezultă că ecuația are soluția unică $x = 1$.

4. Există A_4^2 submulțimi ordonate cu trei elemente care conțin elementul 1 pe prima poziție. Analog pentru submulțimile care conțin elementul 1 pe pozițiile 2 și 3. Numărul cerut este $3A_4^2 = 36$.

5. Fie B' simetricul lui B față de A . Atunci: $\frac{x_{B'} + x_B}{2} = x_A$ și $\frac{y_{B'} + y_B}{2} = y_A$. Rezultă că $x_{B'} = 2x_A - x_B = -2$ și $y_{B'} = 2y_A - y_B = 2$. 6. Avem $\frac{BD}{\sin \frac{A}{2}} = 2R_1 = 2R_2 = \frac{CD}{\sin \frac{A}{2}}$, de unde rezultă că

$BD = CD$. Din teorema bisectoarei avem că $\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC}$, deci $AB = AC$.

Subiectul II

1. a) Avem $A^2 - I_3 = 16 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Cum $A^2 - I_3 \neq O_3$ și toți minorii de ordinul doi sunt nuli, rezultă că rangul cerut este 1.

b) $A^2 = aA + bI_3 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 17 & 16 & 16 \\ 16 & 17 & 16 \\ 16 & 16 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+b & 2a & 2a \\ 2a & 3a+b & 2a \\ 2a & 2a & 3a+b \end{pmatrix}$, de unde $2a = 16$ și $3a + b = 17$, ceea ce conduce la $a = 8$ și $b = -7$.

c) $A^2 = 8A - 7I_3 \Leftrightarrow A^2 - 8A = -7I_3 \Leftrightarrow A(A - 8I_3) = -7I_3 \Leftrightarrow A^{-1} = -\frac{1}{7}A + \frac{8}{7}I_3$.

1. a) $\sqrt{\frac{1}{4}(x^2-1)(y^2-1)+1} = \frac{1}{2}\sqrt{(x^2-1)(y^2-1)+4} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2y^2-x^2-y^2+5} = x*y, \forall x, y \in (1, \infty)$;

b) Din ipoteză „*” este lege de compoziție pe $(1, \infty)$. Verificăm axiomele grupului:

• Asociativitatea: pentru orice $x, y, z \in (1, \infty)$, avem: $(x*y)*z = \left(\sqrt{\frac{1}{4}(x^2-1)(y^2-1)+1}\right)*z = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}(x^2-1)(y^2-1)(z^2-1)+1} = \sqrt{\frac{(x^2-1)(y^2-1)(z^2-1)}{16}+1}$, și $x*(y*z) = x*\sqrt{\frac{1}{4}(y^2-1)(z^2-1)+1} = \sqrt{\frac{1}{4}(x^2-1) \cdot \frac{1}{4}(y^2-1)(z^2-1)+1} = \sqrt{\frac{(x^2-1)(y^2-1)(z^2-1)}{16}+1}$, deci legea „*” este asociativă.

• Element neutru: $e \in (1, \infty)$ este element neutru dacă și numai dacă $x*e = e*x = x, \forall x \in (1, \infty) \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{4}(x^2-1)(e^2-1)+1} = x \Leftrightarrow \frac{1}{4}(x^2-1)(e^2-1) = x^2-1, \forall x \in (1, \infty) \Leftrightarrow e^2 = 5 \Leftrightarrow e = \sqrt{5} \in (1, \infty)$.

• Simetrizabilitatea elementelor. Fie $x \in (1, \infty)$; x este simetrizabil dacă există $x' \in (1, \infty)$ astfel încât

$$x*x' = x'*x = e \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{4}(x^2-1)(x'^2-1)+1} = \sqrt{5} \Leftrightarrow \frac{1}{4}(x^2-1)(x'^2-1) = 4 \Leftrightarrow x'^2 = 1 + \frac{16}{x^2-1}, \text{ de unde}$$

$x' = \sqrt{1 + \frac{16}{x^2-1}} > 1$, deci toate elementele din G sunt simetrizabile. Rezultă că $(G, *)$ este grup.

c) $f(x)*f(y) = \sqrt{\frac{1}{2}(f^2(x)-1)(f^2(y)-1)+1} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2x \cdot 2y - 1} = \sqrt{2xy-1} = f(x*y), \forall x, y \in (0, \infty)$, deci f este morfism de grupuri. Deoarece f este strict crescătoare, rezultă că f este injectivă. Cum f este continuă, crescătoare, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, rezultă că $\operatorname{Im} f = (1, \infty)$, deci f este surjectivă.

Subiectul III

1. a) Punctul de pe grafic de abscisă $x_0 = 1$ are coordonatele $A(1, f(1))$, deci $(1, e-2)$. Cum $f'(x) = 2xe^x - 2x$, rezultă că panta tangentei este $f'(1) = 2e-2$. Ecuația tangentei este $y - e + 2 = 2(e-1)(x-1)$.

b) Inegalitatea $2f(x) \geq x^4$ este echivalentă cu $e^{x^2} - 1 - x^2 \geq \frac{x^4}{2} \Leftrightarrow e^t - 1 - t - \frac{t^2}{2} \geq 0, \forall t \in [0, \infty)$. Fie $g:$

$[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(t) = e^t - 1 - t - \frac{t^2}{2}$. Cum $g'(t) = e^t - 1 - t$ și $g''(t) = e^t - 1 \geq 0, \forall t \in [0, \infty)$ rezultă că g' este strict crescătoare, deci $g'(t) \geq g'(0) = 0, \forall t \in [0, \infty)$. Rezultă că g este crescătoare, deci $g(t) \geq g(0) = 0, \forall t \in [0, \infty)$.

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{f(x)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[4]{\frac{f(x)}{x^4}}$. Cum, din teorema lui L'Hôpital cazul $\frac{0}{0}$ avem

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x^2}{x^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1 - y}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{2y} = \frac{1}{2}$, rezultă că $g'_d(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$,

iar $g'_s(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\sqrt[4]{\frac{f(x)}{x^4}}\right) = -\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$, deci g nu este derivabilă în $x_0 = 0$.

2. a) $I_1 = \int_0^1 (x^2 + 2x + 2) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x^2 + 2x\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + 3 = \frac{10}{3}$.

b) Avem $I_n = \int_0^1 (x^2 + 2x + 2)^n dx \geq \int_0^1 2^n dx = 2^n$, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \infty$.

c) $I_n = \int_0^1 (x+1)'(x^2 + 2x + 2)^n dx = (x+1)(x^2 + 2x + 2)^n \Big|_0^1 - 2n \int_0^1 (x+1)^2 (x^2 + 2x + 2)^{n-1} dx = 2 \cdot 5^n - 2^n - 2n \int_0^1 (x^2 + 2x + 2 - 1)(x^2 + 2x + 2)^{n-1} dx = 2 \cdot 5^n - 2^n - 2n I_n + 2n I_{n-1}$.

Rezultă că $(2n+1)I_n - 2I_{n-1} = 2 \cdot 5^n - 2^n$. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = 0$, rezultă că limita cerută este 2.

Testul 12

Subiectul I

1. Numărul este $\frac{\sqrt{3}-1}{2} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{2} + \frac{3-\sqrt{7}}{2} = 1 \in \mathbb{N}$. 2. Cum $f(-0) = -f(0)$, rezultă că $f(0) = 0$, deci produsul este 0. 3. Notăm $\sqrt[3]{1-x} = t$. Ecuația devine $t = -t^5 \Leftrightarrow t(t^4 + 1) = 0 \Leftrightarrow t = 0$. Deci $x = 1$ este unica soluție a ecuației. 4. Dacă mulțimea are n elemente, atunci $2^{n-1} = 16$, deci $n = 5$.

5. Fie h înălțimea din A . Cum panta dreptei BC este 1 rezultă că panta lui h este -1 . Ecuația lui h este $y = x + 1$. 6. Avem $\cos^2 10^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ = \frac{1 + \cos 20^\circ}{2} + \frac{1 + \cos 100^\circ}{2} + \frac{1 + \cos 140^\circ}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(2 \cos 60^\circ \cos 40^\circ + \cos 140^\circ) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 40^\circ + \cos 140^\circ) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 40^\circ - \cos 40^\circ) = \frac{3}{2}$.

Subiectul II

1. a) $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = O_2$. Rezultă $A^4 = O_2$, deci $A \in M$.

b) Fie $X \in M$. Atunci $O = \det(O_2) = \det(X^4) = \det^4(X)$, deci $\det(X) = 0$. Din teorema lui Hamilton Cayley, rezultă că $X^2 = \text{tr}(X) \cdot X$, deci $X^4 = \text{tr}(X) \cdot X^3 = \text{tr}^2(X) \cdot X^2 = \text{tr}^3(X) \cdot X$. Atunci $\text{tr}^3(X) \cdot X = O_2$, deci $\text{tr}(\text{tr}^3(X) \cdot X) = \text{tr}(O_2)$, de unde $\text{tr}^4(X) = 0$. Rezultă că $\text{tr}(X) = 0$, deci $X^2 = O_2$.

c) Fie $Y \in M_2(\mathbb{C})$ o soluție a ecuației $Y^2 = A$; atunci $Y^4 = A^2 = O_2$. Rezultă că $Y \in M \Rightarrow Y^2 = O_2 \Rightarrow A = O_2$, fals. Deci ecuația nu are soluții.

2. a) $u \in (2, \infty)$ este element neutru al legii „ $*$ ” $\Leftrightarrow x * u = u * x = x, \forall x \in (2, \infty) \Leftrightarrow (x-2)^{\ln(u-2)} + 2 = x, \forall x \in (2, \infty) \Leftrightarrow (x-2)^{\ln(u-2)} = x-2, \forall x \in (2, \infty) \Leftrightarrow \ln(u-2) = 1 \Leftrightarrow u-2 = e \Leftrightarrow u = e+2 \in (2, \infty)$. Cum $(e+2) * x = e^{\ln(x-2)} + 2 = x-2+2 = x, \forall x \in (2, \infty)$, rezultă că $u = e+2$ este element neutru.

b) $x \in (2, \infty)$ este simetrizabil $\Leftrightarrow \exists x' \in (2, \infty)$ astfel încât $x * x' = x' * x = u \Leftrightarrow (x'-2)^{\ln(x-2)} = e+2$.

Dacă $x \neq 3$, atunci $\ln(x-2) \neq 0$ și $x' = 2 + (e+2)^{\frac{1}{\ln(x-2)}} \in (2, \infty)$, deci toate elementele diferite de 3 sunt simetrizabile. Dacă $x = 3$, atunci $(x'-2)^{\ln(3-2)} = 1 \neq e+2$, deci $x = 3$ nu este simetrizabil.

c) Avem $x * x * x = ((x-2)^{\ln(x-2)} + 2) * x = (x-2)^{\ln^2(x-2)} + 2$ și $x * x * x * x = (x-2)^{\ln^3(x-2)} + 2$. Ecuația se scrie $(x-2)^{\ln^3(x-2)} = 3 \Leftrightarrow \ln^4(x-2) = \ln 3 \Leftrightarrow \ln(x-2) = \pm \sqrt[4]{\ln 3} \Leftrightarrow x-2 = e^{\pm \sqrt[4]{\ln 3}}$. Obținem $x_1 = 2 + e^{\sqrt[4]{\ln 3}} > 2$ și $x_2 = 2 + e^{-\sqrt[4]{\ln 3}} > 2$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = e^x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ deci f este strict crescătoare, și, în consecință, este injectivă. Cum f este continuă, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, rezultă că $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} - 1 \right) = 0 \in \mathbb{R}$ și $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} - 1 \right) = 0 \in \mathbb{R}$, deci dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $\pm\infty$. Apoi, $\lim_{x \downarrow 0} g(x) = \lim_{x \downarrow 0} \left(e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} - 1 \right) = \infty$ și $\lim_{x \uparrow 0} g(x) = -\infty$, deci dreapta $x = 0$ este asimptotă verticală. Cum g este continuă pe \mathbb{R}^* , nu există alte asimptote verticale.

c) Avem $x_2 = f(-1) = \frac{1}{e} - 2 < -1$, deci $x_2 < x_1$. Demonstrăm prin inducție că șirul $(x_n)_n$ este descrescător. Presupunem $x_n < x_{n-1}$. Cum f este crescătoare, rezultă că $f(x_n) \leq f(x_{n-1})$, deci $x_{n+1} \leq x_n$. Presupunând că $(x_n)_{n \geq 1}$ ar fi mărginit, atunci șirul ar fi convergent; notând $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, rezultă $f(l) = l$, de unde $e^l + l - 1 = l \Leftrightarrow e^l = 1 \Leftrightarrow l = 0$. Cum $(x_n)_{n \geq 1}$ este descrescător, rezultă că $x_n \geq l, \forall n \in \mathbb{N}^*$, deci

$x_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, fals. Deci șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este nemărginit și, fiind descrescător, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

2. a) Aria $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(x)| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} - \int_1^0 \frac{dt}{1+t^2} = 2 \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctg t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

b) Cu schimbarea de variabilă $y = 2\pi - x$ avem: $I = \int_0^{2\pi} xf(x) dx = - \int_{2\pi}^0 (2\pi - y) f(2\pi - y) dy =$

$2\pi \int_0^{2\pi} (2\pi - y) \frac{\cos(2\pi - y)}{1 + \sin^2(2\pi - y)} dy = \int_0^{2\pi} (2\pi - y) \frac{\cos y}{1 + \sin^2 y} dy = \int_0^{2\pi} (2\pi - y) f(y) dy = \int_0^{2\pi} 2\pi f(y) dy - I,$

de unde se obține $2I = 2\pi \int_0^{2\pi} f(y) dy = 2\pi \int_0^{2\pi} \frac{\cos y}{1 + \sin^2 y} dy = 2\pi \arctg(\sin y) \Big|_0^{2\pi} = 0$, deci $I = 0$.

c) Din teorema lui L'Hôpital, cazul $\frac{0}{0}$ avem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x (f(t) - 1) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2} =$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 - \sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - 2 \sin x \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin x}{2x} - \frac{\sin x}{x} \cos x \right) = -\frac{3}{2}$.

Testul 13

Subiectul I

1. Cum pentru $k \in \mathbb{N}^*, \sqrt{k} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow k$ este pătrat perfect, rezultă că numărul cerut este egal cu numărul pătratelor perfecte cuprinse între 1 și 2012. Cum $44^2 = 1936 < 2012 < 2025 = 45^2$, rezultă că există 44 pătrate perfecte, deci mulțimea are 44 de elemente numere raționale. 2. $f(0) = 2$ implică $f'(2) = 0$, iar $f(-1) = 0$ implică $f'(0) = -1$. Ca urmare, $(f^{-1} \circ f^{-1})(2) = f^{-1}(f^{-1}(2)) = f^{-1}(0) = -1$.

3. Avem $\sin x = -\sqrt{3} \cos x \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \text{tg } x = -\sqrt{3}, x \in [0, 2\pi) \Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$.

4. Există 4! permutări care au pe prima poziție numărul 2 și 4! permutări care au pe prima poziție numărul 4. Există deci $2 \cdot 4! = 48$ permutări cu proprietatea din enunț. 5. Prin calcul direct, sau folosind relația $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$, avem: $C_3^3 + C_4^3 + C_5^3 + C_6^3 = C_4^4 + C_5^4 - C_4^4 + C_6^4 - C_5^4 + C_7^4 - C_6^4 = C_7^4$.

6. Avem $2 \sin B \cos C = \sin A = \sin(\pi - (B + C)) = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$. Obținem $\sin B \cos C - \cos B \sin C = 0$, deci $\sin(B - C) = 0$. Cum $B - C \in (-\pi, \pi)$, rezultă $B - C = 0$, deci $B = C$ și, în consecință, triunghiul ABC este isoscel.

Subiectul II

1. a) Fie $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix} \in M, X \neq O_2$. Atunci $\det(X) = a^2 - 2b^2$. Dacă $\det(X) = 0$, atunci $2b^2 = a^2$. Pentru

$b = 0$ obținem $a = 0$, deci $X = O_2$ fals, iar pentru $b \neq 0$ rezultă că $\frac{a^2}{b^2} = 2$, deci $\left| \frac{a}{b} \right| = \sqrt{2}$, fals pentru

că $\sqrt{2}$ este număr irațional. Obținem $\det(X) \neq 0$, deci X este inversabilă.

b) Fie $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Atunci $AX = XA \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3a+2c & 3b+2d \\ 4a+3c & 4b+3d \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 3a+4b & 2a+3b \\ 3c+4d & 2c+3d \end{pmatrix} \Leftrightarrow 3a+2c = 3a+4b$ și $3b+2d = 2a+3b \Leftrightarrow c = 2b$ și $a = d \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix}$ cu $a, b \in \mathbb{Q}$, deci $X \in M$. c) Fie X o soluție. Cum $AX = X^2 \cdot X = X^3 = X \cdot X^2 = XA \Rightarrow X \in M \Rightarrow X = \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix}$. Atunci $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 + 2b^2 & 2ab \\ 4ab & a^2 + 2b^2 \end{pmatrix}$. Cum $X^2 = A \Rightarrow a^2 + 2b^2 = 3$ și $ab = 1 \Rightarrow a^2 - 3ab + 2b^2 = 0 \Rightarrow (a-b)(a-2b) = 0 \Rightarrow a = b$ sau $a = 2b$. Dacă $a = b$, atunci $a^2 = 1$, deci $a = b = 1$ sau $a = b = -1$. Dacă $a = 2b$, atunci $2b^2 = 1$, deci $b = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$.

Obținem matricele $X_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ și $X_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Cum $X_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = A$ și $X_2^2 = (-X_1)^2 = X_1^2 = A$ rezultă că soluțiile ecuației sunt X_1 și X_2 .

2. a) Avem $(f_k \circ f_p)(x) = (f_k(f_p(x))) = 3^k \cdot f_p(x) + 2 \cdot 3^k - 2 = 3^k(3^p x + 2 \cdot 3^p - 2) + 2 \cdot 3^k - 2 = 3^{k+p} x + 2 \cdot 3^{k+p} - 2 = f_{k+p}(x)$. Cum $f_k \circ f_p$ și f_{k+p} au același codomeniu și același domeniu de definiție, rezultă că $f_k \circ f_p = f_{k+p}$.

b) Cum $k + p \in \mathbb{Z}$, $\forall k, p \in \mathbb{Z}$, din punctul a) rezultă că operația de compunere a funcțiilor este lege pe G . Cum compunerea funcțiilor este asociativă, $f_k \circ f_0 = f_0 \circ f_k = f_k$, $\forall k \in \mathbb{Z}$ și $f_k \circ f_{-k} = f_{-k} \circ f_k = f_0$, $\forall k \in \mathbb{Z}$ rezultă că operația de compunere are element neutru, $f_0 \in G$ și orice funcție $f_k \in G$ este inversabilă cu $f_k^{-1} = f_{-k} \in G$. Rezultă că (G, \circ) este grup.

c) Fie $f, g \in H$. Atunci $f = f_{3k}$ și $g = f_{3p}$ cu $k, p \in \mathbb{Z}$. Cum $f \circ g^{-1} = f_{3k} \circ f_{3p}^{-1} = f_{3k} \circ f_{-3p} = f_{3k-3p} = f_{3(k-p)} \in H$, rezultă că H este subgrup al lui G .

Subiectul III

1. a) $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+(1+x)^2} = \frac{(x+1)^2 - x^2}{(1+x^2)(2+2x+x^2)} = \frac{2x+1}{(1+x^2)(2+2x+x^2)}$. Cum $f'(x) < 0$ pentru $x \in (-\infty, -\frac{1}{2})$, $f'(x) > 0$, $\forall x \in (-\frac{1}{2}, \infty)$ și $f'(-\frac{1}{2}) = 0$, din monotonia lui f rezultă că $x_0 = -\frac{1}{2}$ este unicul punct de extrem (minim) a lui f .

b) Avem $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$ și $f(-\frac{1}{2}) = -2 \arctg \frac{1}{2}$. Din tabelul de variație a lui f rezultă:

- pentru $m \in (-\infty, -2 \arctg \frac{1}{2}) \cup [0, \infty)$ ecuația nu are soluții;

- pentru $m = -2 \arctg \frac{1}{2}$ ecuația are o soluție;

- pentru $m \in (-2 \arctg \frac{1}{2}, 0)$ ecuația are două soluții.

c) Fie $x \in [0, \infty)$. Aplicând teorema lui Lagrange funcției $g(t) = \arctg t$ pe intervalul $[x, x+1]$, există $c \in (x, x+1)$ astfel încât $g(x+1) - g(x) = g'(c) = \frac{1}{c^2+1} < \frac{1}{x^2+1} \Rightarrow -f(x) < \frac{1}{x^2+1} \Rightarrow f(x) > -\frac{1}{x^2+1}$.

2. a) $I_1 = \int_0^1 x \sin x \, dx = \int_0^1 x(-\cos x)' \, dx = -x \cos x \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos x \, dx = -\cos 1 + \sin x \Big|_0^1 = \sin 1 - \cos 1$.

b) Fie $n \geq 3$. Avem $I_n = \int_0^1 x^n \sin x \, dx = \int_0^1 x^n (-\cos x)' \, dx = -x^n \cos x \Big|_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} \cos x \, dx = -\cos 1 + n \int_0^1 x^{n-1} (\sin x)' \, dx = -\cos 1 + n x^{n-1} \sin x \Big|_0^1 - n(n-1) \int_0^1 x^{n-2} \sin x \, dx = -\cos 1 + n \sin 1 - n(n-1) I_{n-2}$, deci $I_n + n(n-1) I_{n-2} = n \sin 1 - \cos 1$.
c) Din punctul b) rezultă că $I_{n+2} + (n+2)(n+1) I_n = (n+2) \cdot \sin 1 - \cos 1$, de unde $n I_n = \frac{n}{n+1} \sin 1 - \frac{n}{(n+2)(n+1)} \cos 1 - \frac{n}{(n+2)(n+1)} I_{n+2}$. Deoarece $0 \leq I_n = \int_0^1 x^n \sin x \, dx \leq 1$ rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+2)(n+1)} I_{n+2} = 0$, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} n I_n = \sin 1$.

Testul 14

Subiectul I

1. Avem $z = \frac{(1+i)(1+2i)}{5} + \frac{(1+2i)(1+i)}{2} = \frac{7}{10}(1+i)(1+2i) = \frac{7}{10}(-1+3i)$, deci $\operatorname{Re}(z) = -\frac{7}{10}$.

2. $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = \left[2\left(x + \frac{1}{2}\right)\right] - \left[x + \frac{1}{2}\right] - [x+1] = [2x+1] - \left[x + \frac{1}{2}\right] - [x+1] = [2x] + 1 - \left[x + \frac{1}{2}\right] - [x] - 1 = [2x] - [x] - \left[x + \frac{1}{2}\right] = f(x)$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$, deci f este periodică, cu perioada $\frac{1}{2}$.

3. Ecuația este echivalentă cu $2^{2x} = 2^{\frac{1}{x}} \Leftrightarrow 2x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2}$, deci soluțiile sunt $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

4. $C_n^1 + 2C_n^2 = 16 \Leftrightarrow n + n(n-1) = 16 \Leftrightarrow n^2 = 16$, $n \geq 2$, deci $n = 4$.

5. Fie M mijlocul lui $[BC]$. Avem $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \Rightarrow x_B + x_C = 3x_G - x_A = 8 \Rightarrow x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = 4$ și,

analog, $y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \Rightarrow y_B + y_C = 3y_G - y_A = 10 \Rightarrow y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = 5$, deci $M(4, 5)$.

6. Din teorema sinusului avem $\frac{BC}{\sin A} = 2R$, deci $\sin A = 1$. Atunci $\cos A = 0$.

Subiectul II

1. a) $\det(A) = \begin{vmatrix} a & 1 & 2b \\ b & 1 & -a \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4a + 2b^2 + a^2 - 4b = (a+2)^2 + 2(b-1)^2 - 6$. Avem $\det(A) = -6$ dacă și

numai dacă $(a+2)^2 + 2(b-1)^2 = 0 \Leftrightarrow a = -2$ și $b = 1$.

b) Fie $\Delta_1 = \begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a$ și $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -a \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = a + 4$. Cum $\Delta_2 - \Delta_1 \neq 0$ rezultă că Δ_1 și Δ_2 nu pot fi simultan zero, deci $\operatorname{rang}(A) \geq 2$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$.

c) Fie $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ o soluție. Atunci $\det(AX) = \det(-\sqrt[3]{6}I_3)$, deci $\det(A) \cdot \det(X) = -6$. Cum $\det(X) = 1$, rezultă că $\det(A) = -6$, deci $a = -2$ și $b = 1$. Deci, dacă $a \neq -2$ sau $b \neq 1$ rezultă că ecuația nu are soluții. Dacă $a = -2$, $b = 1$, atunci $AX = -\sqrt[3]{6}I_3 \Leftrightarrow X = -\sqrt[3]{6} \cdot A^{-1}$.

$$= -\sqrt[3]{6} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = -\sqrt[3]{6} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -4 & -8 & 6 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. a) Fie $x, y \in \mathbb{R}$. Cum $x*y = xy + 3x + 3y + 7 = yx + 3y + 3x + 7 = y*x$, legea „*” este comutativă.

b) $(1*2) * 3 = 18 * 3 = 124$, iar $1*(2*3) = 1*28 = 122$ rezultă că $\frac{(1*2)*3}{1*(2*3)} = \frac{124}{122} = \frac{62}{61}$.

c) Legea „*” are element neutru $\Leftrightarrow \exists e \in \mathbb{R}$ astfel încât $x*e = e*x = x$, $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow xe + 3x + 3e + 7 = x$, $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x(e+2) + 3e + 7 = 0$, $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow e+2 = 0$ și $3e+7 = 0 \Leftrightarrow e = -2$ și $e = -\frac{7}{3}$, fals.

Deci legea „*” nu are element neutru.

Subiectul III

1. a) Cum $f'(x) = e^x + 3$ și $f'(1) = e + 3$, rezultă că ecuația tangentei în punctul $A(1, e+2)$ la graficul funcției f este $y - e - 2 = (e+3)(x-1)$.

b) Avem $f(-1) + f(-2) + \dots + f(-n) = e^{-1} - 3 \cdot 1 - 1 + e^{-2} - 3 \cdot 2 - 1 + \dots + e^{-n} - 3n - 1 = e^{-1} + e^{-2} + \dots + e^{-n} - 3(1+2+\dots+n) - n = \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots + \frac{1}{e^n} - \frac{3n(n+1)}{2} - n = \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots + \frac{1}{e^n} - \frac{n(3n+5)}{2}$,

deci $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(f(-1) + f(-2) + \dots + f(-n) + \frac{n(3n+5)}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots + \frac{1}{e^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \cdot \frac{\left(\frac{1}{e}\right)^n - 1}{\frac{1}{e} - 1} = \frac{1}{e-1}$.

c) Fie $m \in \mathbb{R}$ pentru care $f(x) - mx \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ și funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - mx$. Cum $g(0) = f(0) = 0$, rezultă că $g(x) \geq g(0)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, deci $x = 0$ este punct de minim. Cum g este derivabilă, din teorema lui Fermat rezultă $g'(0) = 0$. Deoarece $g'(x) = f'(x) - m = e^x + 3 - m$ și $g'(0) = 4 - m$, rezultă $m = 4$. Pentru $m = 4$, considerăm funcția $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x) - 4x = e^x - x - 1$. Cum $h'(x) = e^x - 1$, din monotonia lui h rezultă că $x = 0$ este punct de minim global. Rezultă că $h(x) \geq h(0) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, deci $f(x) \geq 4x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. În concluzie, $m = 4$.

2. a) $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \arctg x \, dx = \int_0^1 \arctg x \cdot (\arctg x)' \, dx = \frac{1}{2} \arctg^2 x \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 = \frac{\pi^2}{32}$.

b) $f^{101}(-x) = \arctg^{101}(-x) = -\arctg^{101} x = -f^{101}(x)$, deci funcția de sub integrală este impară. Rezultă că integrala cerută este 0.

c) Cum $0 \leq \arctg x \leq \frac{\pi}{4}$, $\forall x \in [0, 1]$, rezultă că $0 \leq x^3 \arctg^n x \leq x^3 \left(\frac{\pi}{4} \right)^n \leq \left(\frac{\pi}{4} \right)^n$, $\forall x \in [0, 1]$ și $n \in \mathbb{N}^*$.

Obținem $0 \leq \int_0^1 x^3 f^n(x) \, dx \leq \left(\frac{\pi}{4} \right)^n$ și cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{4} \right)^n = 0$, rezultă că limita cerută este 0.

Testul 15

Subiectul I

1. $\sqrt[3]{1024} = \sqrt[3]{2^{10}} = 2^{\frac{10}{3}} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow n \mid 10 \Leftrightarrow n \in \{2, 5, 10\}$. Deci mulțimea conține 3 numere raționale.

2. $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -x^3 - x + a = -x^3 - x - a$, $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 2a = 0 \Leftrightarrow a = 0$. 3. Ecuația devine

$$\frac{4^x + 2}{3} = 2^x \Leftrightarrow 4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0 \Leftrightarrow (2^x - 1)(2^x - 2) = 0 \Leftrightarrow 2^x = 1 \text{ sau } 2^x = 2. \text{ Soluțiile sunt } x_1 = 0 \text{ și } x_2 = 1.$$

4. Fie $B = \{a, b\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$. Cum există 2^4 funcții $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow B$ și exact 2 funcții constante $f(x) = a$, $\forall x \in \{1, 2, 3, 4\}$ și $f(x) = b$, $\forall x \in \{1, 2, 3, 4\}$ rezultă că există $2^4 - 2 = 14$ funcții cu $\text{Im} f = B$. Cum există $C_4^2 = 6$ submulțimi cu 2 elemente ale mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$, rezultă că numărul cerut este

$$14 \cdot 6 = 84. 5. \text{ Fie } T \text{ mijlocul segmentului } AB. \text{ Atunci } T(-1, 4). \text{ Cum panta dreptei } AB \text{ este } -\frac{1}{2}, \text{ rezultă}$$

că panta mediatoarei este 2. Atunci mediatoarea are ecuația $y - 4 = 2(x + 1)$, $M(-1, a)$ se află pe mediatoare $\Leftrightarrow a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = 4$. Sau, $AM = MB \Leftrightarrow \sqrt{4 + (3-a)^2} = \sqrt{4 + (5-a)^2} \Leftrightarrow (3-a)^2 = (5-a)^2 \Leftrightarrow 9 - 6a + a^2 = 25 - 10a + a^2 \Leftrightarrow 4a = 16 \Leftrightarrow a = 4$.

6. Avem $\frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{1}{bc} = \frac{a+b+c}{abc} = \frac{2p}{abc} = \frac{2}{r} \cdot \frac{pr}{abc} = \frac{2}{r} \cdot \frac{S}{abc} = \frac{2}{r} \cdot \frac{S}{4RS} = \frac{1}{2rR} = \frac{1}{8}$.

Subiectul II

1. a) $\det(A) = \begin{vmatrix} a^2 & a^2+1 & a^2+2 \\ b^2-1 & b^2 & b^2+1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2-b^2+1 & a^2-b^2+1 & a^2-b^2+1 \\ b^2-1 & b^2 & b^2+1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} =$

$$= (a^2 - b^2 + 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b^2-1 & b^2 & b^2+1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (a^2 - b^2 + 1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b^2-1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = a^2 - b^2 + 1.$$

b) $\Delta_1 = \begin{vmatrix} a^2 & a^2+1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = a^2 - 1$ și $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a^2+1 & a^2+2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2a^2$. Cum $\Delta_2 - 2\Delta_1 = 2$ rezultă că Δ_1 și Δ_2 nu

pot fi simultan 0, deci $\text{rang}(A) \geq 2$.

c) Din punctul b) avem $\text{rang}(A) = 2 \Leftrightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow b^2 - a^2 = 1 \Leftrightarrow (b-a)(b+a) = 1 \Leftrightarrow b-a = b+a = 1$ sau $b-a = b+a = -1 \Leftrightarrow a = 0$ și $b = 1$ sau $a = 0$ și $b = -1 \Leftrightarrow a = 0$ și $|b| = 1$.

2. a) $x * x = x \Leftrightarrow \frac{8x}{4+x^2} = x \Leftrightarrow 8x = 4x + x^3 \Leftrightarrow x(x^2 - 4) = 0$, $x \in (-2, 2) \Leftrightarrow x = 0$.

b) Din ipoteză, „*” este lege pe $G = (-2, 2)$. Verificăm axiomele grupului:

• asociativitatea: $(x * y) * z = \frac{4(x+y)}{4+xy} * z = \frac{4 \left(\frac{4(x+y)}{4+xy} + z \right)}{4 + \frac{4(x+y)}{4+xy} \cdot z} = \frac{4(x+y+z) + xyz}{4+xy+yz}$, $\forall x, y, z \in (-2, 2)$, și

$$x * (y * z) = x * \frac{4(y+z)}{4+yz} = \frac{4 \left(x + \frac{4(y+z)}{4+yz} \right)}{4 + x \cdot \frac{4(y+z)}{4+yz}} = \frac{4(x+y+z) + xyz}{4+xy+yz}, \text{ deci legea „*” este asociativă.}$$

• elementul neutru: $x * 0 = 0 * x = \frac{4x}{4} = x$, $\forall x \in (-2, 2)$, deci $e = 0$ este elementul neutru al legii „*”.

• simetrizabilitatea elementelor: fie $x \in (-2, 2)$; atunci x este simetrizabil $\Leftrightarrow \exists x' \in (-2, 2)$ astfel încât $x * x' = x' * x = 0 \Leftrightarrow \frac{4(x+x')}{4+xx'} = 0 \Leftrightarrow x+x' = 0 \Leftrightarrow x' = -x \in (-2, 2)$. Așadar, toate elementele sunt simetrizabile, rezultă că $(G, *)$ e grup.

$$c) f(x) * f(y) = \frac{4 \left(\frac{2(x-1)}{x+1} + \frac{2(y-1)}{y+1} \right)}{4 + 4 \frac{(x-1)(y-1)}{(x+1)(y+1)}} = 2 \frac{(x-1)(y+1) + (y-1)(x+1)}{(x+1)(y+1) + (x-1)(y-1)} = 2 \frac{2xy-2}{2xy+2} = \frac{2(xy-1)}{xy+1} = f(xy),$$

$\forall x, y \in (0, \infty)$, deci f este morfism. Cum $f(x) = \frac{2(x+1)-4}{x+1} = 2 - \frac{4}{x+1}$, rezultă că f este strict crescătoare, deci injectivă. Deoarece f este continuă, crescătoare, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$, rezultă că $\text{Im} f = (-2, 2)$, deci f este surjectivă.

Subiectul III

1. a) Avem $f(x) = 3x^2 + 6x$ și $f'(x) = 6x + 6$, $x \in \mathbb{R}$. Analizând semnul lui f'' , rezultă că $x = -1$ este unicul punct de inflexiune.

b) $\frac{g(x) - g(-2)}{x - (-2)} = \frac{|x^3 + 3x^2 - 4|}{x + 2} = \frac{|(x+2)(x^2 + x - 2)|}{x + 2} = \frac{|(x+2)^2(x-1)|}{x + 2} = (x+2)|x-1| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x) - g(-2)}{x - (-2)} = 0$, de unde rezultă că funcția g este derivabilă în $x_0 = -2$ și $g'(-2) = 0$.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x^2} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 3x^2 - 4}{x^3} \right)^{\frac{1}{x}} \cdot x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^0 = 1$, deoarece, aplicând teorema lui

L'Hôpital, cazul $\frac{\infty}{\infty}$, avem $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

2. a) $A = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = 2 \arctg x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (f^{n+1}(x) - f^n(x)) dx = \int_0^1 f^n(x)(f(x) - 1) dx$. Deoarece $0 \leq f(x) \leq 1$, $\forall x \in [0, 1]$, rezultă că $f^n(x) \cdot (f(x) - 1) \leq 0$, $\forall x \in [0, 1]$, deci $I_{n+1} - I_n \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Rezultă că șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este

descrescător, deci mărginit superior. Cum $I_n = \int_0^1 f^n(x) dx \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ rezultă că șirul $(I_n)_n$ este mărginit inferior, deci este convergent.

c) $I_n = \int_0^1 x' \cdot (x^2 + 1)^{-n} dx = \frac{x}{(x^2 + 1)^n} \Big|_0^1 + n \int_0^1 x \cdot (x^2 + 1)^{-n-1} \cdot 2x dx = \frac{1}{2^n} + 2n \int_0^1 \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx =$

$\frac{1}{2^n} + 2n \int_0^1 \frac{x^2 + 1 - 1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx = \frac{1}{2^n} + 2n I_n - 2n I_{n+1}$. Rezultă că $2n I_{n+1} - (2n - 1) I_n = \frac{1}{2^n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Testul 16

Subiectul I

1. Cum $1 + 3^2 + 3^4 + \dots + 3^{2n} = \frac{9^{n+1} - 1}{8}$, relația din enunț devine $9^{n+1} - 1 = 6560 \Leftrightarrow 9^{n+1} =$

$6561 \Leftrightarrow 9^n = 9^4 \Leftrightarrow n = 3$. 2. Deoarece $\Delta = a^2 - 4$, iar $G_f \cap O_x = \emptyset \Leftrightarrow \Delta < 0$. Obținem $a \in \{-1, 0, 1\}$.

3. Cum funcția $f: [-2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[3]{x+1} + \sqrt{x+2}$ este strict crescătoare, deci injectivă și $f(7) = 5$

rezultă că ecuația are soluția unică $x = 7$. 4. Cum $3^3 < 100 \leq 5^3 < 7^3 \leq 999 < 11^3$, rezultă că există 2

cuburi de numere prime având 3 cifre. Cum există 900 de numere naturale de 3 cifre, rezultă că

Probabilitatea este $\frac{1}{450}$. 5. Avem $5 \overline{AM} = 2(\overline{AM} + \overline{MB}) + 3(\overline{AM} + \overline{MC})$, deci $\overline{O} = 2 \overline{MB} + 3 \overline{MC}$.

Cum $\overline{MB} = -\frac{3}{2} \overline{MC} \Rightarrow |\overline{MB}| = \frac{3}{2} |\overline{MC}|$, deci $\frac{BM}{MC} = \frac{3}{2}$. 6. Cum $AB^2 + AC^2 + AB \cdot AC = BC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$ rezultă $\cos A = -\frac{1}{2}$, deci $m(\hat{A}) = 120^\circ$.

Subiectul II

1. a) Dacă $A \in M$, atunci $\det^3(A) = \det(A^3) = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4$, deci $\det(A) \neq 0$. Rezultă $\text{rang}(A) = 2$.

b) Fie $X \in M_2(\mathbb{R})$ cu $X^2 = A$, $A \in M$. Atunci $\det^2(X) = \det(X^2) = \det(A) = -4$, fals pentru că $\det^2(X) \geq 0$. Deci ecuația $X^2 = A$ nu are soluții în $M_2(\mathbb{R})$.

c) Dacă $A \in M$, atunci $A^6 = 4I_2 \Leftrightarrow A^6 - I_2 = 3I_2 \Leftrightarrow (A - I_2)(A^5 + A^4 + A^3 + A^2 + A + I_2) = 3I_2$, de unde rezultă că $A - I_2$ este inversabilă.

2. a) Fie $e \in \mathbb{Z}$ elementul neutru al legii „ \star ”. Atunci $x \star e = e \star x = x$, $\forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x + e + 2 = x \Leftrightarrow e = -2$.

b) Fie $x, y \in \mathbb{Z}$ cu $x \circ y = -2$. Atunci $xy + 2x + 2y + 2 = -2$, deci $(x+2)(y+2) = 0$, de unde $x = -2$ sau $y = -2$. Rezultă că inelul $(\mathbb{Z}, \star, \circ)$ nu are divizori ai lui zero.

c) Elementul neutru al legii „ \circ ” este $c \in \mathbb{Z}$ cu $x \circ c = c \circ x = x$, $\forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow xc + 2x + 2c + 2 = x$, $\forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow (x+2)(c+1) = 0$, $\forall x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow c = -1$. Cum f este morfism de inele, rezultă că $f(0) = -2$ și $f(1) = -1$. Rezultă $b = -2$ și $a + b = -1$, deci $a = 1$ și $b = -2$.

Subiectul III

1. a) Pentru $x \neq 1$ avem $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}} \cdot \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{\sqrt{(1-x^2)^2 \cdot (x^2+1)}} = \frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)}$.

Obținem $f'(x) = \frac{2}{1+x^2}$ pentru $x \in [0, 1]$ și $f'(x) = \frac{-2}{1+x^2}$ pentru $x \in (1, \infty)$. Cum f este derivabilă pe $[0, \infty) \setminus \{1\}$, este continuă în $x_0 = 1$ și $\lim_{x \uparrow 1} f'(x) = 1$, deci $f'_s(1) = 1$ și $\lim_{x \downarrow 1} f'(x) = -1$, deci $f'_d(1) = -1$. Rezultă că f nu e derivabilă în $x_0 = 1$.

b) Deoarece $f''(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2} < 0$ pentru $x \in [0, 1]$ și $f''(x) = \frac{4x}{(1+x^2)^2} > 0$, $\forall x \in (1, \infty)$ și f e continuă în 1 rezultă că $x_0 = 1$ este unicul punct de inflexiune al graficului funcției f .

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x}}$. Cum $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{1+x^2} = 2$, din teorema lui L'Hôpital, cazul $\frac{0}{0}$,

rezultă că limita cerută este 2.

2. a) $F = \int f(x) dx = \int (1+x)' \ln(1+x) dx = (1+x) \ln(1+x) - \int dx = (1+x) \ln(1+x) - x + C$. Rezultă că $F(x) = (1+x) \ln(1+x) + c$. Cum $0 = F(0) = c$, rezultă $F(x) = (1+x) \ln(1+x)$.

b) $\int_0^1 \frac{f(x)}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x+1} dx = \int_0^1 \ln(1+x) \cdot (\ln(1+x))' dx = \frac{1}{2} \ln^2(1+x) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln^2 2$.

c) Avem $f\left(\text{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) = f\left(\frac{1 - \text{tg} x}{1 + \text{tg} x}\right) = \ln\left(1 + \frac{1 - \text{tg} x}{1 + \text{tg} x}\right) = \ln \frac{2}{1 + \text{tg} x} = \ln 2 - \ln(1 + \text{tg} x) = \ln 2 - f(\text{tg} x)$.

Cu substituția $y = \frac{\pi}{4} - x$ avem $\int_0^{\pi/4} f(\text{tg} x) dx = - \int_{\pi/4}^0 f\left(\text{tg}\left(\frac{\pi}{4} - y\right)\right) dy = \int_0^{\pi/4} f\left(\text{tg}\left(\frac{\pi}{4} - y\right)\right) dy =$
 $= \int_0^{\pi/4} (\ln 2 - f(\text{tg} y)) dy = \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\pi/4} f(\text{tg} y) dy$. Rezultă că $\int_0^{\pi/4} f(\text{tg}(x)) dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$.

Testul 17

Subiectul I

1. Avem $[x-1] = \{x\} \in [0, 1]$, deci $[x-1] = \{x\} = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$ și $0 \leq x-1 < 1$. Obținem $x = 1$.
 2. Fie $y \in (3, \infty)$; $f(x) = y \Leftrightarrow 2^x + 3 = y \Leftrightarrow 2^x = y - 3 > 0 \Leftrightarrow x = \log_2(y - 3)$. Deci inversa funcției f este funcția $f^{-1}: (3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \log_2(x - 3)$.

3. Ecuația se scrie $\cos x = \frac{\sin x}{\cos x} \Leftrightarrow \cos^2 x = \sin x \Leftrightarrow \sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x \in \left\{ \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{-\sqrt{5}-1}{2} \right\}$.

Cum $\frac{-\sqrt{5}-1}{2} < -1$ obținem $\sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, deci $x \in \left\{ (-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4. $C_7^k < C_7^{k+1} \Leftrightarrow \frac{7!}{k!(7-k)!} < \frac{7!}{(k+1)!(7-k-1)!} \Leftrightarrow \frac{1}{7-k} < \frac{1}{k+1} \Leftrightarrow k+1 < 7-k \Leftrightarrow k < 3 \Leftrightarrow k \in \{0, 1, 2\}$. Probabilitatea este $\frac{3}{7}$.

5. $\vec{u} + \vec{v} = 4\vec{i} + (a+3)\vec{j}$ și $\vec{u} - \vec{v} = -2\vec{i} + (3-a)\vec{j}$. Avem $(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v}) \Leftrightarrow (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow -8 + (a+3)(3-a) = 0 \Leftrightarrow a^2 = 1 \Leftrightarrow a = \pm 1$. 6. Cum $p = 8$, cu formula lui Heron, aria triunghiului este $S = \sqrt{4 \cdot 3 \cdot 1} = 2\sqrt{3}$. Deoarece $S = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{2}$ obținem $2\sqrt{3} = 14 \sin A$, deci $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{7}$.

Subiectul II

1. a) $\det A(x) = (1+3x)(1-2x) + 6x^2 = 1+x$, deci $1+x = 2 \Leftrightarrow x = 1$.

b) Avem $A(x) = I_2 + xB$, unde $B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. Cum $B^2 = B$, rezultă că:

$$A(x)A(y) = (I_2 + xB)(I_2 + yB) = I_2 + xB + yB + xyB^2 = I_2 + (xy + x + y)B = A(xy + x + y).$$

c) Inducție matematică după n : $P(1): A(3) = A(3)$, deci $P(1)$ este adevărată. Pentru $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ avem $(A(3))^{n+1} = (A(3))^n \cdot A(3) = A(4^n - 1) \cdot A(3) = A(3 \cdot 4^n - 3 + 4^n - 1 + 3) = A(4^{n+1} - 1)$.

2. a) $\hat{5}x + \hat{4} = \hat{1} \Leftrightarrow \hat{5}x = \hat{-3} \Leftrightarrow \hat{5}x = \hat{4} \Leftrightarrow x = \hat{5}^{-1} \cdot \hat{4} \Leftrightarrow x = \hat{3} \cdot \hat{4} \Leftrightarrow x = \hat{5}$.

b) $\hat{0}^3 = \hat{0}$, $\hat{1}^3 = \hat{2}^3 = \hat{4}^3 = \hat{1}$ și $\hat{3}^3 = \hat{5}^3 = \hat{6}^3 = \hat{6}$, rezultă $H = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{6}\}$, deci H are 3 elemente.

c) Dacă $\hat{y} = \hat{0}$ rezultă că $x^3 = \hat{0}$, deci $x = \hat{0}$. Dacă $y \neq \hat{0}$, atunci $x^3 + \hat{2}y^3 = \hat{0} \Leftrightarrow x^3 = -\hat{2}y^3 \Leftrightarrow (xy^{-1})^3 = \hat{5} \Rightarrow \hat{5} \in H$, fals, deci $(\hat{0}, \hat{0})$ este singura pereche cu proprietatea din enunț.

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$; $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = 1$ și $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - m(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 1 \right) =$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{\frac{x-1}{x+1} - 1}{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + 1} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{x+1} = -1, \text{ deci } y = x-1 \text{ este asimptotă oblică spre } +\infty. \text{ Cum } f \text{ este continuă}$$

pe $[1, \infty)$, graficul lui f nu are asimptote verticale.

b) $f'(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + \frac{x}{2\sqrt{x-1}} \cdot \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x > 1$, deci f este strict crescătoare pe $(1, \infty)$. Fiind continuă, f este strict crescătoare pe $[1, \infty)$. Cum $f(1) = 0$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, rezultă că $\text{Im} f = [0, \infty)$.

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{x+1} \right)^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-2}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{2}} \right]^{\frac{-x}{x+1}} = e^{-1}.$$

$$2. a) I_2 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dx = -\text{ctg} x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

$$b) I_{n+2} + I_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \text{ctg}^n x (\text{ctg}^2 x + 1) dx = 0 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \text{ctg}^n x \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx = - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \text{ctg}^n x (\text{ctg} x)' dx = - \frac{\text{ctg}^{n+1} x}{n+1} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{n+1}.$$

c) Cum $I_{n+1} - I_n = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \text{ctg}^n x \cdot (\text{ctg} x - 1) dx \leq 0$, șirul $(I_n)_{n \geq 1}$ este descrescător și, în consecință mărginit

superior. Cum $\text{ctg} x \in [0, 1]$ pentru orice $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$, rezultă că $I_n \geq 0, \forall n$, deci șirul $(I_n)_n$ este mărginit. Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = L$. Trecând la limită relația de la punctul b) rezultă că $2L = 0$, deci $L = 0$.

Testul 18

Subiectul I

1. Dacă $3 = a_{n+1}$ și $\sqrt{3} = a_{m+1}$, atunci $3 = a_1 + nr$ și $\sqrt{3} = a_1 + mr \Rightarrow 3 - \sqrt{3} = (n-m)r \Rightarrow r = \frac{3 - \sqrt{3}}{n-m} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 2. Avem $f(2) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) = 6$ și $f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f(2) = \frac{15}{2}$. Obținem $f(2) = 3$.

3. $\log_2 x = \log_3 x \Leftrightarrow \frac{\lg x}{\lg 2} = \frac{\lg x}{\lg 3} \Leftrightarrow \lg x \left(\frac{1}{\lg 2} - \frac{1}{\lg 3} \right) = 0 \Leftrightarrow \lg x = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

4. Avem $T_{k+1} = C_n^k \left(\sqrt[3]{2} \right)^k = C_n^k \cdot 2^{\frac{k}{3}} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow 5 \mid k, k = \overline{0, n}$. Cum există $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil + 1$ multiplii de 5 de la 0 la n , rezultă că $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil + 1 = 7 \Leftrightarrow \left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil = 6 \Leftrightarrow 6 \leq \frac{n}{5} < 7 \Leftrightarrow n \in \{30, 31, 32, 33, 34\}$.

5. Dreptele care trec prin $A(1, 2)$ au ecuațiile $a(x-1) + b(y-2) = 0$ cu $a^2 + b^2 \neq 0$. Distanța de la B la a astfel de dreaptă este $\frac{|a(3-1) + b(-1-2)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|2a - 3b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Avem $\frac{|2a - 3b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2 \Leftrightarrow |2a - 3b| = 2\sqrt{a^2 + b^2} \Leftrightarrow 4a^2 - 12ab + 9b^2 = 4a^2 + 4b^2 \Leftrightarrow b(5b - 12a) = 0 \Rightarrow b = 0$ sau $\frac{b}{a} = \frac{12}{5}$. Obținem $a(x-1) = 0$, unde

$a \neq 0$, deci $x-1 = 0$, respectiv $x-1 + \frac{b}{a}(y-2) = 0 \Leftrightarrow x-1 + \frac{12}{5}(y-2) = 0 \Leftrightarrow 5x + 12y - 29 = 0$.

6. Din teorema cosinusului $\cos A = \frac{16+36-76}{48} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sin A = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Subiectul II

1. Fie $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & m & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ matricea sistemului. Atunci $\det(A) = m - 16$. Sistemul este compatibil

determinat $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow m - 16 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 16 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{16\}$.

b) Dacă $m \neq 16$, sistemul este compatibil determinat. Dacă $m = 16$ atunci $\det A = 0$, deci $\text{rang } A \leq 2$. Cum $\Delta_p = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 16 \end{vmatrix} = 50 \neq 0$, rezultă că $\text{rang } A = 2$. Deoarece $\Delta_c = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 2 & 16 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 170 \neq 0$, sistemul este incompatibil. Deci nu există $m \in \mathbb{R}$ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

c) O soluție cu componentele în progresie aritmetică este soluție a sistemului
$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ 2x + my + 3z = 0 \\ x + 3y + z = 4 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

Rezolvăm sistemul format din ecuațiile 1, 3 și 4; acesta are soluțiile. Obținem prin scăderea ultimelor două ecuații $x = \frac{3}{5}, y = \frac{4}{5}, z = 1$. Înlocuind în ecuația a doua obținem $m = -\frac{21}{4}$.

2. a) Fie $c, r \in \mathbb{R}[X]$ astfel încât $f = (X^2 - 1)c + r$, cu $\text{grad } r \leq 1$. Atunci $f(1) = r(1)$ și $f(-1) = r(-1)$. Dacă $r = aX + b$, atunci $a + b = 3^{10} + 1$ și $-a + b = 1 + 3^{10} \Rightarrow b = 3^{10} + 1$ și $a = 0$, deci $r = 3^{10} + 1$.

b) Avem $f(1) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{20}$ și $f(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_{20}$. Rezultă că $a_0 + a_2 + \dots + a_{20} = \frac{f(1) + f(-1)}{2} = 3^{10} + 1$.

c) Fie $x \in \mathbb{R}$. Avem $f(-x) = (x^2 - x + 1)^{10} + (x^2 + x + 1)^{10} = f(x)$. Cum polinomul $f(X) - f(-X)$ are o infinitate de soluții, rezultă că $f(X) = f(-X)$, deci $a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_{20}X^{20} = a_0 - a_1X + a_2X^2 - \dots + a_{20}X^{20}$. Atunci $a_{2k+1} = -a_{2k+1}$, deci $a_{2k+1} = 0, \forall k = 0, 9$. Rezultă că $a_7 = 0$.

Subiectul III

1. a) Cum $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, dreapta $y = 1$ este asimptotă orizontală spre $\pm\infty$; deoarece $\lim_{x \uparrow -4} f(x) = \infty$ și $\lim_{x \downarrow -4} f(x) = -\infty$, dreapta $x = -4$ este asimptotă verticală. Cum f este continuă pe $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$, nu există alte asimptote verticale.

b) $f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(n) = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{n+3}{n+4} = \frac{4}{n+4}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n+4}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n+4}\right)^{\frac{n+4}{4}} = e^4$.

c) Avem $f(x) = 1 - \frac{1}{x+4}$, deci $f'(x) = \frac{1}{(x+4)^2} > 0$. Rezultă că f este strict crescătoare pe $(-4, \infty)$.

Cum $x_{n+1} = \frac{x_n + 3}{x_n + 4}$, $x_1 = 1 > 0$, rezultă că $x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Arătăm prin inducție că $(x_n)_n$ este descrescător: $x_2 = f(1) = \frac{4}{5} < x_1$ și dacă $x_n < x_{n-1}$, obținem din monotonia lui f că $f(x_n) < f(x_{n-1})$, deci $x_{n+1} < x_n$. Cum $(x_n)_n$ este descrescător și $0 < x_n \leq x_1 = 1, \forall x \in \mathbb{N}^*$ rezultă că $(x_n)_n$ este convergent. Fie

$l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Atunci $l = \frac{l+3}{l+4} \Rightarrow l^2 + 3l - 3 = 0 \Rightarrow l = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}$. Cum $l > 0 \Rightarrow l = \frac{\sqrt{21} - 3}{2}$.

2. a) $A = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2 - 4x + 3 dx = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

b) $\int_1^2 (x-2)f^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (2x-4)f^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 f'(x)f^2(x) dx = \frac{1}{6} f^3(x) \Big|_1^2 = 0$, deoarece $f(3) = f(1) = 0$.

c) $I_{n+1} = \int_1^3 (x-2)' f^{n+1}(x) dx = (x-2) f^{n+1}(x) \Big|_1^3 - (n+1) \int_1^3 (x-2) f^n(x) (2x-4) dx =$
 $= -2(n+1) \int_1^3 (x^2 - 4x + 4) f^n(x) dx = -2(n+1) \int_1^3 (f(x) + 1) f^n(x) dx = -2(n+1) I_{n+1} - 2(n+1) I_n$.

Deci $(2n+3)I_{n+1} = -2(n+1)I_n$, de unde $\frac{I_{n+1}}{I_n} = -\frac{2(n+1)}{2n+3}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = -1$.

Testul 19

Subiectul I

1. Avem $\frac{z^2 + z + 1}{z} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z + \frac{1}{z} = \bar{z} + \frac{1}{\bar{z}} \Leftrightarrow z - \bar{z} - \frac{z - \bar{z}}{z\bar{z}} = 0 \Leftrightarrow$
 $\Rightarrow (z - \bar{z}) \left(1 - \frac{1}{z\bar{z}}\right) = 0 \Leftrightarrow (z - \bar{z})(|z|^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow |z|^2 = 1 \Leftrightarrow |z| = 1$.

2. Imaginea funcției f este $\left[-\frac{\Delta}{4a}, \infty\right) = [4, \infty)$. Deci $B = [4, \infty)$.

3. Pentru $x > 0$ ecuația se scrie $x^2 + x^{\log_2 8} - 12 \Leftrightarrow x^2 + x^3 = 12$. Funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x^3$ este strict crescătoare, deci injectivă, iar $f(2) = 12$; rezultă că $x = 2$ este unica soluție a ecuației.

4. Dezvoltarea are 9 termeni, deci cel din mijloc, este $T_5 = C_8^4 x^4 = 70 x^4$. Cum $T_5 = 70$, rezultă $x^4 = 1$, deci $x = \pm 1$. 5. $\overline{AC} + \overline{EF} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{EF} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CB} = \overline{AB}$, deci $|\overline{AC} + \overline{EF}| = |\overline{AB}| = 1$.

6. Avem $\text{tg } \frac{A}{2} = \frac{r}{p-a} = \frac{2r}{b+c-a} = 1$. Rezultă că $\frac{A}{2} = \frac{\pi}{4}$, deci $A = \frac{\pi}{2}$.

Subiectul II

1. a) Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & m \\ 1 & 2 & m+1 \end{pmatrix}$ matricea sistemului. Sistemul are soluții nenule $\Leftrightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = -1$.

b) Cum orice soluție cu proprietatea din enunț este nenulă, rezultă că $m = -1$. Cum $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$,

rezultă că rangul lui A este 2, deci sistemul este compatibil nedeterminat, cu necunoscuta secundară z .

Pentru $z = \alpha \in \mathbb{R}$ sistemul devine: $\begin{cases} x + y = \alpha \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2\alpha, y = -\alpha$. Deci $x_0 = 2\alpha, y_0 = -\alpha, z_0 = \alpha$, de

unde $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 6\alpha^2$. Obținem $\alpha^2 = 1$, deci $\alpha = \pm 1$ și soluțiile $(2, -1, 1)$ și $(-2, 1, -1)$.

2. a) Avem $f_a = (x^2 - a^2)c + r$ cu $c, r \in \mathbb{R}[x]$ și $\text{grad } r \leq 1$. Dacă $a = 0$, cum $f_0 = 2x^{12}$, rezultă că $r = 0$ deoarece X^2 divide f_0 . Dacă $a \neq 0$ și $r = pX + q$ cu $p, q \in \mathbb{R}$, atunci $f(a) = pa + q, f(-a) = -pa + q$, de unde $pa + q = (2a)^{12}$ și $-pa + q = (2a)^{12}$. Rezultă $p = 0$ și $q = 2^{12} \cdot a^{12}$, deci $r = 2^{12} a^{12}$.

b) Fie $\alpha \in \mathbb{R}$ o rădăcină reală a lui f_a . Cum $(\alpha + a)^{12} + (\alpha - a)^{12} = 0$, rezultă că $\alpha + a = \alpha - a = 0$, deci $\alpha = a = 0$. Atunci $f_a = f_0 = 2X^{12}$ și 0 este rădăcină multiplă de ordinul 12.

c) Fie $z \in \mathbb{C}, z = u + vi$ o rădăcină a lui f , cu u și $v \in \mathbb{R}$. Cum $(z + a)^{12} = -(z - a)^{12} \Rightarrow$
 $\Rightarrow |z + a|^{12} = |z - a|^{12} \Rightarrow |z + a|^{12} = |z - a|^{12} \Rightarrow |z + a| = |z - a| \Rightarrow |u + a + vi| =$
 $= |u - a + vi| \Rightarrow (u + a)^2 + v^2 = (u - a)^2 + v^2 \Rightarrow 4au = 0 \Rightarrow u = 0$, deci $\text{Re}(z) = 0$.

Subiectul III

1. a) Avem $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ oricare ar fi $x \in \mathbb{R}$. Deoarece mulțimea $\{x \in \mathbb{R} \mid f'(x) = 0\} = \{x \in \mathbb{R}$

! $\cos x = 1$ } $\{2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$ nu conține niciun interval nedegenerat, rezultă că f este strict crescătoare.

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x)}{\sin^3 x} \cdot \frac{\sin^3 x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3 \cdot \frac{f(\sin x)}{\sin^3 x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)}{y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \sin y}{y^3}. \text{ Cu teorema}$$

$$\text{lui L'Hôpital avem } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \sin y}{y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{3y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{6y} = \frac{1}{6}, \text{ deci limita cerută este } \frac{1}{6}.$$

c) Avem $x_1 = f(x_0) = f(1) = 1 - \sin 1 < 1 = x_0$. Presupunem că $x_n < x_{n-1}$. Cum f este strict crescătoare, rezultă că $f(x_n) < f(x_{n-1})$, deci $x_{n+1} < x_n$, adică șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător. Cum $x_1 = 1 > 0$, în ipoteza că $x_n > 0$ obținem $f(x_n) > f(0)$, deci $x_{n+1} > 0$. Rezultă că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit inferior, deci mărginit. Fie $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$. Cum $x_n \in (0, 1) \Rightarrow l \in [0, 1]$ și $l = l - \sin l$, deci $\sin l = 0$. Rezultă $l = 0$.

$$2. a) \text{ Fie } F \text{ o primitivă a lui } f. \text{ Atunci } F''(x) = f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x+1}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{(x+1)^2}\right) < 0 \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R},$$

deci F este concavă.

$$b) \text{ Cu schimbarea de variabilă } \frac{1}{x+1} = t \text{ obținem } \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} \arctg \frac{1}{x+1} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \arctg t dt =$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 t' \arctg t dt = t \arctg t \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{t}{t^2+1} dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctg \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(t^2+1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arctg \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}.$$

$$c) \text{ Fie } x > 0. \text{ Cum } f \text{ este continuă, din teorema de medie rezultă că există } c_x \in (x, x+2) \text{ astfel încât}$$

$$\int_x^{x+2} f(t) dt = f(c_x)(x+2-x) = 2f(c_x). \text{ Cum } \lim_{x \rightarrow \infty} c_x = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \text{ rezultă că } \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+2} f(t) dt = 0.$$

Testul 20

Subiectul I

1. Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ progresia aritmetică cu $a_1 = 1$ și rația $r = 4$. Dacă $x = a_n$, atunci $a_n = a_1 + (n-1)r = 4n-3$.

$$\text{Atunci } 496 = S_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2} = n \cdot \frac{1 + 4n-3}{2} = n(2n-1). \text{ Obținem } 2n^2 - n - 496 = 0 \text{ cu soluțiile } n_1 = 16$$

$$\text{și } n_2 = -\frac{31}{2}. \text{ Cum } n \in \mathbb{N}, \text{ rezultă } n = 16, \text{ deci } x = 61. \quad 2. \text{ Fie } x_1, x_2 \in (0, \infty) \text{ cu } f(x_1) = f(x_2). \text{ Rezultă că}$$

$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, deci $x_1^4 = x_2^4$, de unde $x_1 = x_2$. 3. Funcția $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x+1} + \log_2 x$, este strict crescătoare, deci injectivă. Cum $f(8) = \sqrt{9} + \log_2 8 = 6$ rezultă că $x = 8$ este unica soluție a ecuației.

$$4. \text{ Avem } T_{k+1} = C_7^k \left(\frac{1}{2}\right)^{7-k} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{7-k} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k = \left(\frac{1}{3}\right)^7 = T_8, \text{ cu egalitate } \Leftrightarrow C_7^k = 1 \text{ și}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{7-k} = \left(\frac{1}{3}\right)^{7-k} \Leftrightarrow k = 7. \text{ Deci cel mai mic termen este } T_8. \quad 5. \text{ Avem } AB = \sqrt{9+16} = 5 \text{ și}$$

$$AC = \sqrt{16+9} = 5, \text{ deci triunghiul este isoscel de bază } [BC]. \text{ Notând } M\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) \text{ mijlocul laturii } BC,$$

$$\text{cum bisectoarea din } A \text{ este și mediană, rezultă că lungimea bisectoarei este } AM = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$6. \text{ Cum } \cos 178^\circ = -\cos 2^\circ, \cos 174^\circ = -\cos 6^\circ, \dots, \cos 94^\circ = -\cos 86^\circ, \text{ rezultă că suma este egală cu } \cos 90^\circ, \text{ deci este } 0.$$

Subiectul II

$$1. a) \det(A) = \begin{vmatrix} a^2 & -b^2 & 1 \\ a^2+1 & -b^2+1 & 2 \\ a^2+2 & -b^2+2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2+b^2 & -b^2 & 1 \\ a^2+b^2 & -b^2+1 & 2 \\ a^2+b^2 & -b^2+2 & 4 \end{vmatrix} = (a^2+b^2) \begin{vmatrix} 1 & -b^2 & 1 \\ 1 & -b^2+1 & 2 \\ 1 & -b^2+2 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= (a^2+b^2) \begin{vmatrix} 1 & -b^2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = a^2+b^2.$$

b) Dacă $a \neq 0$ sau $b \neq 0 \Rightarrow \det(A) \neq 0 \Rightarrow$ sistemul este compatibil determinat. Dacă $a = b = 0$ sistemul

$$\text{devine } \begin{cases} z = 1 \\ x + y + 2z = 2 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 \\ x + y = 0 \end{cases} \text{ cu soluția } (\alpha, -\alpha, 1), \alpha \in \mathbb{R}. \text{ Așadar, sistemul este compatibil}$$

nedeterminat pentru $a = b = 0$.

c) Fie x_0, y_0, z_0 o soluție a sistemului. Scăzând prima ecuație din a doua obținem: $x_0 + y_0 + z_0 = 1$, deci $x_0 + y_0 + z_0 \neq 2012$.

$$2. a) \left(1 - \frac{1}{x_1}\right) \left(1 - \frac{1}{x_2}\right) \left(1 - \frac{1}{x_3}\right) \left(1 - \frac{1}{x_4}\right) = \frac{(x_1-1)(x_2-1)(x_3-1)(x_4-1)}{x_1 x_2 x_3 x_4} = (1-x_1)(1-x_2)(1-x_3)(1-x_4) =$$

$$= f(1) = -2, \text{ deoarece } f = (X-x_1)(X-x_2)(X-x_3)(X-x_4) \text{ și } x_1 x_2 x_3 x_4 = 1.$$

b) Fie $i = 1, 5$. Deoarece $x_i^4 = 4x_i - 1$, rezultă că $x_i^5 = 4x_i^2 - x_i$. Adunând cele 5 relații obținem: $x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 + x_4^5 = 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2) - (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$. Din relațiile lui Viète, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ și $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 - 2(x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_3 x_4) = 0$, de unde $x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 + x_4^5 = 0$.

c) Deoarece $f(-1) = 6 > 0$; $f(1) = -2 < 0$; $f(2) = 25 > 0$ și funcția polinomială a lui f este continuă, rezultă că f are două rădăcini reale $x_1 \in (-1, 1)$ și $x_2 \in (1, 2)$. Dacă toate rădăcinile lui f ar fi reale, ar rezulta că $0 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 > 0$, fals și cum numărul rădăcinilor nereale ale lui f este par, rezultă că f are exact două rădăcini reale.

Subiectul III

1. a) Deoarece f este derivabilă pe \mathbb{R} și $f(-a) = f(a)$, $a > 0$ rezultă că se poate aplica teorema lui Rolle pe orice interval de forma $[-a, a]$ cu $a > 0$.

b) Cum f este pară, va fi suficient să determinăm imaginea lui f pe $[0, \infty)$. Cum $f'(x) = 20x^3 + 20x \geq 0$ și $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$, rezultă că f este strict crescătoare pe $[0, \infty)$. Cum f e continuă și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $f(0) = 1$ rezultă că $f([0, \infty)) = [1, \infty)$, deci $\text{Im} f = [1, \infty)$.

$$c) \text{ Avem } f(x) = \frac{(x+1)^5 - (x-1)^5}{2}, \text{ de unde } \sum_{k=1}^n f(k) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n ((k+1)^5 - (k-1)^5) = \frac{(n+1)^5 + n^5 - 1}{2}.$$

$$\text{Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{n^5} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sum_{k=1}^n f(k) - n^5}{n^5} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{(n+1)^5 - n^5 - 1}{2n^5} \right) = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^5 - n^5 - 1}{2n^4}} = e^{\frac{5}{2}}.$$

$$2. a) \text{ Cu schimbarea de variabilă } \ln x = t \text{ avem } \int_1^e \frac{1}{x} \cos(\ln x) dx = \int_0^1 \cos t dt = \sin t \Big|_0^1 = 0.$$

b) Deoarece $\ln x \in [0, 1] \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ pentru $x \in [1, e]$, rezultă că $f(x) > 0$ pentru $x \in [1, e]$. Atunci

$$A = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e x' \cdot \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) \Big|_1^e + \int_1^e x \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$= e \cos 1 - 1 + \int_1^e \sin(\ln x) dx = e \cos 1 - 1 + \int_1^e x' \sin(\ln x) dx = e \cos 1 - 1 + x \sin(\ln x) \Big|_1^e - \int_1^e x \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$= e \cos 1 - 1 + e \sin 1 - A. \text{ Obținem } A = \frac{1}{2} e (\cos 1 + \sin 1) - \frac{1}{2}.$$

c) Cum $\ln x \in [1, 2]$ pentru $x \in [e, e^2]$, rezultă că $f(x) \in [\cos 2, \cos 1]$ pentru $x \in [e, e^2]$. Deoarece $\cos 2 < 0$ și $\cos 1 < |\cos 2|$, avem $|f(x)| \leq |\cos 2|$, $\forall x \in [e, e^2]$. Atunci:

$$\left| \int_e^{e^2} f''(x) dx \right| \leq \int_e^{e^2} |f''(x)| dx \leq \int_e^{e^2} |\cos 2|^n dx = (e^2 - e) |\cos 2|^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ deci } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_e^{e^2} f''(x) dx = 0$$

Testul 21

Subiectul I

1. E suficient ca $\log_2 3 > 1$. Într-adevăr, $1 = \log_2 2 < \log_2 3$. 2. $f(1) = 3 - 1 = 2$, $f(f(1)) = f(2) = 6 - 1 = 5$.
3. Notăm $2^x = t$, $t > 0$. Ecuația se scrie $t^2 + t - 72 = 0$, cu soluțiile $t_1 = 8$ și $t_2 = -9$. Cum $t > 0$, rămâne $2^x = 8$, de unde $x = 3$.

4. Avem $A_n^2 = n(n-1) = 11 \cdot 10$. Rezultă $n = 11$.

5. Panta dreptei $x + y - 1 = 0$ este -1 , deci panta perpendicularei este 1 . Atunci $y - y_A = 1(x - x_A) \Leftrightarrow y = x$ este ecuația cerută.

6. Triunghiul e dreptunghic, cu aria $S = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$ și semiperimetrul $p = \frac{12}{2} = 6$, deci $r = \frac{S}{p} = 1$.

Subiectul II

1. a) $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

b) Avem $\sigma^3 = e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ și deci $\sigma^m = \sigma^{m(\text{mod } 3)}$, adică $M = \{e, \sigma, \sigma^2\}$. Notă: σ, σ^2, e sunt distincte.

c) Observăm că $\tau(2) = 2$, deci $\tau^n(2) = 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Atunci $\sigma^m(2) = 2$. Cum $\sigma(2) = 3 \neq 2$, $\sigma^2(2) = 1 \neq 2$ și $e(2) = 2$, deducem că m este multiplu de 3 și apoi $\sigma^m = e$. Cum $\tau^2 = e$, din $\tau^n = e$, deducem că n este par. Așadar 6 divide mn .

2. a) $A(n) \cdot A(m) = \begin{pmatrix} 1+n+m & -m-n \\ m+n & 1-n-m \end{pmatrix} = A(n+m)$.

b) Conform punctului anterior, cum $n + m \in \mathbb{Z}$ rezultă că M e parte stabilă a mulțimii $M_2(\mathbb{Z})$ față de înmulțire. Operația e asociativă, are elementul neutru $I_2 = A(0) \in M$, iar inversul elementului $A(n)$, unde $n \in \mathbb{Z}$, este $A(-n)$, deoarece $-n \in \mathbb{Z}$ și $A(n) \cdot A(-n) = A(-n) \cdot A(n) = A(0)$.

c) Avem $f(n+m) = f(n) \cdot f(m)$, conform a). Funcția este inversabilă, deoarece $A(n) = A(m)$ dacă și numai dacă $n = m$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1$.

b) Avem $f'(0) = -1$. Ecuația tangentei este $y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 1 = -1(x - 0) \Leftrightarrow x + y - 1 = 0$.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} = 0$, deci $y = 0$ este asimptota orizontală către $+\infty$. Pe de altă parte,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} - 1 \right) = -2$ și $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-2)x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+1} + x) =$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} = 0$, deci $y = -2x$ este asimptota oblică spre $-\infty$. Funcția f e continuă, deci nu admite asimptote verticale.

2. a) $I_1 = \int_0^1 x \sin x dx = - \int_0^1 x(\cos x)' dx = -x \cos x \Big|_0^1 + \int_0^1 x' \cos x dx = -\cos 1 + \sin x \Big|_0^1 = \sin 1 - \cos 1$.

b) Avem $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n(x-1) \sin x dx$. Cum $x^n(x-1) \leq 0$ și $\sin x \geq 0$ pentru $x \in [0, 1]$, funcția de sub integrală este negativă, deci $I_{n+1} - I_n \leq 0$, $n \geq 1$.

c) Deoarece $0 \leq \sin x \leq 1$, avem $0 \leq x^n \sin x \leq x^n$, deci $0 \leq I_n \leq \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}$, de unde $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Testul 22

Subiectul I

1. $a_1 = -10$, $a_{10} = a_1 + 9r = -10 + 18 = 8$, deci $a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = \frac{a_1 + a_{10}}{2} \cdot 10 = \frac{-10+8}{2} \cdot 10 = -10$.

2. $x_V = -\frac{1}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{4}$, $y_V = f\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{2}{16} - \frac{1}{4} - 3 = -\frac{25}{8}$. 3. $-1 = \log_2(x+1) \Leftrightarrow x+1 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$.

4. Sunt $A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ submulțimi. 5. De exemplu $(1, 2)$.

6. Avem $\sin^2 a + \cos^2 a = 1 \Rightarrow \cos^2 a = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Cum $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, avem $\cos a > 0$, deci $\cos a = \frac{4}{5}$.

Subiectul II

1. a) Din prima ecuație avem $-2 + 1 + m = 0 \Rightarrow m = 1$. b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + m - 1 + 2m - 1 - 1 = 3m - 1$.

c) Rangul matricei sistemului este 2, având ca minor principal $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$. Minorul caracteristic este

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, deci sistemul este incompatibil.

2. a) $x \circ x = x^2 + 2x$, deci ecuația este $x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 2, x = -4$.

b) Avem $(x \circ y) \circ z = (x \circ y)z + x \circ y + z = (xy + x + y)z + xy + x + y + z = xyz + xz + yz + xy + x + y + z =$
 $x(y \circ z) + x + y \circ z = xyz + yz + xz + xy + x + y + z, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$, deci operația e asociativă.

c) Scriem $x \circ y = (x+1)(y+1) - 1$. Pentru $x, y > -1$ avem $x+1 > 0, y+1 > 0$, deci $(x+1)(y+1) > 0$ și $x \circ y > -1$, q.e.d.

Subiectul III

1. a) Arătăm prin inducție că $a_{n+a} - a_n > 0$. Avem $a_2 = \sqrt{13} > 1 = a_1$. Cum $a_2 - a_1 > 0$, din

$a_{n+1} - a_n = \sqrt{12 + a_n} - \sqrt{12 + a_{n-1}} = \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{12 + a_n} + \sqrt{12 + a_{n-1}}}$ rezultă cerința.

b) Evident $a_1 < 4$. Prin inducție, din $a_n \leq 4$ deducem $a_{n+1} \leq \sqrt{12 + 4} = 4$, ceea ce trebuie arătat.

c) Șirul este convergent conform teoremei lui Weierstrass. Notăm $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ și observăm că $l \geq 0$, deoarece $a_n \geq 0$. Trecând la limită în relația de recurență obținem $l = \sqrt{12+l} \Rightarrow l^2 - l - 12 = 0 \Rightarrow l = 4$ (cazul $l = -3$ nu convine).

2. a) $\int_0^1 e^x f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$.

b) $\int_0^1 x e^{-x} dx = \int_0^1 x \cdot (-e^{-x})' dx = -x e^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 x' e^{-x} dx = -\frac{1}{e} - e^{-x} \Big|_0^1 = -\frac{1}{e} + \left(-\frac{1}{e} + 1\right) = 1 - \frac{2}{e} = \frac{e-2}{e}$.

c) Aplicând teorema lui l'Hôpital, obținem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}$.

Testul 23

Subiectul I

1. Avem $1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{8} = 1 + \sqrt[3]{8} = 1 + 2 = 3$.

2. $f(-10) + f(-9) + \dots + f(9) + f(10) = -28 - 25 + \dots + 29 + 32$. Suma are 21 de termeni în progresie aritmetică (de rație 3), deci este egală cu $\frac{-28+32}{2} \cdot 21 = 2 \cdot 21 = 42$.

3. Avem $2^{3(x+1)} = 2^{2(1-x)} \Leftrightarrow 3x + 3 = 2 - 2x \Leftrightarrow 5x = -1$, deci $x = -1/5$.

4. Avem soluțiile $x_1 = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ și $x_2 = \pi - x_1 = \frac{2\pi}{3}$.

5. $|\vec{v}_1| = \sqrt{1+64} = \sqrt{65}$; $|\vec{v}_2| = \sqrt{16+49} = \sqrt{65}$, de unde rezultă cerința.

6. $BC^2 = 3^2 + 7^2 - 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot \cos 120^\circ = 9 + 49 + 2 \cdot 21 \cdot \frac{1}{2} = 79$, deci perimetrul este $10 + \sqrt{79}$.

Subiectul II

1. a) $\det A = 0$, $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, deci $\text{rang} A = 2$; $\text{rang} B = 1$, deoarece toți minorii de ordin 2 sunt nuli și $B \neq O_2$. Cerința rezultă.

b) $\det(A + xB) = \begin{vmatrix} x-2 & x+1 & x+1 \\ x+1 & x-2 & x+1 \\ x+1 & x+1 & x-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & x+1 & x+1 \\ x+1 & x-2 & x+1 \\ 3x & 3x & 3x \end{vmatrix} = 3x \begin{vmatrix} x-2 & x+1 & x+1 \\ x+1 & x-2 & x+1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$
 $= 3x \begin{vmatrix} -3 & 0 & x+1 \\ 0 & -3 & x+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 27x$; (am adunat liniile la ultima linie; am dat factor comun și am scăzut

ultima coloană din precedentele două). Obținem $x = 0$.

c) Avem $AB = O_3 = BA$, deci matricele comută. Cu binomul lui Newton, $(A+B)^n = A^n + C_n^1 A^{n-1} B + \dots + C_n^{n-1} A B^{n-1} + B^n = A^n + B^n$, termenii intermediari fiind nuli.

2. a) $f = X(X^2 - 1) - 1$, deci restul împărțirii lui f la $X^2 - 1$ este polinomul $r = -1$.

b) Dacă x_k este rădăcină a polinomului f , $k = 1, 2, 3$, atunci $x_k^3 - x_k - 1 = 0 \Leftrightarrow x_k^3 = x_k + 1$, de unde rezultă că $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = x_1 + x_2 + x_3 + 3 = 3$

c) $f(x_1 + x_2) = f(-x_3) = -x_3^3 + x_3 - 1 = -(x_3^3 - x_3 - 1) - 2 = -f(x_3) - 2 = -2$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$. b) $f''(x) = e^x + \frac{1}{(x+1)^2}$, $\forall x > -1$, deci f este convexă.

c) Funcția f' este strict crescătoare, deoarece $f'' > 0$. Cum $f'(0) = 0$, rezultă tabelul de variație:

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	-----	0	+++++
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

Deoarece $f(0) = 0$, rezultă $f(x) \geq 0$, $\forall x > -1$.

2. a) $\int_1^2 f(x) dx = \ln(x+1) \Big|_1^2 - \ln x \Big|_1^2 = \ln 3 - \ln 2 - \ln 2 + \ln 1 = \ln 3 - \ln 4 = \ln \frac{3}{4}$.

b) $\int_1^{\sqrt{3}} f(x^2) dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+1} dx - \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2} = \arctg x \Big|_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{x} \Big|_1^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{\sqrt{3}} - 1$.

c) $\int_a^1 f(x) dx = \ln(x+1) \Big|_a^1 - \ln x \Big|_a^1 = \ln(a+1) - \ln \frac{1+a}{a} - \ln a + \ln \frac{1}{a} = \ln a - \ln a - \ln a = -\ln a$. Rezultă $\ln a = 1$, deci $a = e$.

Testul 24

Subiectul I

1. $\frac{1}{\sqrt{2}-2} = \frac{2+\sqrt{2}}{2-4} = -\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \in (-2, -1)$, deci $\left[\frac{1}{\sqrt{2}-2}\right] = -2$. 2. $x_v = -\frac{m}{2} \Rightarrow -\frac{m}{2} = 2 \Rightarrow m = -4$.

3. $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 4. Sunt 7 termeni, cel din mijloc este $T_4 = C_6^3 \cdot 1^3 (\sqrt[3]{2})^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 2 = 40$.

5. $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j}$; $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$. 6. $\tg^2 a = \frac{\sin^2 a}{\cos^2 a} = \frac{\sin^2 a}{1 - \sin^2 a} = \frac{0,36}{0,64} = \frac{9}{16}$.

Subiectul II

1. a) $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{rang} A^2 = 1$.

b) Avem $(I_3 - A)(I_3 + A + A^2) = I_3 + A + A^2 - A - A^2 - A^3 = I_3 - A^3 = I_3$, deoarece $A^3 = O_3$.

c) Inversa matricei $I_3 + A$ este $I_3 - A + A^2$, deoarece $(I_3 + A)(I_3 - A + A^2) = I_3 + A^3 = I_3$.

2. a) $f_1 = X^2 + X + 1$. Avem $\Delta = -3$ și $x_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

b) $f_2 = X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1) = f_1(X^2 - X + 1)$. Câtul este $X^2 - X + 1$.

c) f_1 divide $f_n \Leftrightarrow f_n(x_1) = 0$, deoarece $f_n \in \mathbb{R}[X]$ și $x_2 = \bar{x}_1$. Cum $x_1^3 = 1$, avem:

$$f_n(x_1) = x_1^{2n} + x_1^n + 1 = \begin{cases} x_1^2 + x_1 + 1 = 0, & \text{dacă } n = 3k + 1, k \in \mathbb{N} \\ x_1 + x_1^2 + 1 = 0, & \text{dacă } n = 3k + 2, k \in \mathbb{N} \\ 1 + 1 + 1 \neq 0, & \text{dacă } 3 \text{ divide } n \end{cases}$$

Cerința este demonstrată.

Subiectul III

1. a) $a_{2^{n+1}} - a_{2^n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) = \frac{1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}}$. Ultima sumă are

2^n termeni, fiecare mai mare decât $\frac{1}{2^{n+1}}$, deci $a_{2^{n+1}} - a_{2^n} \geq 2^n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$, $\forall n \geq 1$.

b) $a_{2^n} = (a_{2^n} - a_{2^{n-1}}) + (a_{2^{n-1}} - a_{2^{n-2}}) + \dots + (a_{2^2} - a_{2^1}) + a_2 \geq \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{n-1 \text{ ori}} + 1 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}$, $\forall n \geq 1$.

c) Avem $n = 2^{\log_2 n} \geq 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}$, deci $a_n \geq a_{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}} \geq 1 + \frac{\lfloor \log_2 n \rfloor}{2} \geq 1 + \frac{\log_2 n - 1}{2} = \frac{1 + \log_2 n}{2}$, $\forall n \geq 4$, deoarece șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \log_2 n = \infty$, rezultă că $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

2. a) De exemplu $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \arctg x$.

b) $\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2}\right)' \arctg x \, dx = \frac{x^2}{2} \arctg x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) \, dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \arctg x \Big|_0^1 = \frac{\pi-2}{4}$.

c) $\int_0^1 x^3 f'(x) \, dx = x^3 f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x^3)' f(x) \, dx = \frac{1}{2} - 3 \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} - 3 \left(1 - \arctg x\right) \Big|_0^1 = \frac{3\pi-10}{4}$.

Testul 25

Subiectul I

1. Avem $10^{18} \cdot 7 = 7$, deci $100^{18} \cdot 7 = (10^{18})^2 = 49 \in \mathbb{N}$. 2. Punctul de maxim este abscisa vârfului $x_v = -\frac{2}{2(-1)} = 1$. 3. $f(x) = f(y) \Leftrightarrow x^3 + 1 = y^3 + 1 \Leftrightarrow x^3 - y^3 = 0 \Leftrightarrow (x-y)(x^2 + xy + y^2) = 0 \Leftrightarrow x = y$ sau $x^2 + xy + y^2 = 0$. Cum $x^2 + xy + y^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2(x+y)^2 = 0 \Rightarrow x = y = 0$, rezultă cerința. Alternativ, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, deci f strict crescătoare. 4. $C_{10}^2 - 10 = 45 - 10 = 35$.

5. $BC: \frac{y-3}{x-2} = \frac{5-3}{-1-2} \Leftrightarrow 2x + 3y - 13 = 0$. Distanța este $\frac{|3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 13|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{8}{\sqrt{13}}$.

6. $2R = \frac{AB}{\sin C} = \frac{10}{\sqrt{3}} \Rightarrow R = \frac{5}{\sqrt{3}}$.

Subiectul II

1. a) $\det A = 1$. b) $B \neq O_{2,3}$ și liniile lui B sunt proporționale $\Rightarrow \text{rang } B = 1$.

c) Avem $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, deci $X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

2. a) $z_1 z_2 z_3 = -(-1) = 1$.

b) Cum $|z_1| \cdot |z_2| \cdot |z_3| = 1$ și $|z_1|, |z_2|, |z_3| \geq 1$, rezultă $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$.

c) Polinomul are coeficienți reali și grad impar, deci are cel puțin o rădăcină reală, de modul 1, adică 1 sau -1. Cum $f(0) = -1 < 0$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ rezultă $f(1) = 0 \Rightarrow 1 + a + b - 1 = 0 \Leftrightarrow a + b = 0$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$. b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \ln x\right) = \infty + \infty = \infty$.

c) Deoarece $f' < 0$, funcția este strict descrescătoare, deci injectivă. Cum $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ și $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, din continuitatea lui f rezultă că imaginea funcției este \mathbb{R} , deci funcția f este surjectivă. Ca urmare, există un unic $c \in (0, \infty)$ astfel încât $f(c) = 0 \Leftrightarrow c \cdot \ln c = 1$.

2. a) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \, dx = -\sqrt{4-x^2} \Big|_0^1 = -\sqrt{3} + 2$.

b) $\int_0^1 f(x) \cdot \arcsin \frac{x}{2} \, dx = \int_0^1 \left(\arcsin \frac{x}{2}\right)' \cdot \arcsin \frac{x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \arcsin^2 \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6}\right)^2 = \frac{\pi^2}{72}$.

c) Cu schimbarea de variabilă $t = -x$, $dt = -dx$, avem $\int_1^0 f(x^2) \, dx = -\int_0^1 f((-t)^2) \, dt = \int_0^1 f(t^2) \, dt$.

Testul 26

Subiectul I

1. Fie $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$. Avem $a + bi + 2(a - bi) = 9i \Leftrightarrow 3a = 0$ și $-b = 9 \Leftrightarrow a = 0$, $b = -9$, deci $z = -9i$.

2. $x^2 - 3x + 2 = x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = 0$. Cum $\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$, rezultă cerința.

3. $3 + 2\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^2$, deci $x = 2$. 4. Sunt $2^5 = 32$ submulțimi ale lui M și $C_5^3 = 10$ cu 3 elemente.

Probabilitatea este $\frac{10}{32} = \frac{5}{16}$. 5. $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \Rightarrow x_C = 4$; $y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \Rightarrow y_C = 3$.

6. $\text{tg}\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\text{tg } a + \text{tg } \pi/3}{1 - \text{tg } a \text{tg } \pi/3} = \frac{\frac{1}{2} + \sqrt{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1 + 2\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 8 + 5\sqrt{3}$.

Subiectul II

1. a) $\det(A + tA) = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4$. b) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

c) Fie $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; avem $AB = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a & b \end{pmatrix}$ și $BA = \begin{pmatrix} a+b & a \\ c+d & c \end{pmatrix}$, deci $b = c$ și $a = b + d$. Atunci

$B = \begin{pmatrix} b+d & b \\ b & d \end{pmatrix}$ și $\det B = d^2 + bd - b^2$. Dacă $\det B = 0$, arătăm că $b = d = 0$, adică $B = O_2$. Presupunem

că $d^2 - db - b^2 = 0$. Ca ecuație în d , discriminantul este $\Delta = 5b^2$, deci $d = \frac{b \pm \sqrt{5} \cdot b}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \cdot b$. Cum

$b, d \in \mathbb{Q}$, deducem $b = d = 0$. În concluzie $\text{rang } B \neq 1$.

2. a) Fie $t \in M$ și $x \in \mathbb{R}$. Avem $f(x-t) = f(x-t+t) = f(x)$, deci $-t \in M$.

b) Fie $t_1, t_2 \in M$ și $x \in \mathbb{R}$. Din $f(x) = f(x+t_1) = f(x+t_1-t_2)$ rezultă $t_1 - t_2 \in M$, deci $M \leq (\mathbb{R}, +)$.

c) De exemplu, funcția parte fracționară.

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctg x}{x^2 + x + 1} = \frac{\pi/4}{3} = \frac{\pi}{12}$. b) $f'(x) = \arctg x + \frac{x-1}{x^2+1}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x} \arctg x = \frac{\pi}{2}$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(x) - \frac{\pi}{2}x\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\arctg x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.

Deoarece $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctg x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} = -1$, rezultă că $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(x) - \frac{\pi}{2}x\right) = -1 - \frac{\pi}{2}$,

deci dreapta de ecuație $y = \frac{\pi}{2}x - 1 - \frac{\pi}{2}$ este asimptotă oblică a graficului către $+\infty$.

$$2. a) \int_0^1 \frac{x^2}{x^2+4} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{4}{x^2+4}\right) dx = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} \Big|_0^1 = 1 - 2 \arctg \frac{1}{2}.$$

$$b) \int_0^1 \frac{x^3}{x^4+2} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{(x^4+2)'}{x^4+2} dx = \frac{1}{4} \ln(x^4+2) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \ln \frac{3}{2}.$$

$$c) a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 4} = \sigma(f, \Delta_n, \xi), \text{ adică suma Riemann asociată funcției } f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2+4},$$

diviziunii $\Delta_n = \left(0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n}{n} = 1\right)$ și sistemului de puncte intermediare $\xi_k^n = \frac{k}{n}, k = \overline{1, n}$. Așadar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 f(x) dx, \text{ deci șirul e convergent.}$$

Testul 27

Subiectul I

$$1. a_2 = 2, a_5 = 16, \Rightarrow q^3 = \frac{a_5}{a_2} = 8 \Rightarrow q = 2. \quad 2. \frac{p}{q} + \frac{q}{p} = \frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{(p+q)^2 - 2pq}{pq} = \frac{36-6}{3} = 10.$$

3. $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 4. Sunt $2^6 = 64$ de submulțimi. Nu convin cele formate doar cu numere pare, și anume submulțimile mulțimii $\{2, 4, 6\}$. Acestea sunt $2^3 = 8$, deci rămân $64 - 8 = 56$ de submulțimi. 5. $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 4 \cdot 4 \cdot \cos \widehat{BAC} = 16 \cdot \cos 60^\circ = 16 \cdot \frac{1}{2} = 8.$

$$6. \text{ Avem } \sin^2 a = \frac{\sin^2 a}{\sin^2 a + \cos^2 a} = \frac{\frac{\sin^2 a}{1 + \tan^2 a}}{\frac{1}{1 + \tan^2 a}} = \frac{1/9}{1 + 1/9} = \frac{1}{10}.$$

Subiectul II

1. a) $A \neq O_3$ și liniile lui A sunt proporționale $\Rightarrow \text{rang } A = 1$.
b) Avem $A^2 = 14A$. Prin inducție, $A^{n+1} = A^n \cdot A = (14^{n-1}A)A = 14^{n-1}A^2 = 14^{n-1} \cdot 14A = 14^n A$.
c) Deoarece $(I_3 - A) \left(I_3 - \frac{1}{13}A \right) = I_3 - A - \frac{1}{13}A + \frac{1}{13}A^2 = I_3 - A - \frac{1}{13}A + \frac{14}{13}A = I_3$, concluzia rezultă.
2. a) $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} + 2 + a\sqrt{2} + b = (b+2) + (a+2)\sqrt{2} = 0$. Dar $a, b \in \mathbb{Z}$ și $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, deci $a = b = -2$.
b) $f(1) = 0 \Rightarrow 2 + a + b = 0, f' = 3x^2 + 2x + a$, deci $f'(1) = 0 \Rightarrow 5 + a = 0$. Obținem $a = -5$ și $b = 3$.
c) Dacă r este rădăcină triplă, din $x_1 + x_2 + x_3 = -1$ rezultă $r = -\frac{1}{3}$. Atunci $b = -x_1x_2x_3 = \frac{1}{27} \notin \mathbb{Z}$, contradicție cu $b \in \mathbb{Z}$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x} + 1 = \frac{2 \ln x - 1}{x} + 1$, deci $f'(1) = 0$.
b) Avem $f''(x) = \frac{2 \cdot x - (2 \ln x - 1)}{x^2} = \frac{3 - 2 \ln x}{x^2}$ și $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = e^{3/2}$.
c) Avem $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln x - 1}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 1$. Studiem tabloul de variație al funcției f' :

x	0	1	$e^{3/2}$	$+\infty$
$f''(x)$	+	+	+	+

și respectiv, tabloul de variație al funcției f

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	+	+	+

$$f'(x) \Big|_{-\infty} \nearrow 0 \nearrow (\max) \searrow 1 \quad f(x) \Big|_{-\infty} \searrow 0 \nearrow 1$$

Așadar, $x = 1$ este singurul punct de extrem (minim) al funcției f .

$$2. a) I_1 = \int_0^1 \frac{x}{(x+1)^2} dx = \int_1^2 \frac{t-1}{t^2} dt = \left(\ln t + \frac{1}{t} \right) \Big|_1^2 = \ln 2 + \frac{1}{2} - 1 = \ln 2 - \frac{1}{2}, \text{ cu schimbare de variabile } t = x+1, dt = dx.$$

$$b) I_{n+2} + 2I_{n+1} + I_n = \int_0^1 \frac{x^n(x^2+2x+1)}{(x+1)^2} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

$$c) \text{ Avem } I_n \geq 0, \text{ deoarece } \frac{x^n}{(x+1)^2} \geq 0, \forall x \in [0, 1] \text{ și } n \geq 1. \text{ Atunci } 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}, \text{ de unde } \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0.$$

Testul 28

Subiectul I

1. $z = \frac{(1+i)^2}{1-i^2} = \frac{1-2i-1}{2} = -i$, deci $\text{Re } z = 0$. 2. $x_1 + x_2 = 5, x_1x_2 = 2$, deci $x_1 + x_2 - x_1x_2 = 3$.
3. $f(x) = f(y) \Leftrightarrow x^2 + x = y^2 + y \Leftrightarrow (x_1 - y)(x + y + 1) = 0 \Leftrightarrow x = y$, deoarece $x + y + 1 > 0$ pentru orice $x, y \in [0, 1]$. 4. $C_{100}^{50} = \frac{100!}{50! \cdot 50!}$; $2 C_{99}^{50} = 2 \cdot \frac{99!}{49! \cdot 50!} = \frac{100!}{50! \cdot 49! \cdot 50!} = \frac{100!}{50! \cdot 50!}$, ceea ce trebuia arătat.
5. $|\overline{DA} + \overline{AB}| = |\overline{DB}| = DB = 2$. 6. Avem $x = \frac{5\pi}{6}$, deci $\text{tg } 2x = \text{tg } \frac{5\pi}{3} = \text{tg} \left(2\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\text{tg } \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$.

Subiectul II

$$1. a) \Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \cdot \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 1 & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

b) Deoarece a, b, c sunt distincte, rezultă că numerele $b-a, c-a$ și $c-b$ sunt nenule și deci $\Delta \neq 0$. Cerința rezultă din teorema lui Cramer.

c) Polinomul $f(t) = x + ty + t^2z - t^3$ are rădăcinile distincte a, b, c . Din relațiile lui Viète rezultă $z = a + b + c, y = -ab - bc - ca, x = abc$.

2. a) Avem soluțiile $x = \hat{3}$ și $x = \hat{9}$.

b) Dacă $x^2 = \hat{1}$, atunci $x \in U(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}$. Toate cele 4 numere verifică ecuația.

c) Dacă $x^{11} = \hat{1}$, atunci $x \in U(\mathbb{Z}_{12})$, deci $x^2 = \hat{1}$. Atunci $x^{10} = \hat{1}$, deci $x^{11} = \hat{1} \Leftrightarrow x^{10} \cdot x = \hat{1} \Leftrightarrow x = \hat{1}$.

Subiectul III

1. a) Funcția f e continuă, deci nu are asimptote verticale, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, deci dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală a graficului spre $\pm\infty$.

b) $f'(x) = m \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, deci $f'(0) = m$. Rezultă $m = 1$.

c) Avem $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Pentru $m > 0$, alcătuim tabloul de variație al funcției f :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	---	0	++	---
$f(x)$	0	$\searrow -\frac{m}{2}$	$\nearrow \frac{m}{2}$	0

Din tabel, deducem că $|f(x)| \leq \frac{|m|}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$,

deci valorile căutate sunt $m \in [-2, 2]$.

$$2.a) F(1) = \int_0^1 f(t) dt = \left(\frac{t^3}{3} + e^t \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + e - 1 = e - \frac{2}{3}.$$

b) Avem $F(x) = \left(\frac{t^2}{2} + e^t \right) \Big|_0^x = e^x + \frac{x^2}{2} - 1$. $F' = f > 0$, deci F este strict crescătoare; $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$, deci $F(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Funcția F este injectivă și surjectivă, deci este inversabilă.

c) Cu schimbarea de variabilă $t = F^{-1}(x)$ avem $x = F(t)$, $dx = f(t) dt$, $F^{-1}(0) = 0$ și $F^{-1}\left(e - \frac{2}{3}\right) = 1$, deci

$$\int_0^{e-\frac{2}{3}} F^{-1}(x) dx = \int_{F^{-1}(0)}^{F^{-1}\left(e-\frac{2}{3}\right)} t f(t) dt = \int_0^1 t f(t) dt = \int_0^1 t^3 dt + \int_0^1 t e^t dt = \frac{1}{4} + t e^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt = \frac{1}{4} + e - e^1 \Big|_0^1 = \frac{5}{4}.$$

Testul 29

Subiectul I

1. $\sqrt[3]{64} = 4$, $\lg 100 = 2$ și $\sqrt{17} > \sqrt{16} = 4$, deci $\lg 100 < \sqrt[3]{64} < \sqrt{17}$.

2. $\Delta = 3^2 - 4 \cdot 4 < 0$, deci $4x^2 + 3x + 1 > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. 3. $x + 1 = \lg \frac{\pi}{4} \Rightarrow x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0$.

4. $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$, deci $2n + 270 = n^2 - n \Leftrightarrow n(n-3) = 18 \cdot 15$, de unde $n = 18$.

5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = -1 < 0$, deci unghiul vectorilor este obtuz.

6. $m_a^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4} = \frac{25 + 49}{2} - \frac{36}{4} = 37 - 9 = 28$, deci $m_a = 2\sqrt{7}$.

Subiectul II

1.a) $\det A(x) = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

b) $A(x)A(y) = \begin{pmatrix} \cos x \cos y - \sin x \sin y & -\sin y \cos x - \sin x \cos y & 0 \\ \sin y \cos x + \sin x \cos y & \cos x \cos y - \sin x \sin y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(x+y) & -\sin(x+y) & 0 \\ \sin(x+y) & \cos(x+y) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A(x+y)$.

c) Cum $A(x) \cdot A(-x) = A(x-x) = A(0) = I_3$, atunci $(A(x))^{-1} = A(-x)$, $x \in \mathbb{R}$, deci $\left(A\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^{-1} = A\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

2.a) Ecuația se scrie $x(2x^2 + x - 13) = 0$. Rezultă $x_1 = 0$ și $2x^2 + x - 13 = 0$; $x_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{105}}{4}$.

b) $m_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{-13}{2} = \frac{1}{4} + 13 = \frac{53}{4}$.

c) Cum $x_1x_2x_3 = -\frac{m}{2}$, rezultă $x_3 = -\frac{m}{2}$, de unde $-\frac{m^3}{4} + \frac{m^2}{4} + \frac{13m}{2} + m = 0$, adică $-m^3 + m^2 + 30m = 0$. Obținem $m_1 = 0$ sau $m^2 - m - 30 = 0$, de unde $m_2 = -5$ și $m_3 = 6$. Cazul $m = 0$ nu convine, conform lui a). Dacă $m = -5$, avem $x_3 = -\frac{5}{2}$ și $2x^3 + x^2 - 13x - 5 = (2x - 5)(x^2 + 3x + 1)$, rădăcinile polinomului $x^2 + 3x + 1$ satisfac $x_1x_2 = 1$. Dacă $m = 6$, avem $x_3 = -3$ și $2x^3 + x^2 - 13x - 5 = (x + 3)(2x^2 - 5x + 2)$, cu aceeași remarcă.

Subiectul III

1.a) Avem $f'(x) = -\frac{1}{x(x+1)} < 0$, $\forall x > 0$, deci f este strict descrescătoare pe $(0, \infty)$.

b) Dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală, deoarece $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, iar dreapta $x = 0$ este asimptotă verticală, întrucât $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$. Fiind continuă pe $(0, \infty)$, f nu admite alte asimptote verticale.

c) $f(1) + f(2) + \dots + f(n) = \ln\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (f(1) + f(2) + \dots + f(n)) = \infty$.

2.a) $\int \ln x dx = x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x(\ln x)' dx = e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$.

b) $\int e^x f'(x) dx = e^x f(x) \Big|_1^e - \int_1^e (e^x)' f(x) dx = e^e - \int_1^e e^x f(x) dx \Rightarrow \int_1^e e^x (f(x) + f'(x)) dx = e^e$.

c) $\int f(x) dx = x \ln x \Big|_t^1 - \int_t^1 dx = -t \ln t - (1 - t) = -1 + t - t \ln t$. Cum $\lim_{t \rightarrow 0} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = 0$, rezultă $\lim_{t \rightarrow 0} (-1 + t - t \ln t) = -1$.

Testul 30

Subiectul I

1. $|z| = \sqrt{9+16} = 5$. 2. Rezolvăm ecuația $f(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$ și $x_2 = 2$. Punctele de

intersecție sunt $A(1, 0)$ și $B(2, 0)$. 3. Avem $\log_{25} 2x = \frac{\log_5 2x}{\log_5 25} = \frac{1}{2} \log_5 2x$, deci ecuația se scrie:

$2 \log_5 x = \log_5 2x \Leftrightarrow \log_5 x^2 = \log_5 2x \Leftrightarrow x^2 = 2x$, deci $x = 2$, ținând cont că $x > 0$. 4. $C_7^3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 35$;

$A_6^2 = 6 \cdot 5 = 30 \Rightarrow C_7^3 - A_6^2 = 5$. 5. Panta dreptei d_1 este $m_1 = 1/2$. Panta dreptei d_2 este $m_2 = -a$. Din $m_1 = m_2$ obținem $a = -\frac{1}{2}$. 6. Din $\sin x + \cos x = 1$ rezultă $\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \sin 2x = 0$.

Subiectul II

1.a) $\det A = 3(1-a)$. b) Pentru $a \neq 1$, $\text{rang } A = 3$. Dacă $a = 1$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ implică $\text{rang } A = 2$. Deci $a = 1$.

c) $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

2.a) $f = X^2(X^2 + 1) - X + 1 = g \cdot (X^2 + 1) - X + 1$. Restul împărțirii lui f la g este $-X + 1$.

b) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \frac{x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4}{x_1x_2x_3x_4} = \frac{1}{1} = 1$.

c) Pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$, avem $\alpha^2 - \alpha + 1 > 0$, deci $f(\alpha) = \alpha^4 + (\alpha^2 - \alpha + 1) > 0$. Ca urmare, f nu are nicio rădăcină reală.

Subiectul III

1.a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1 = f(1)$, de unde rezultă cerința.

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{2(x-1)} = -\frac{1}{2}$. De aici rezultă și că f este derivabilă în $x = 1$.

c) Avem $f'(x) = \frac{x-1-x \ln x}{(x-1)^2}$, $\forall x \neq 1, x > 0$, și $f'(1) = -\frac{1}{2}$. Considerăm funcția $g: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $g(x) = x - 1 - x \ln x$. Avem $g'(x) = -\ln x$ și, din tabloul de variație alăturat, deducem că $g(x) < 0$ pentru orice $x \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ și, în consecință, $f'(x) < 0, \forall x > 0$.

2. a) $\int_0^1 x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$, deci $g \in M$. b) $\int_0^1 h(x) \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + a = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + a$; $h \in M \Leftrightarrow a = -\frac{1}{3}$.

c) Fie $f \in M$. Atunci $\int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{2} = \int_0^1 x \, dx \Rightarrow \int_0^1 (f(x) - x) \, dx = 0$. Conform teoremei de medie, există $c \in [0, 1]$ astfel încât $f(c) - c = 0$, ceea ce trebuia arătat.

Testul 31

Subiectul I

1. Avem $a = (2^{10})^{1/3} = 2^{10/3}$, $b = 4^{1/3} = 2^{2/3}$ și $ab = 2^{12/3} = 2^4$. Cum $c = \sqrt{4} = 2$, avem $ab = c^4$. 2. Cum f este strict crescătoare, $\text{Im } f = [f(1), f(2)] = [3, 5]$. 3. $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{2}{5}\right)^{-x-1} \Rightarrow x = -x-1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$.

4. Fie n numărul elementelor lui M . Avem 2^{n-1} submulțimi de cardinal impar, deci $2^{n-1} = 32 \Rightarrow n = 6$.

5. $\overline{AB} + \overline{AC} = 2 \overline{AD}$, D fiind mijlocul laturii BC . Cum $AD = AB \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$, rezultă

$|\overline{AB} + \overline{AC}| = 3$. 6. $\sin(x + \pi) = -\sin x \Rightarrow \sin x \sin(x + \pi) = -\sin^2 x \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Subiectul II

1. a) $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = O_3$. b) $A \cdot A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $\text{rang } AA' = 2$.

c) Dacă există $B \in M_3(\mathbb{C})$ cu $B^2 = A$, atunci $AB = BA$, deoarece $AB = B^2 \cdot B = B^3 = B \cdot B^2 = BA$. Notând

$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ u & v & t \end{pmatrix}$, avem $AB = \begin{pmatrix} x & y & z \\ u & v & t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & x & y \\ 0 & u & v \end{pmatrix}$, deci $x = u = v = 0$, $a = y = t$, $b = z \Rightarrow$

$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$. Avem $\det A = 0 \Rightarrow \det B^2 = 0 \Rightarrow \det B = 0 \Rightarrow a = 0$. Obținem $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq A$.

2. a) Suma coeficienților polinomului este $f(1) = (1-2)^{10} - 1 - 2 = -2$.

b) Polinomul are gradul 100, iar coeficientul lui X^{99} este 0, deci suma rădăcinilor este 0.

c) $f = (g + X)^{10} - X - 2 = g^{10} + C_{10}^1 g^9 X + \dots + C_{10}^9 g X^9 + X^{10} - X - 2 = g \cdot (g^9 + C_{10}^1 g^8 X + \dots + C_{10}^9 X^9 + 1)$ deci $g \mid f$.

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0$.

b) Avem $f'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = (1-x)e^{-x}$. Derivata se anulează

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	++	++	0
$f(x)$	$-\infty$	\nearrow	\searrow
		$\frac{1}{e}$	0

în $x = 1$; din tabelul de variație alăturat, rezultă cerința.

c) Prin inducție, cum $f'(x) = (-1)^1(x-1)e^{-x}$ și $f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)}(x))' = (-1)^n e^{-x} - (-1)^n(x-n)e^{-x} = (-1)^{n+1}(x-(n+1))e^{-x}$, rezultă concluzia.

2. a) $I_2 = \int_0^1 \frac{x^2}{2x+3} \, dx = \int_0^1 \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{4} + \frac{9}{4(2x+3)} \right) \, dx = \left(\frac{x^2}{4} - \frac{3x}{4} + \frac{9}{8} \ln(2x+3) \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} + \frac{9}{8} \ln \frac{5}{3}$.

b) $2I_{n+1} + 3I_n = \int_0^1 \frac{x^n(2x+3)}{2x+3} \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

c) Deoarece $0 \leq x \leq 1$, avem $0 \leq \frac{x^{n+1}}{2x+3} \leq \frac{x^n}{nx+3} \Rightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n$. Atunci $5I_n \geq 2I_{n+1} + 3I_n \geq 5I_{n+1} \Rightarrow 5I_n \geq \frac{1}{n+1} \geq 5I_{n+1} \Rightarrow \frac{n}{5(n+1)} \leq nI_n \leq \frac{1}{5} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} nI_n = \frac{1}{5}$.

Testul 32

Subiectul I

1. $|z| = \frac{2}{|1+i|} = \frac{2}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{2}$. 2. Avem $f(x) = y \Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0$, de unde $x = -2$ și $x = 3$. Punctele sunt

$A(-2, -2)$ și $B(3, 3)$. 3. $\log_3 3 = \frac{1}{2}$; $\log_x 2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x^{1/2} = 2 \Rightarrow x = 4$. 4. Suma este $(1+1)^{10} = 2^{10}$, sau

$C_{10}^0 + C_{10}^1 + \dots + C_{10}^{10} = 2^{10}$. 5. Ecuația dreptei BC este $\frac{y-1}{2-1} = \frac{x-1}{3-1} \Leftrightarrow x-1 = 2(y-1) \Leftrightarrow x-2y+1=0$.

Înălțimea din A are lungimea $\frac{|1-2 \cdot 0+1|}{\sqrt{1+4}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 6. Cum $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$, rezultă $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Subiectul II

1. a) Fie $X = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$, $x, y \in \mathbb{R}$. Avem $AX = \begin{pmatrix} 6x & 6y+4x \\ 0 & 6x \end{pmatrix} = XA$.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 36 & 48 \\ 0 & 36 \end{pmatrix}$, $12A = \begin{pmatrix} 72 & 48 \\ 0 & 72 \end{pmatrix}$, $36I_2 = \begin{pmatrix} 36 & 0 \\ 0 & 36 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 - 12A + 36I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_2$.

c) Avem $B \in M$, deoarece $AB = (B^2 + B)B = B^3 + B^2 = B(B + B^2) = BA$, deci $\exists x, y \in \mathbb{R}$, $B = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$.

Rezultă $B^2 = \begin{pmatrix} x^2 & 2xy \\ 0 & x^2 \end{pmatrix}$, $B^2 + B = \begin{pmatrix} x^2+x & 2xy+y \\ 0 & x^2+x \end{pmatrix}$, adică $x^2 + x = 6$, $2xy +$

$+y = 4$. Obținem $x = 2$, $y = \frac{4}{5}$ și $B = \begin{pmatrix} 2 & 4/5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, apoi $x = -3$, $y = -\frac{4}{5}$ și $B = \begin{pmatrix} -3 & -4/5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

2. a) Fie $x, y \in M \Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Q}$ cu $x = \cos p\pi + i \sin p\pi$, $y = \cos q\pi + i \sin q\pi \Rightarrow xy = \cos(p+q)\pi + i \sin(p+q)\pi$. Cum $p+q \in \mathbb{Q}$, rezultă $xy \in M$.

b) Înmulțirea este asociativă, elementul neutru este $1 = \cos 0 \cdot \pi + i \sin 0 \cdot \pi \in M$ (pentru că $0 \in \mathbb{Q}$), iar inversul elementului $x \in M$ este $x^{-1} = \frac{1}{x} = \cos p\pi - i \sin p\pi = \cos(-p)\pi + i \sin(-p)\pi \in M$ (pentru că

$p \in \mathbb{Q}$). De aici rezultă cerința.

c) Fie $p, q \in \mathbb{Q}$. Avem de demonstrat că $f(p+q) = f(p) \cdot f(q)$, ceea ce revine la identitatea $\cos(p+q)\pi + i \sin(p+q)\pi = (\cos p\pi + i \sin p\pi)(\cos q\pi + i \sin q\pi)$.

Subiectul III

1. a) Evident $x_1 = \frac{9}{2} \geq 4$; $x_{n+1} = (x_n - 4)^2 + 4 \geq 4$, $\forall n \geq 1$, deci $x_n \geq 4$, $\forall n \geq 1$.

b) $x_{n+1} - x_n = x_n^2 - 8x_n + 20 - x_{n-1}^2 + 8x_{n-1} - 20 = (x_n - x_{n-1})(x_n + x_{n-1} - 8)$, $n \geq 2$. Cum $x_n + x_{n-1} - 8 \geq 0$, rezultă că $x_{n+1} - x_n$ are același semn cu $x_n - x_{n-1}$, deci, inductiv, cu $x_2 - x_1$.

Cum $x_2 = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 + \frac{1}{4} < \frac{9}{2} = x_1$ rezultă $x_{n+1} - x_n \leq 0$, $\forall n \geq 1$.

c) Conform teoremei lui Weierstrass, șirul este convergent. Notăm $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Trecând la limită obținem $l^2 - 9l + 20 = 0 \Rightarrow l = 4$ sau $l = 5$. Însă $x_n \leq x_1 = \frac{9}{2} \Rightarrow l \leq \frac{9}{2} \Rightarrow l = 4$.

2. a) Derivata primitivei este $f' > 0$, deci primitiva este strict crescătoare, de unde rezultă injectivitatea.

b) Cu schimbarea de variabilă $t = \sin x$, $dt = \cos x dx$ avem $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \arctg(\sin x) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$.

c) Avem $\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$, deci $f(x) = \frac{1 + \tan^2 x}{1 + 2 \tan^2 x}$. Atunci

$$\int_0^{\pi/4} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{(\tan x)'}{\tan^2 x + \frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{dt}{t^2 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctg(t\sqrt{2}) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctg \sqrt{2}.$$

Testul 33

Subiectul I

1. $x = \frac{6+8+9}{12} = \frac{23}{12} = 1 + \frac{11}{12} \Rightarrow \{x\} = \frac{11}{12}$. 2. Avem $x^2 + x - 12 = (x-3)(x+4) > 0$, deci $x \in (-4, 3)$.

3. Fie $y \in [3, 4]$. Ecuația $f(x) = y$ se scrie $x = 5 - y$ și are soluție unică în intervalul $[1, 2]$, de unde rezultă cerința.

4. $T_{k+1} = C_9^k (x^{1/2})^{9-k} \cdot \left(\frac{1}{k}\right)^k = C_9^k x^{\frac{9-3k}{2}}$. Atunci $9 - 3k = 0 \Rightarrow k = 3 \Rightarrow T_4 = C_9^3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 84$.

5. Avem $3\overline{AB} = 2\overline{AC} + \overline{AD} \Rightarrow 2(\overline{AB} - \overline{AC}) = \overline{AD} - \overline{AB} \Rightarrow 2\overline{CB} = \overline{BD} \Rightarrow B, C, D$ coliniare.

6. $\sin^2 a + \cos^2 a = 1 \Rightarrow \sin^2 a = \frac{8}{9} \Rightarrow \sin a = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \sin 2a = 2 \sin a \cos a = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$, deoarece $\sin a > 0$.

Subiectul II

1. a) $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ a & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 5a + 4$. b) Avem $1 - 1 = 0$, $a + 2 = 1$, $-1 - 1 = b$, deci $a = -1$, $b = -2$.

c) Dacă $\Delta \neq 0$, sistemul este compatibil determinat, deci este necesar $a = -\frac{4}{5}$. Cum minorul

$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3$ este nenul, rangul matricei sistemului este 2. Impunem ca minorul caracteristic să fie

$$\text{nul: } \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & b \end{vmatrix} = 4b + 3 + 2 - b = 3b + 5 \Rightarrow b = -\frac{5}{3}.$$

2. a) Fie $X, Y \in M \Rightarrow$ există $a, b \in (-1, \infty)$ astfel încât $X = \begin{pmatrix} 1+2a & a \\ -2a & 1-a \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 1+2b & b \\ -2b & 1-b \end{pmatrix}$.

$XY = \begin{pmatrix} 1+2(a+b+ab) & a+b+ab \\ -2(a+b+ab) & 1-2(a+b+ab) \end{pmatrix} \in M$, deoarece $ab + a + b = (a+1)(b+1) - 1 \in (-1, \infty)$.

b) Notând $U(a) = \begin{pmatrix} 1+2a & a \\ -2a & 1-a \end{pmatrix}$, am arătat că $U(a) \cdot U(b) = U(a+b+ab)$, $\forall a, b > -1$. Înmulțirea

este asociativă, are elementul neutru $I_2 = U(0) \in M$ (pentru că $0 > -1$), iar inversa matricei $U(a)$ este

$$U\left(-\frac{a}{1+a}\right) \in M, \text{ deoarece } -\frac{a}{1+a} > -1.$$

c) Observăm $f(a) = U(a-1)$. Funcția este inversabilă, deoarece $U(x) = U(y) \Leftrightarrow x = y$ și $a \in (0, \infty) \Leftrightarrow a-1 \in (-1, \infty)$. Funcția f este morfism, deoarece $f(ab) = U(ab-1)$ și $f(a) \cdot f(b) = U(a-1)U(b-1) = U(a-1+b-1+(a-1)(b-1)) = U(ab-1)$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2-2)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+2}{(x+1)^2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2-x}{x+1} = -1$, deci $y = x - 1$ este asimptotă oblică

spre $+\infty$. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{-1}{+0} = -\infty$, deci $x = -1$ este asimptotă verticală. Funcția este continuă, deci nu mai

admite alte asimptote verticale.

c) Cerința revine la rezolvarea ecuației $f'(x) = 2$, $x \in (-1, \infty)$. Avem $x^2 + 2x + 2 = 2x^2 + 4x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = 0$.

2. a) $A + B = \int_0^{\pi/2} dx = \pi/2$. b) Cu schimbarea de variabilă $t = \frac{\pi}{2} - x$ avem $dt = -dx$ și

$$A = -\int_{\pi/2}^0 \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{\cos t + \sin t} dt = B.$$

c) Din punctele anterioare rezultă $A = \pi/4$.

Testul 34

Subiectul I

1. a) Avem $2^{ab} = (2^a)^b = 3^b = 4$, deci $ab = 2$. Căutam $a, b \in \mathbb{R}$ astfel că $f(x) = ax + b$, $x \in \mathbb{R}$. Avem

$f(0) = 2 \Rightarrow b = 2$; $f(4) = 4a + b = -4 \Rightarrow 4a = -6 \Rightarrow a = -\frac{3}{2}$. Atunci $f(x) = -\frac{3}{2}x + 2$ și $f(1) = \frac{1}{2}$.

3. $x + \frac{\pi}{4} = \arctg 1 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 4. Sunt 9 elemente în produsul cartezian. Verifică

perechile (2, 3) și (3, 2). Probabilitatea este $2/9$. 5. Panta dreptei date este $-\frac{1}{3}$. Panta perpendiculară

este 3 și ecuația este $y = 3x$.

$$6. \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2}, \text{ deci } A = 60^\circ.$$

Subiectul II

$$1. a) \det C = 1, C^{-1} = C^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}. \quad b) AC = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, CB = \begin{pmatrix} 14-a & 8-5 \\ 21-18 & 12-10 \end{pmatrix} = AC.$$

c) Pentru $n = 1$ și din $AC = CB$ obținem $B = C^{-1}AC$. Atunci $B^n = (C^{-1}AC)^n = C^{-1}AC \cdot C^{-1}AC \dots C^{-1}AC = C^{-1}A^nC, \forall n \geq 1$.

$$2. a) P = X^2(X^2 + 3X + 3) + X^2 + aX + b = (X^2 + 1)f + (a-3)X + b-3, \text{ deci } a = b = 3.$$

$$b) (x_1 - x_2)^2 + \dots + (x_3 - x_4)^2 = 3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2) - 2(x_1x_2 + \dots + x_3x_4) = 3(x_1 + \dots + x_4)^2 - 8(x_1x_2 + \dots + x_3x_4) = 3(-3)^2 - 8 \cdot 4 = -5.$$

c) Dacă toate rădăcinile ar fi reale, atunci $(x_1 + x_2)^2 + \dots + (x_3 - x_4)^2 \geq 0$, contradicție.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = e^x + 1 > 0$, deci f este strict crescătoare.

b) Avem $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Din continuitatea funcției f rezultă $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, deci f este surjectivă.

c) Din punctul a) rezultă bijectivitatea funcției f , deci f este inversabilă. Avem $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$, de unde, pentru că $f(0) = 2$ deducem $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$.

$$2. a) \int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x \Big|_0^{1/2} = \frac{\pi}{6}.$$

$$b) \text{ Notând } t = 1 - x^2, dt = -2x dx, \text{ avem } \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_1^0 \sqrt{t} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{1/2} dt = \frac{t^{3/2}}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

c) Subgraficul este un sfert din cercul unitate: $y = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow y^2 = 1-x^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$. Aria este $\frac{\pi}{4}$.

Testul 35

Subiectul I

$$1. a_1 = 8, a_{10} = 71 \Rightarrow S_{10} = \frac{8+71}{2} \cdot 10 = 79 \cdot 5 = 395.$$

2. $f(x) = g(x) \Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 7 = 0$. Cum $\Delta = 16 - 4 \cdot 3 \cdot 7 < 0$, ecuația nu are soluții.

$$3. \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{2} = 2x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ sau } x - \frac{\pi}{2} = -2x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Obținem } x \in \left\{-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

$$4. \text{ Avem } C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21; n^2 - 4n - 21 = 0, n \in \mathbb{N} \Rightarrow n = 7.$$

5. Punctul O este mijlocul diagonalelor AC și BD , deci $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{0}$, de unde rezultă concluzia.

$$6. \text{ Înălțimea din } A \text{ este egală cu } \sqrt{16-9} = \sqrt{7}, \text{ deci } S = 3\sqrt{7}. \text{ Cum } p = 7, \text{ rezultă } r = \frac{S}{p} = \frac{3\sqrt{7}}{7}.$$

Subiectul II

$$1. a) \Delta = -3m + 12.$$

$$b) \text{ Dacă punctul } P(a, b) \text{ aparține tuturor celor 3 drepte, atunci } a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ deci a}$$

treia coloană din Δ este combinație liniară a primelor două. Rezultă $\Delta = 0$, deci $m = 4$.

$$c) \text{ Dacă dreptele nu sunt concurente, avem } \Delta \neq 0, \text{ deoarece rang } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -3 & m \end{pmatrix} = 2. \text{ Sistemul este omogen,}$$

compatibil determinat, cu unica soluție $(0, 0, 0)$.

$$2. \text{ Fie } X, Y \in M \Rightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{Q} \text{ astfel ca } X = \begin{pmatrix} a+b\sqrt{2} & b \\ 0 & a-b\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ și } Y = \begin{pmatrix} c+d\sqrt{2} & d \\ 0 & c-d\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

$$a) X + Y = \begin{pmatrix} a+c+(b+d)\sqrt{2} & b+d \\ 0 & a+c-(b+d)\sqrt{2} \end{pmatrix} \in M, \text{ deoarece } a+c, b+d \in \mathbb{Q}.$$

$$b) XY = \begin{pmatrix} ac+2bd+(ad+bc)\sqrt{2} & ab+bc \\ 0 & ac+2bd-(ad+bc)\sqrt{2} \end{pmatrix} \in M, \text{ pentru că } ac+2bd, ad+bc \in \mathbb{Q}.$$

c) Adunarea matricelor este operație asociativă și comutativă, admite elementul neutru $O_2 \in M$ (pentru $a = b = 0 \in \mathbb{Q}$) și $-X = \begin{pmatrix} -a-b\sqrt{2} & -b \\ 0 & -a+b\sqrt{2} \end{pmatrix} \in M$. Înmulțirea matricelor este operație asociativă

distributivă față de adunare, cu elementul neutru $I_2 \in M$ (pentru $a = 1, b = 0$). Cum M este închisă cele două operații, rezultă cerința.

Subiectul III

$$1. a) f'_a(x) = a^x \ln a - 1, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f'_a(0) = \ln a - 1.$$

$$b) \text{ Pentru } a > 1, \text{ deoarece } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x} = \infty, \text{ rezultă } \lim_{x \rightarrow \infty} (a^x - x - 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{a^x}{x} - 1 - \frac{1}{x} \right) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^x}{x} - 1 - \frac{1}{x} \right) = \infty, \text{ deci graficul nu are asimptote la } +\infty. \text{ Pentru } a \in (0, 1), \text{ av}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + x + 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0, \text{ deci } y = -x - 1 \text{ este asimptotă spre } +\infty. \text{ Rezultă } a \in (0, 1).$$

c) Deoarece $f_a(x) \geq f_a(0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}, x = 0$ este punct de minim. Din teorema lui Fermat rez $f'_a(0) = 0 \Rightarrow \ln a = 1 \Rightarrow a = e$.

Notă. Avem $e^x \geq x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$2. a) I_1 = \int_0^\pi \sin \frac{x}{2} dx = -2 \cos \frac{x}{2} \Big|_0^\pi = 2.$$

$$b) I_{n+1} - I_n = \int_0^\pi \sin^n \frac{x}{2} \left(\sin \frac{x}{2} - 1 \right) dx \leq 0, \text{ deoarece } \sin \frac{x}{2} \geq 0, \forall x \in [0, \pi] \text{ și } \sin \frac{x}{2} - 1 \leq 0.$$

c) Avem $\sin^n \frac{x}{2} \geq 0, \forall x \in [0, \pi] \Rightarrow I_n \geq 0$. Fiind descrescător și mărginit inferior, șirul este convergent

Testul 36

Subiectul I

1. $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \Rightarrow A - B = \{5\}$. 2. Ecuația $f(x) = x$ se scrie $|x - 2| = x - 4$. Dacă $x \geq 2$, ecuația devine $x - 2 = x - 4$, și nu are soluții. Dacă $x < 2$, ecuația devine $2 - x = x - 4 \Rightarrow x = 3$. Punctul este $A(3, 3)$. 3. Avem $3^{2x+1} = 3 \cdot 9^x \Rightarrow 3^{2x+1} + 9^x = 4 \cdot 9^x$. Ecuația se scrie $4 \cdot 9^x = 36 \Leftrightarrow 9^x = 9$, deci $x = 1$.

4. Deoarece $C_{10}^n - C_9^n = C_9^{n-1}$, egalitatea se scrie $C_9^{n-1} = C_9^7 \Rightarrow n - 1 = 7$ sau $n - 1 = 2 \Rightarrow n = 8$ sau $n = 3$.

5. Punctul $O(0, 0)$ aparține dreptei d_1 . Distanța dintre drepte este distanța de la O la d_2 : $x - y + 1 = 0$, adică $\frac{|0 - 0 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

6. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 19 \Rightarrow BC = \sqrt{19} \Rightarrow 2R = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow R = \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{57}}{3}$.

Subiectul II

1. a) $A^2 = \begin{pmatrix} -2 & -2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & -2 \end{pmatrix}$; $A^3 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} = -8I_2$.

b) Deoarece $A^6 = 64I_2$, avem $A^5 \cdot \frac{1}{64}A = I_2$, deci inversa matricei A^5 este $\frac{1}{64}A$.

c) Avem $\det X^2 = \det A = 4$, deci $\det X = \pm 2$. Dacă $\det X = 2$, atunci $X^2 - (\text{Tr } X) \cdot X + 2I_2 = 0_2$. Cum $X^2 = A$, rezultă $(\text{Tr } X)X = X^2 - 2I_2 = \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Tr } X)^2 = 6 \Rightarrow \text{tr } X = \pm\sqrt{6}$ de unde $X = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$.

Dacă $\det X = -2$, atunci $(\text{Tr } X) \cdot X = X^2 - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Tr } X)^2 = -2$, ecuație fără soluții în \mathbb{R} .

2. a) $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = 3$.

b) Dacă x_1, x_2, x_3 , atunci $2x_2 = x_1 + x_3 \Rightarrow 3x_2 = x_1 + x_2 + x_3 = 6 \Rightarrow x_2 = 2$. Atunci $f(2) = 0$, deci $8 - 24 + 6 + m = 0 \Rightarrow m = 10$.

c) Avem $x_2 = x_1q$, $x_3 = x_1q^2$. Din $6 = x_1(1 + q + q^2)$, $3 = x_1^2q(1 + q + q^2)$, rezultă $x_1q = \frac{1}{2} \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}$. Atunci $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, deci $\frac{1}{8} - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + m = 0 \Rightarrow m = -\frac{1}{8}$.

Subiectul III

1. a) $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, $\forall x > 0$, deci f este strict crescătoare.

b) $f(1) = 1 > 0$, $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} - 1 < 0$. Din continuitatea funcției f rezultă cerința.

c) $f(1) + f(2) + \dots + f(n) = \frac{n(n+1)}{2} + \ln n!$. Avem $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}$; $n! \leq n^n \Rightarrow 0 \leq \frac{\ln n!}{n^2} \leq \frac{\ln n}{n}$ și, cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$, rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n^2} = 0$. Limita este egală cu $\frac{1}{2}$. (Alternativ, folosiți lema Stolz-Cesaro).

2. a) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow \int_1^4 f(x) dx = \ln x \Big|_1^4 - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \Big|_1^4 = \frac{1}{2}(5 \ln 2 - \ln 17)$.

b) Notând $t = x^2$, $dt = 2x dx$, avem $\int_1^2 x f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_1^4 f(t) dt = \frac{1}{4}(5 \ln 2 - \ln 17)$.

c) $\int_1^x f(t) dt = \ln t \Big|_1^x - \frac{1}{2} \ln(t^2 + 1) \Big|_1^x = \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{\ln 2}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{x^2 + 1} + \frac{\ln 2}{2}$, deci $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t) dt = \frac{\ln 2}{2}$.

Testul 37

Subiectul I

1. $z^2 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$; $\bar{z} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow z^2 + \bar{z} = 0 \in \mathbb{R}$. 2. Este necesar și suficient ca

$\Delta \leq 0 \Leftrightarrow 1 - 4m \leq 0 \Leftrightarrow m \in \left[\frac{1}{4}, \infty\right)$. 3. Fie $y \in [1, \infty)$. ecuația $f(x) = y$ are soluția $x = \sqrt[4]{y-1} \in \mathbb{R}$, deci

f e surjectivă. 4. $T_{k+1} = C_{100}^k \sqrt{3}^k \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow k$ e par, deci $k \in \{0, 2, \dots, 100\}$. Sunt 51 de termeni.

5. $4 = \frac{1+b}{2} \Rightarrow b = 7$; $a = \frac{2+4}{2} \Rightarrow a = 3 \Rightarrow a + b = 10$.

6. $\text{tg}\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\text{tg } x + \text{tg } \pi/6}{1 - \text{tg } x \text{tg } \pi/6} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \sqrt{3}$.

Subiectul II

1. a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - 3I_3) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$.

b) $A^2 = 3A \Rightarrow A^n = 3^{n-1}A \Rightarrow I_3 + A^n = \begin{pmatrix} 3^{n-1}+1 & 3^{n-1} & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1}+1 & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1}+1 \end{pmatrix}$.

$\det(I_3 + A^n) = (3^n + 1) \begin{vmatrix} 3^{n-1}+1 & 3^{n-1} & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1}+1 & 3^{n-1} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3^n + 1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3^{n-1} \\ 0 & 1 & 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3^n + 1 \Rightarrow 3^n + 1 = 82 \Rightarrow n = 4$.

c) Căutăm $x \in \mathbb{R}$ astfel încât $(I_3 + A)(I_3 + xA) = I_3 \Leftrightarrow I_3 + A + xA + xA^2 = I_3 \Leftrightarrow A + xA + 3xA^2 = O_3$, de unde $(4x+1)A = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$. Inversa este $I_3 - \frac{1}{4}A$. Alternativ, $(I_3 + A)^{-1} = \frac{1}{\det(I_3 + A)} \cdot (I_3 + A)^*$.

2. a) Avem $a - 4b = 0$, $5b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{5}$, $a = \frac{4}{5}$, care verifică $-5b = -1$, $a + 4b = \frac{8}{5}$ și $a^2 + 9b^2 = 1$, deci matricea aparține lui G .

b) Fie $X, Y \in G \Rightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{R}$ astfel încât $a^2 + 9d^2 = c^2 + 9b^2 = 1$ și $X = \begin{pmatrix} a-4b & 5b \\ -5b & a+4b \end{pmatrix}$,

$Y = \begin{pmatrix} c-4d & 5d \\ -5d & c+4d \end{pmatrix}$. Avem $XY = \begin{pmatrix} ac-9bd-4(ad+bc) & 5(ad+bc) \\ -5(ad+bc) & ac-9bd+4(ad+bc) \end{pmatrix} \in G$, deoarece

$(ac - 9bd)^2 + 9(ad + bc)^2 = (a^2 + 9b^2)(c^2 + 9d^2) = 1$.

c) Înmulțirea este bine definită pe G , este asociativă, are elementul neutru $I_2 \in G$ (pentru $a = 1, b = 0$), iar inversul elementului X este $X^{-1} = \frac{1}{a^2 + 9b^2} \begin{pmatrix} a+4b & -5b \\ 5b & a-4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+4b & -5b \\ 5b & a-4b \end{pmatrix} \in G$.

Subiectul III

$$1. a) f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{\sqrt{x^2+1} + x}{\sqrt{x^2+1}} > 0, \text{ deoarece } \sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x.$$

$$b) f'(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow f''(x) = \frac{f'(x) \cdot \sqrt{x^2+1} - \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} f(x)}{x^2+1} \Leftrightarrow (x^2+1) f''(x) = f'(x) \sqrt{x^2+1} - x f'(x) = f'(x) \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} = \frac{f'(x)}{f(x)}, \text{ de unde rezultă cerința.}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} \right) = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} = 0, \text{ deci } y = 2x \text{ este asimptotă graficului spre } +\infty.$$

$$2. a) f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = (\ln(x+1) - \ln(x+2)) \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - \ln 3.$$

$$b) \text{ Notăm } t = \ln x, dt = \frac{1}{x} dx. \text{ Atunci } \int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_0^1 f(t) dt = 2 \ln 2 - \ln 3.$$

$$c) \text{ Conform teoremei de medie, există } c_n \in [n, n+1] \text{ astfel ca } \int_n^{n+1} f(x) dx = f(c_n).$$

$$\text{Din } n \leq c_n \leq n+1 \text{ rezultă } 1 \leq \frac{c_n}{n} \leq 1 + \frac{1}{n}, \text{ de unde } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty \text{ și } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{n} = 1. \text{ Ca urmare,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 f(c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{c_n^2} \cdot \frac{c_n^2}{c_n^2 + 3c_n + 2} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Testul 38

Subiectul I

$$1. |A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B| \Rightarrow |A \cap B| = 4$$

$$2. x_v = -1 = -\frac{a}{2}, \text{ deci } a = 2; y_v = 1 - a + b = b - 1 \Rightarrow b = 2. \text{ Atunci } 2a + b = 6.$$

$$3. \lg^2 x^2 = 1 \Rightarrow \lg x^2 = \pm 1. \text{ Rezultă } x^2 = 10 \text{ sau } x^2 = \frac{1}{10}, \text{ de unde } x \in \left\{ -\sqrt{10}, \sqrt{10}, -\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right\}.$$

$$4. \text{ Sunt } C_3^4 \text{ funcții strict crescătoare și } C_3^4 \text{ funcții strict descrescătoare. În total } 2C_3^4 = 10.$$

$$5. \text{ Dreptele } d_1 \text{ și } d_2 \text{ se intersectează în punctul } (-1, -1). \text{ Atunci } -1 - a + 1 = 0 \Rightarrow a = 0.$$

$$6. C = 180^\circ - 30^\circ - 75^\circ = 75^\circ \text{ și } \sin C = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \Rightarrow R = \frac{AB}{2 \sin C} = 2(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

Subiectul II

$$1. a) XA = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = BX. \quad b) \text{ Demonstrăm prin inducție după } n. \text{ Evident, } B^1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \cdot 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Din}$$

$$B^{n+1} = B^n \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2(n+1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \in \mathbb{N}^*, \text{ rezultă cerința.}$$

$$c) \text{ Avem } A = X^{-1}BX \Rightarrow A^{100} = \underbrace{(X^{-1}BX) \dots (X^{-1}BX)}_{\text{de 100 ori}} = X^{-1}B^{100}X. \text{ Din } \det X = 2 \text{ și } X^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{obținem } X^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ deci } A^{100} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 200 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 202 & 200 \\ -203 & -201 \end{pmatrix}.$$

$$2. a) f = (2X - 1) \cdot (X^2 - X - 1) + 4; \text{ câtul este } X^2 - X - 1, \text{ iar restul } 4.$$

$$b) \text{ Din } f = 2(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) \text{ deducem } f(1) = 2(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3). \text{ Pe de altă parte } f(1) = 2 - 3 - 1 + 5 = 3, \text{ deci } (1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3) = \frac{3}{2}.$$

$$c) \text{ Din } \frac{f'}{f} = \frac{1}{X - x_1} + \frac{1}{X - x_2} + \frac{1}{X - x_3} \text{ rezultă } \frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \frac{1}{x - x_3} = \frac{f'(1)}{f(1)} = \frac{6 - 6 - 1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Subiectul III

$$1. a) f'(x) = 1 + \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Deoarece mulțimea zerourilor funcției } f' \text{ este formată doar din puncte izolate: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = (2k + 1)\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ rezultă că funcția } f \text{ este strict crescătoare.}$$

$$b) \text{ Avem } x - 1 \leq f(x) \leq x + 1, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ de unde rezultă că } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty. \text{ Funcția este continuă, deci } f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}, \text{ adică } f \text{ este surjectivă.}$$

$$c) \text{ Cum } \frac{x-1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{x+1}{x}, \forall x > 0, \text{ rezultă } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1. \text{ Funcția } g(x) = f(x) - x = \sin x \text{ nu are limită}$$

$$\text{la } +\infty, \text{ deoarece } x_n = n\pi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, g(x_n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ și } y_n = \frac{\pi}{2} + n\pi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, g(y_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

$$\text{Rezultă că } f \text{ nu are asimptote către } +\infty. \text{ Analog, se arată că } f \text{ nu are asimptote către } -\infty. \text{ Din continuitate rezultă că } f \text{ nu are asimptote verticale.}$$

$$2. a) I_2 = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{\sin x} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \cos x dx = 2 \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 2.$$

$$b) \text{ Cum } \sin(n+2)x - \sin nx = 2 \sin \frac{2x}{2} \cos \frac{2n+2}{2}x, \text{ rezultă } I_{n+2} - I_n = 2 \int_0^{\pi/2} \cos(n+1)x dx = \frac{2}{n+1} \sin(n+1)x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{n+1} \sin \frac{(n+1)\pi}{2}.$$

$$c) \text{ Dacă } n \text{ e impar, atunci } \frac{n+1}{2} \in \mathbb{Z} \text{ și } \sin \frac{(n+1)\pi}{2} = 0. \text{ Deducem că } I_1 = I_3 = \dots = I_{2013} = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Testul 39

Subiectul I

$$1. \text{ De exemplu } x = -\sqrt{2} + 1, \text{ deoarece } \sqrt{2} + x = 1 \in \mathbb{Q}^*.$$

$$2. \text{ Funcția } f \text{ este crescătoare pe intervalul } \left[x_v = -\frac{m}{4}, +\infty \right). \text{ Trebuie ca } -\frac{m}{4} \leq 2, \text{ deci } m \geq -8.$$

$$3. \frac{\pi}{4} = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ Funcția } \arcsin : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ este crescătoare, deci } x \in \left[-1, \frac{\sqrt{2}}{2} \right].$$

$$4. 5! = 120 \text{ și } 6! = 720; \text{ rezultă } n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

$$5. \text{ Mijlocul segmentului } BC \text{ este } M\left(\frac{3-1}{2}, \frac{1+4}{2}\right) = M\left(1, \frac{5}{2}\right). \text{ Mediana din } A \text{ are lungimea}$$

$$AM = \sqrt{(1-1)^2 + \left(2 - \frac{5}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}.$$

6. Avem $\pi < 4 < \frac{3\pi}{2}$, deci punctul de coordonată 4 pe cercul trigonometric este situat în al treilea cadran. Rezultă $\sin 4 < 0$.

Subiectul II

1. a) $\det A = 0$ și $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, deci $\text{rang } A = 2$.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; $A^3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Din $A^3 = uA^2 + vA$ obținem $4 = 2u + v$, $1 = u + v$, de unde $u = 3$, $v = -2$.

c) $X = A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, căci adjuncta matricei A verifică relația $A \cdot A^* = A^* \cdot A = (\det A) \cdot I_3 = O_3$.

2. a) $X - 1$ divide $f \Leftrightarrow f(1) = 0$. Deoarece $f(1) = 4 + m$ obținem $m = -4$.

b) Cum 1 este rădăcină, avem $f = (X - 1)(X^2 - 5X + 4)$. Obținem $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 4$.

c) Dacă r este rădăcină dublă, atunci $f(r) = f'(r) = 0$. Din $f'(r) = 3r^2 - 12r + 9 = 3(r - 1)(r - 3)$ se obține $r = 1$, pentru care $m = -4$, sau $r = 3$, pentru care din $f(3) = 0$, rezultă $m = 0$. Așadar, $m \in \{0, -4\}$.

Subiectul III

1. a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} = +\infty$, deci f nu este derivabilă (la dreapta) în $x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2}{(x+1)^2}} = +\infty$, deci f nu este derivabilă în $x = -1$.

b) $f'(x) = \frac{3x^2 - 2x - 1}{3\sqrt[3]{(x-1)^4(x+1)^2}} = \frac{(x-1)(3x+1)}{3\sqrt[3]{(x-1)^4(x+1)^2}} = \frac{3x+1}{3\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}}$, $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

c) Derivata se anulează în $x = -1/3$ și are semnul trinomialui $3x^2 - 2x - 1 = (x - 1)(3x + 1)$. După cum se vede și din tabloul de variație, punctul $x = 1/3$ este punct de maxim local, iar $x = 1$ este punct de minim local, deoarece f este continuă.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$f'(x)$	++++	+++	0	---	++++
$f(x)$	\nearrow	0	$\nearrow \frac{2\sqrt[3]{2}}{3}$	\searrow 0	\nearrow

2. a) $I(3, 3) = \int_0^3 x^2(1-x)^2 dx = \int_0^3 (x^2 - 2x^3 + x^4) dx = \frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} = \frac{1}{30}$.

b) Cu substituția $t = 1 - x$, avem $I(p, q) = -\int_1^0 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt = \int_0^1 t^{q-1} (1-t)^{p-1} dt = I(q, p)$.

c) Integrând prin părți, avem $I(p, q) = \frac{x^p}{p} \cdot (1-x)^{q-1} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^p}{p} \cdot (q-1)(1-x)^{q-2}(-1) dx = 0 + \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^p (1-x)^{q-2} dx = \frac{q-1}{p} I(p+1, q-1)$, de unde rezultă cerința.

Testul 40

Subiectul I

1. Intersecția este vidă dacă și numai dacă $a + 1 \leq 0$ sau $a \geq 1$. Rezultă $a \in (-1, 1)$.

2. Căutăm $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, astfel încât $f(x) = ax^2 + bx + c$, $x \in \mathbb{R}$.

Avem $f(0) = c \Rightarrow c = 0$, $f(1) = a + b + c \Rightarrow a + b = 1$ și $f(x) = 4a + 2b + c \Rightarrow 2a + b = 4$. Obținem $a = 3$, $b = -2$, $c = 0$ și $f(x) = 3x^2 - 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

3. Avem $2 \sin x \cos x = 2 \cos^2 x \Leftrightarrow \cos x = 0$ sau $\sin x = \cos x \Leftrightarrow \cos x = 0$ sau $\tan x = 1 \Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4. $T_{k+1} = C_6^k (x^3)^{6-k} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k \cdot x^{18-4k}$. Din $18 - 4k = 2$ rezultă $k = 4$; coeficientul lui x^2 este $C_6^4 = 15$.

5. $\overline{AB} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$, $AB = 2\sqrt{2}$; $\overline{AC} = -2\vec{i} + 3\vec{j}$, $AC = \sqrt{13}$. Avem $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = -4 + 6 = 2$; pe de altă parte, $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \cos \widehat{BAC}$. Rezultă $\cos \widehat{BAC} = \frac{1}{\sqrt{26}}$.

6. Avem $\frac{\pi}{2} < 2 < \pi < 4 < \frac{3\pi}{2}$, deci $\cos 2 < 0$, $\cos 4 < 0$ și $\cos 2 \cdot \cos 4 > 0$.

Subiectul II

1. a) Avem $\det A = -1$, $A^* = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, deci $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

b) Pentru $n = 2$, egalitatea este evidentă. Pentru $n = 3$, arătăm că $A^3 - A = A^2 - I_3$. Într-adevăr,

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ și $A^3 - A^2 - A + I_3 = O_3$. Dacă pentru un $n \geq 2$ avem

$A^n - A^{n-2} = A^2 - I_3$, prin înmulțire cu A rezultă $A^{n+1} - A^{n-1} = A^3 - A = A^2 - I_3$, ceea ce probează cerința.

c) Avem $A^{100} - A^{98} = A^2 - I_3$, $A^{98} - A^{96} = A^2 - I_3$, ..., $A^2 - I_3 = A^2 - I_3$. Adunând cele 50 de egalități

obținem $A^{100} - I_3 = 50(A^2 - I_3)$, de unde $A^{100} = 50A^2 - 49I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 50 & 50 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Fie $X, Y \in M \Rightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ astfel încât $X = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} c & 3d \\ d & c \end{pmatrix}$.

a) $X - Y = \begin{pmatrix} a-c & 3(b-d) \\ b-d & 3(a-c) \end{pmatrix} \in M$, deoarece $a-c, b-d \in \mathbb{Q}$.

b) $XY = \begin{pmatrix} ac+3bd & 3(bc+ad) \\ bc+ad & ac+3bd \end{pmatrix} \in M$, deoarece $ac+3bd, bc+ad \in \mathbb{Q}$.

c) Din punctul a) rezultă că $(M, +)$ e subgroup al grupului aditiv $\mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$. Înmulțirea este bine definită pe M , conform punctului b). În plus, este asociativă, distributivă față de adunare și admite elementul

neutru $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M$, pentru $a = 1$, $b = 0$. Inversa matricei X este $X^{-1} = \frac{1}{a^2 - 3b^2} \begin{pmatrix} a & -3b \\ -b & a \end{pmatrix}$ care

aparține lui M deoarece $\frac{a}{a^2 - 3b^2}, \frac{-b}{a^2 - 3b^2} \in \mathbb{Q}$; a se ține cont că $a, b \in \mathbb{Q}$ implică $a^2 - 3b^2 \neq 0$, deoarece $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Cerința este demonstrată.

Subiectul III

$$1. a) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 - 12x^2 + 1} - x^2) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12x^2 + 1}{\sqrt{x^4 - 12x^2 + 1} + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12 + \frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{12}{x^2} + \frac{1}{x^4}} + \frac{1}{x^2}} = \frac{-12}{2} = -6.$$

b) $f'(x) = 4(x^2 - 6x)$, $x \in \mathbb{R}$. Din tabloul de variație, $-\sqrt{6}$, 0 , $\sqrt{6}$ sunt punctele de extrem ale funcției f .

x	$-\infty$	$-\sqrt{6}$	0	$\sqrt{6}$	$+\infty$
$f'(x)$	-----	0	+++0---	0	++++
$f(x)$	\searrow	-35	\nearrow 1	\searrow -35	\nearrow

c) $f''(x) = 4(3x^2 - 6) = 12(x^2 - 2) = 12(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. Derivata a doua se anulează în $-\sqrt{2}$ și $\sqrt{2}$ și schimbă semnul în jurul acestor puncte, deci sunt puncte de inflexiune ale funcției f .

$$2. a) \int_0^1 f(x) \cdot f'(x) dx = \frac{f^2(x)}{2} \Big|_0^1 = \frac{f^2(1) - f^2(0)}{2} = \frac{2 - 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$b) V = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 (x^2 + 1) dx = \pi \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} \pi.$$

$$c) \text{Aria este } S = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f'(x) dx = x \cdot \sqrt{x+1} \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx = \sqrt{2} - \int_0^1 \frac{x^2+1-1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \\ = \sqrt{2} - S + \ln(x + \sqrt{x^2+1}) \Big|_0^1, \text{ deci } S = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})).$$